



127

Agaricus Komplex

Homöopathisches
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen

Zusammensetzung: 10 g (= 10,71 ml) Mischung enthalten:
Arzneilich wirksame Bestandteile: Agaricus Dil. D4, Lupulinum Dil. D4,
Cobaltum metallicum Dil. D8, Conium Dil. D4, Zincum cyanatum Dil.
D8, Secale cornutum Dil. D4, Oleander Dil. D3, Aesculus Dil. D3,
Veratrum viride (HAB 1934) Dil. D4 [HAB, Vorschr. 4a, Ø mit Ethanol
62 % (m/m)], Argentum nitricum Dil. D4, Kalium carbonicum Dil. D4,
Sepia Dil. D8, Tabacum Dil. D4, Phosphorus Dil. D6 je 0,7143 g
Dieses Präparat enthält 48,9 Vol.-% Alkohol.
Packungsbeilage beachten!

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer
therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden
Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Nicht über 25 °C aufbewahren. Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 2512435.00.00 Inhalt: 50 ml

Ch.-B.: 0000

Verwendbar bis 00/0000

Gebrauchsinformation

127 Agaricus Komplex

Homöopathisches Arzneimittel

Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml
1 g entspricht 20 Tropfen

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher
ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie 127 Agaricus Komplex nicht
einnehmen?

Wegen des Alkoholgehaltes soll 127 Agaricus Komplex
bei Alkoholkranken nicht angewendet werden.

Wann dürfen Sie 127 Agaricus Komplex erst nach
Rücksprache mit dem Arzt anwenden?

Wegen des Alkoholgehaltes soll 127 Agaricus Komplex
bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit
organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach
Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und

Warnhinweise:

Warnhinweis:

Dieses Arzneimittel enthält 48,9 Vol.-% Alkohol.

Als maximale Tagesgabe nach der
Dosierungsanleitung werden bis zu 0,31 g Alkohol
zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei
Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern,

Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für
Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer
Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.
Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit
beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen
vorliegen, sollte das Arzneimittel in der
Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache
mit dem Arzt angewendet werden.

Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen
keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es
soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht
angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite

Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 1-3mal täglich je 5
Tropfen auf einem Teelöffel Wasser vor den
Mahlzeiten einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit
der Anwendung zu reduzieren.

Dauer der Anwendung: siehe Rückseite

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: siehe Rückseite.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des
Arzneimittels: siehe Rückseite

Stand der Information: Mai 2016