

Laxatan® M

bei Verstopfung

Gebrauchsanweisung

Liebe Patientin, lieber Patient!
Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.

Laxatan® M



1 Beutel mit 15,35 g Granulat enthält:

Macrogol	13,125 g
Mg-Citrat	0,250 g
Ca-Citrat	0,125 g
Kaliumchlorid	0,015 g
Inulin	1,000 g

Mit Zitronengeschmack. Enthält 0,007 BE.

Darreichung und Inhalt

Trink-Granulat zur Auflösung in Flüssigkeit (Wasser).

Originalpackungen mit 10, 24 und 48 Beuteln zu 15,35 g Granulat.

Vertrieb



Cassella-med GmbH & Co. KG
Gereonsmühlengasse 1,
50670 Köln

Telefon: 0800/1652-200

Telefax: 0800/1652-700

e-mail: dialog@cassella-med.eu

Hersteller



MCM Klosterfrau Vertriebs GmbH
Gereonsmühlengasse 1-11
50670 Köln, Deutschland

1. Wie ist der Anwendungsbereich von Laxatan® M?

Laxatan® M wird angewendet zur symptomatischen Behandlung bei akuter und chronischer Verstopfung (Obstipation).

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Laxatan® M beachten?

Laxatan® M darf nicht eingenommen werden bei

- Darmverschluss
- einer akut entzündlichen Erkrankung des Darms (z. B. Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa)
- unklaren Schmerzen im Bauchraum oder bei einem drohenden Darmdurchbruch (Perforation)
- akuter Weitstellung der Darmwand (toxisches Megakolon)
- einer Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Inhaltsstoffe

Worauf müssen Sie noch achten?

Das Produkt ist für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren vorgesehen.

Bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren bestehen keine Erfahrungen bezüglich der Anwendung von Laxatan® M. Die Einnahme sollte nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt erfolgen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangere Frauen und stillende Mütter sollten aufgrund mangelnder Erfahrung Laxatan® M nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt einnehmen.



Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Die Verabreichung von Macrogol-Abführmitteln mit Verdickungsmitteln auf Stärkebasis birgt ein Risiko für Patienten mit Dysphagie (Schluckbeschwerden). Die Kombination der beiden Substanzen führt zu einer Neutralisation der Verdickung, die das Aspirationsrisiko (das Eindringen von Flüssigkeit in die Atemwege) erhöht. Verwenden Sie daher bitte bei der Auflösung des Pulvers von Laxatan® M keine Verdickungsmittel auf Stärkebasis. Als Alternative kann Laxatan® M mit Verdickungsmitteln auf Xanthan-Basis sicher genutzt werden.

Wechselwirkungen mit Arzneimitteln

Um Wechselwirkungen mit Arzneimitteln zu vermeiden, empfiehlt sich 1 Stunde vor und 1 Stunde nach der Einnahme von Laxatan® M keine Arzneimittel einzunehmen.

3. Wie ist Laxatan® M einzunehmen?

Nehmen Sie Laxatan® M nach den Anwendungshinweisen in dieser Gebrauchsanweisung ein. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Dosierung:

1- bis 3-mal täglich 1 Beutel Laxatan® M aufgelöst in einem Glas Wasser (125 ml) trinken, entsprechend den individuellen Erfordernissen.

Dauer und Zeitpunkt der Anwendung:

Die Anwendungsdauer von Laxatan® M ist auf maximal 30 Tage begrenzt.

Nach einer Unterbrechung von 7 Tagen ist eine erneute Anwendung möglich. Für eine wiederholte Anwendung wird die Rücksprache mit einem Arzt empfohlen. Die Einnahme kann zu jeder Tageszeit unabhängig von den Mahlzeiten erfolgen.

4. Was ist zu tun, wenn Laxatan® M in zu großen Mengen angewendet wurde?

Wenn Sie größere Mengen von Laxatan® M zu sich genommen haben, als Sie sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

5. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Bei der Anwendung von Laxatan® M kann es gelegentlich zu Magen-Darm-Beschwerden wie z. B. Völlegefühl, Blähungen, Übelkeit oder Durchfall kommen. Nach Absetzen des Präparates gehen die Beschwerden in der Regel innerhalb von 24 - 48 Stunden zurück.



Danach kann die Therapie mit einer verminderten Dosierung fortgesetzt werden. In seltenen Fällen treten Erbrechen, unfreiwilliger Stuhlabgang und Schmerzen im Oberbauch auf. Ebenfalls selten sind Kopfschmerzen und Schwindelgefühle. Vereinzelt kann es zu allergischen Überempfindlichkeits-

reaktionen wie z.B. Brennen, Juckreiz und Hautausschlag kommen.

Bitte melden Sie alle im Zusammenhang mit Laxatan® M aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde Ihres Landes.

6. Wie ist Laxatan® M aufzubewahren und wie lange ist es haltbar?

Bitte das Produkt trocken und unter 25 °C lagern.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Das Verfallsdatum dieses Produkts ist auf der Faltschachtel und dem Beutel aufgedruckt.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr nach diesem Datum!

Stand der Information:

Juli 2025

CE 0123

Liebe Patientin, lieber Patient,

mit Laxatan® M haben Sie ein modernes Abführmittel erworben, das nicht nur die Verstopfung schonend und effektiv löst, sondern darüber hinaus hilft, die Darmflora aufzubauen. Und das ganz ohne Gewöhnungseffekt! Hierzu möchten wir Ihnen noch einige weitere wichtige Informationen geben:

Wie wirkt Laxatan® M?

Laxatan® M enthält neben dem Wirkstoff Macrogol noch zusätzlich ausgewählte Elektrolyte und Inulin. Macrogol besitzt die Fähigkeit, viel Wasser zu binden und dies direkt in den Darm zu transportieren. So wird der verhärtete Stuhl aufgeweicht und der normale Stuhlgang ermöglicht. Die darüber hinaus enthaltenen Elektrolyte helfen dabei, den Mineralhaushalt im Gleichgewicht zu halten. Das zusätzlich enthaltene Inulin fördert das Wachstum der nützlichen Darmbakterien. So löst Laxatan® M nicht nur schonend und effektiv die Verstopfung, sondern trägt darüber hinaus zur Gesunderhaltung des Darms bei – ganz ohne Gewöhnungseffekte.

Bitte beachten Sie:

Falls Sie bisher andere Abführmittel verwendet haben, können mehrere Anwendungen von Laxatan® M erforderlich sein, damit das Produkt optimal wirkt. Dies liegt daran, dass andere Abführmittel oft die natürliche Darmfunktion negativ beeinflussen. Der Darm muss dann möglicherweise erst wieder lernen, seine normale Arbeit wieder selbstständig zu erledigen.

Laxatan® M hingegen unterstützt den Darm bei seiner Arbeit. Laxatan® M wirkt, ohne den Darm zu belasten und hilft zusätzlich, die Darmflora aufzubauen.

Haben Sie noch Fragen?

Bitte wenden Sie sich an:
Cassella-med GmbH & Co. KG
Gereonsmühlengasse 1, 50670 Köln
Telefon: 0800/1652-200,
Telefax: 0800/1652-700
e-mail: dialog@cassella-med.eu

 **LOT** Chargenbezeichnung

 Verwendbar bis

 Nicht wiederverwenden

 Gebrauchsanweisung beachten!

 **UDI** Eindeutige Produktidentifizierung

 Achtung!

 ^{25°C} Obere Temperaturbegrenzung 25 °C

 Hersteller

 **MD** Medizinprodukt

 Vertriebspartner