

STERIMED®



2-Propanol 70% (V/V) Lösung

Stoff- oder Indikationsgruppe:

Desinfektionsmittel



500 ml

1608000-03

Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut; Kühllumschläge.
Gegenanzeigen: STERIMED ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Keine bekannt.
Warnhinweise: Leicht entzündlich! Von Zündquellen fern halten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung: Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit der Lösung eingerieben und 30 Sekunden lang feucht gehalten. Zur chirurgischen Händedesinfektion werden Hände und Unterarme mit der Lösung eingerieben und 5 Minuten lang feucht gehalten. Zur Desinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 15 Sekunden lang feucht gehalten. Zur Desinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 1 Minute lang feucht gehalten. Zur Desinfektion von talgdrüsenreicher Haut wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 10 Minuten lang feucht gehalten. Für Kühllumschläge ist die Lösung mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anzuwenden. **Hinweise:** Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen (z.B. feuchte Haut, Verschmutzung der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern. STERIMED wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet. Bei Fragen zur Klärung der Anwendung befragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker. **Nebenwirkungen:** Beim Einreiben der Haut mit STERIMED können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. **Meldung von Nebenwirkungen:** Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden. **Hinweise:** Das Verfalldatum dieses Arzneimittels ist auf dem Etikett aufgedruckt. Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum! Dicht verschlossen aufbewahren. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. **Zusammensetzung:** 100 g enthalten als arzneilich wirksamen Bestandteil: 2-Propanol 63,1 g. **Sonstiger Bestandteil:** Gereinigtes Wasser. **Darreichungsform u. Inhalt:** Lösung, 100ml u. 500ml.

Pharmazeutischer Unternehmer: Canea Pharma GmbH, Tarpenring 12, D-22419 Hamburg, Tel: 040-53718884, **Hersteller:** AFP GmbH, Otto-Brenner-Str. 16, D-21337 Lüneburg.

Stand der Information: September 2019
Zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen.
Zul.-Nr.: 1599.98.99

Ch.-B.:

Verwendbar bis:

1608001-03



PZN - 00384035 V002