

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Rowatinex Tropfen

Tropfen zum Einnehmen, Lösung

α-Pinen	24,8 mg
β-Pinen	6,2 mg
Camphen	15,0 mg
endo-Borneol	10,0 mg
Anethol	4,0 mg
L-Fenchon	4,0 mg
Cineol	3,0 mg

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was sind Rowatinex Tropfen und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Rowatinex Tropfen beachten?
3. Wie sind Rowatinex Tropfen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Rowatinex Tropfen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS SIND ROWATINEX TROPFEN UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

Rowatinex Tropfen sind behilflich bei der Auflösung / dem Abbau und der Entfernung (Auflösung und Ausscheidung) von Nieren- und Harnwegsteinen.

Rowatinex Tropfen lindern Muskelkrämpfe und vermindern so die Schmerzen bei Nieren- und Harnkoliken. Sie erhöhen die Durchblutung und reduzieren Entzündungen, die mit dem Vorhandensein von Nierensteinen in Verbindung gebracht werden können.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON ROWATINEX TROPFEN BEACHTEN?

Rowatinex Tropfen dürfen nicht eingenommen werden,

wenn Sie allergisch gegen α-Pinen, β-Pinen, Camphen, Borneol, Anethol, Fenchon, Cineol oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie Rowatinex Tropfen einnehmen.

Nehmen Sie Rowatinex Tropfen nicht zur Behandlung von Harnsteinen ein, es sei denn, Ihr Arzt hat die Diagnose von Harnsteinen bestätigt (speziell bei Kindern).

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Rowatinex Tropfen einnehmen, wenn Sie Arzneimittel zur Blutverdünnung einnehmen oder Arzneimittel einnehmen, die durch die Leber abgebaut werden.

Einnahme von Rowatinex Tropfen zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt. Diese Arzneimittel umfassen:

- Arzneimittel zur Blutverdünnung (orale Antikoagulantien, z. B. Warfarin)
- Arzneimittel, die in der Leber abgebaut werden (fragen Sie hierzu Ihren Arzt).

Schwangerschaft und Stillzeit

Es liegen keine Erfahrungen mit einer Anwendung von Rowatinex in der Schwangerschaft vor. Möglicherweise können Bestandteile von Rowatinex die Plazenta passieren und ihr ungebornes Kind erreichen. Wenn Sie schwanger sind oder vermuten, schwanger zu sein, sollten Sie Rowatinex nicht einnehmen.

Da ebenfalls keine Erfahrungen mit einer Anwendung von Rowatinex in der Stillzeit vorliegen und nicht ausgeschlossen werden kann, dass einzelne Bestandteile von Rowatinex in die Muttermilch übergehen, sollten Sie, wenn Sie stillen, Rowatinex nicht einnehmen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es gibt keine Hinweise auf eine Beeinträchtigung Ihrer Verkehrstüchtigkeit oder Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durch Rowatinex Tropfen.

3. WIE SIND ROWATINEX TROPFEN EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis für Erwachsene beträgt:

3 bis 5 Tropfen 4- bis 5-mal täglich vor den Mahlzeiten oder bei Koliken 20 bis 30 Tropfen 4- bis 5-mal täglich.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen:

Kinder von 0 bis 6 Jahren: Die Einnahme wird nicht empfohlen. Es liegen keine Daten vor.

Kinder von 6 bis 14 Jahren: 1 bis 2 Tropfen 2-mal täglich vor den Mahlzeiten.

Jugendliche von 14 bis 18 Jahren: 3 bis 5 Tropfen 4- bis 5-mal täglich vor den Mahlzeiten oder bei Koliken 20 bis 30 Tropfen 4- bis 5-mal täglich.

Wenn Sie eine größere Menge Rowatinex Tropfen eingenommen haben als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge an Tropfen eingenommen haben als Sie sollten, benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie die Einnahme von Rowatinex Tropfen vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Nehmen Sie sie ein, sobald Sie sich daran erinnern. Fahren Sie dann mit der nächsten Dosis zur üblichen Zeit fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: <http://www.bfarm.de>, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE SIND ROWATINEX TROPFEN AUFZUBEWAHREN?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Rowatinex Tropfen sollen nicht über 25 °C gelagert werden.

Die Flasche fest verschlossen halten.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Flasche und dem Ummkarton nach „verw. bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/anzneimittelentsorgung.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Rowatinex Tropfen enthalten

Ein Tropfen zu 28,5 mg Lösung enthält:

α-Pinen	7,1 mg
β-Pinen	1,8 mg
Camphen	4,3 mg
endo-Borneol	2,8 mg
Anethol	1,2 mg
L-Fenchon	1,1 mg
Cineol	0,9 mg

Der sonstige Bestandteil ist: Natives Olivenöl.

Wie Rowatinex Tropfen aussehen und Inhalt der Packung

Rowatinex Tropfen sind eine blass-gelbe bis grünlich-gelbe Lösung mit einem aromatischen Geruch.

Originalpackungen mit 10 ml Tropfen.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

ROWA WAGNER GmbH & Co. KG

Arzneimittelfabrik

Frankenforster Strasse 77

D-51427 Bergisch Gladbach

Telefon: +49-2204-61081

Telefax: +49-2204-61084

E-Mail: info@rowakg.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Juni 2023.