

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Castellani-viskos mit Miconazol

Wirkstoff: 2 % Miconazol

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen. Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers oder des medizinischen Fachpersonals an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 10 – 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Castellani-viskos mit Miconazol und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Castellani-viskos mit Miconazol beachten?
3. Wie ist Castellani-viskos mit Miconazol anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Castellani-viskos mit Miconazol aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Castellani-viskos mit Miconazol und wofür wird es angewendet?

Castellani-viskos mit Miconazol ist ein Arzneimittel zur Behandlung von Pilzkrankungen auf der Haut.

Anwendungsgebiet: Pilzkrankungen der Haut (Dermatomykosen), die auf Miconazol ansprechen (z. B. Fußpilz)

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Castellani-viskos mit Miconazol beachten?

Castellani-viskos mit Miconazol darf nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch gegen Miconazol, verwandte pilzabtötende Medikamente oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal, bevor Sie Castellani-viskos mit Miconazol anwenden. Kontakt mit den Augen vermeiden.

Anwendung von Castellani-viskos mit Miconazol zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen / angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen / anzuwenden.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch bei äußerlicher Anwendung von Miconazol die Wirksamkeit blutgerinnungshemmender Mittel (z. B. Marcumar) verstärkt werden kann.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Da Miconazol bei äußerlicher Anwendung nur in sehr geringen Mengen durch die Haut aufgenommen wird, kann Castellani-viskos mit Miconazol bei bestimmungsgemäßem Gebrauch während der Schwangerschaft angewendet werden. Um den direkten Kontakt des Säuglings mit dem Wirkstoff zu vermeiden, sollten stillende Frauen Castellani-viskos mit Miconazol während der Stillzeit nicht im Brustbereich anwenden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Castellani-viskos mit Miconazol hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

3. Wie ist Castellani-viskos mit Miconazol anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers oder des medizinischen Fachpersonals an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, wird Castellani-viskos mit Miconazol – jeweils mit frischem Wattestäbchen – 1 – 3-mal täglich auf die betroffenen Hautpartien gleichmäßig dünn aufgetragen.

Art der Anwendung

Lösung zum Auftragen auf die Haut

Dauer der Anwendung

Die Behandlungsdauer beträgt durchschnittlich 2 – 5 Wochen.

Die Behandlung sollte bis zum Verschwinden positiver Pilzkulturen durchgeführt werden, mindestens jedoch noch 14 Tage nach Abklingen der Beschwerden. Zwischen dem letzten Auftragen und dem Anlegen einer Pilzkultur sollte eine behandlungsfreie Zeitspanne vom 3 – 4 Tagen liegen, damit eventuell noch vorhandene Wirkstoffreste die Untersuchungsergebnisse nicht verfälschen.

Wenn Sie eine größere Menge von Castellani-viskos mit Miconazol angewendet haben, als Sie sollten

Eine kurzzeitige Anwendung zu hoher Dosen hat keine negativen Auswirkungen.

Wenn Sie die Anwendung von Castellani-viskos mit Miconazol vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Die kurzzeitige Unterbrechung der Behandlung mit Castellani-viskos mit Miconazol hat keine negativen Auswirkungen.

Wenn Sie die Anwendung von Castellani-viskos mit Miconazol abbrechen

Bitte brechen Sie die Behandlung mit Castellani-viskos mit Miconazol nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt ab. Ihre Krankheit könnte sich hierdurch verschlechtern.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei Jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	≥ 1/10
Häufig:	< 1/10, ≥ 1/100
Gelegentlich:	< 1/100, ≥ 1/1000
Selten:	< 1/1000, ≥ 1/10 000
Sehr selten:	< 1/10 000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Bedeutsame Nebenwirkungen oder Zeichen, auf die Sie achten sollten, und Maßnahmen, wenn Sie betroffen sind:

Wenn Sie von einer der nachfolgend genannten Nebenwirkungen betroffen sind, beenden Sie die Behandlung mit Castellani-viskos mit Miconazol und suchen Sie möglichst umgehend Ihren Arzt auf.

Gelegentlich können bei der Behandlung mit Castellani-viskos mit Miconazol Hautreizungen mit Rötung, Stechen, Brennen auftreten.

Andere mögliche Nebenwirkungen

Systemische (innere Organe betreffende) Wirkungen sind bei äußerlicher Anwendung bisher nicht bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Castellani-viskos mit Miconazol aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett bzw. Behältnis nach „Verwendbar bis“ bzw. „Verw. bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/anzneimittelentsorgung.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Castellani-viskos mit Miconazol enthält

- Der Wirkstoff ist Miconazol.
100 g Castellani-viskos mit Miconazol enthalten 2,0 g Miconazol.
- Die sonstigen Bestandteile sind:
Macrogol 400, Macrogol 1000, gereinigtes Wasser

Wie Castellani-viskos mit Miconazol aussieht und Inhalt der Packung

Castellani-viskos mit Miconazol ist eine klare, farblose Lösung, in Braunglas-Flaschen von 10 ml, 20 ml, 50 ml Inhalt.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Dr. K. Hollborn & Söhne GmbH & Co. KG
Brahestraße 13 • D-04347 Leipzig
Tel.: (0341) 2 33 44 05 • Fax: (0341) 2 33 44 06
E-mail: info@hollborn.de • Internet: www.hollborn.de

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im 06/2024.