

2-Propanol 70% (V/V)

Lösung zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen Haut- und Händedesinfektionsmittel

Zul.- Nr. 1599.98.99

Gebrauchsinformation

Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut; Kühlumschläge.

Gegenanzeigen: 2-Propanol 70% (V/V) ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.

Warnhinweise: Siehe Rückseite.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung: Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit der Lösung eingerieben und 30 Sekunden lang feuchtgehalten. Zur chirurgischen Händedesinfektion werden Hände und Unterarme mit der Lösung eingerieben und 5 Minuten lang feuchtgehalten. Zur Desinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 15 Sekunden lang feuchtgehalten. Zur Desinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 1 Minute lang feuchtgehalten. Zur Desinfektion von talgdrüsenreicher Haut wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 10 Minuten lang feuchtgehalten. Für Kühlumschläge ist die Lösung mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anzuwenden.

Hinweise: Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen (z.B. feuchte Haut, Verschmutzung der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern. 2-Propanol 70% (V/V) wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet. Bei Fragen zur Anwendung bitte an Arzt oder Apotheker wenden.

B | BRAUN

s. Rückseite →

2015-07-09 - 836341



**Leicht-
entzündlich**

Leichtentzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen!

Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B.: das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. 18°C Flammpunkt
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Nach dem Verfalldatum (s. unten) nicht mehr verwenden!

100 g Lösung enthalten: 62,8 g 2-Propanol (Ph. Eur.),
Gereinigtes Wasser

Letzte Überarbeitung: 07/2015

Pharmazeutischer
Unternehmer und Hersteller:

B | BRAUN

B. Braun Melsungen AG
D-34209 Melsungen
Tel. 05661-710

2-Propanol 70% (V/V)

500 ml Lösung

Art.-Nr.: **19121**

Verwendbar

bis:

Ch.-B.:

2015-07-09 - 836342

