

*
1
1
3
4
7
9
0
0
*

18 Stibium Komplex

Homöopathisches
Arzneimittel

Tabletten zum Einnehmen
Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ferrum sulfuricum Trit. D6, Antimonium sulfuratum aurantiacum Trit. D4, Natrium nitricum Trit. D4, Arsenicum album Trit. D6, Mercurius solubilis Hahnemanni Trit. D6 je 27 mg. Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat, Kartoffelstärke. Enthält Lactose. Packungsbeilage beachten!
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
Nicht über 25 °C aufbewahren. Apothekenpflichtig
Reg.-Nr.: 2513011.00.00 Inhalt: 120 Tabletten

Ch.-B.: 0000 **Verwendbar bis 00/0000**

Gebrauchsinformation
18 Stibium Komplex
Homöopathisches Arzneimittel
Tabletten, Originalpackung mit 120 Tabletten

Anwendungsgebiete:
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:
Wann dürfen Sie 18 Stibium Komplex nicht einnehmen?

18 Stibium Komplex darf nicht eingenommen werden bei Nierenfunktionsstörungen, bei Säuglingen und Kleinkindern sowie in Schwangerschaft und Stillzeit.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern zwischen 6 und 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite
Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet 1 – 3 mal täglich 1 Tablette vor oder zwischen den Mahlzeiten einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Dauer der Anwendung: Ohne medizinischen Rat nicht länger als 1 Woche anwenden.

Hinweise für den Fall der Überdosierung:
Was ist zu tun, wenn 18 Stibium Komplex in zu großen Mengen eingenommen wurde?
Bei der Einnahme größerer Mengen des

Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

Nebenwirkungen:
Nach Einnahme kann Speichelfluss auftreten, das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: siehe Rückseite.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: siehe Rückseite.
Das Arzneimittel ist nach Anbruch des Behältnisses 6 Monate haltbar.

Stand der Information: Juli 2016