

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient, bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und sollte deshalb nicht an Dritte weitergegeben werden.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Argentum metallicum praeparatum 0,4 % und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Argentum metallicum praeparatum 0,4 % beachten?
3. Wie ist Argentum metallicum praeparatum 0,4 % anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Was ist sonst noch wichtig?

Argentum metallicum praeparatum 0,4 %

Salbe



WELEDA

Wirkstoff: Argentum metallicum praeparatum D1

1. Was ist Argentum metallicum praeparatum 0,4 % und wofür wird es angewendet?

Argentum metallicum praeparatum 0,4 % ist ein anthroposophisches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete

Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehören zu den Anwendungsgebieten die Anregung und die Strukturierung aufbauender Stoffwechselprozesse, z.B. bei erschöpfenden Fieberzuständen, akuten entzündlichen Erkrankungen, bei konstitutioneller Schwäche, nach akuten und chronischen seelischen Überlastungen, bei Schlafstörungen.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Argentum metallicum praeparatum 0,4 % beachten?

Argentum metallicum praeparatum 0,4 % darf bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Silber nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Die Anwendung des Arzneimittels bei Fieberzuständen, akuten entzündlichen Erkrankungen oder Depressionen sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt verordnete Arzneimittel.

Bei länger anhaltenden oder unklaren Beschwerden suchen Sie bitte einen Arzt auf. Besonders unter dem Einfluss von Sonnenlicht (UV-Licht) kann es zu einer Graufärbung der Haut im Anwendungsbereich der Salbe (= Argyrose) kommen. Daher sollten die mit Argentum metallicum praeparatum 0,4 % behandelten Stellen keiner direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wie alle Arzneimittel sollte Argentum metallicum praeparatum 0,4 % in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Keine bekannt

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

3. Wie ist Argentum metallicum praeparatum 0,4 % anzuwenden?

Wenden Sie Argentum metallicum praeparatum 0,4 % immer genau nach der Anweisung Ihres Arztes an.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

	Länge des Salbenstrangs	Häufigkeit der Anwendung
Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren	2 – 3 cm	1 – 2 mal täglich
Schulkinder von 6 bis 11 Jahren	1 – 2 cm	1 – 2 mal täglich
Kleinkinder von 1 bis 5 Jahren	1 cm	1 – 2 mal täglich
Säuglinge im 1. Lebensjahr	1 cm	1 mal täglich

Bei Fieberzuständen und entzündlichen Erkrankungen nach vorhergehender ärztlicher Abklärung im betroffenen Organbereich dünn auftragen.

Bei konstitutioneller Schwäche, Schlafstörungen und nach akuten und chronischen seelischen Überlastungen auf dem Unterleib kreisförmig – im Uhrzeigersinn – auftragen.

Dauer der Anwendung

Die Behandlung einer akuten Erkrankung sollte nach 2 Wochen abgeschlossen sein. Tritt innerhalb von 2 Tagen keine Besserung ein, ist ein Arzt aufzusuchen. Die Dauer der Behandlung von chronischen Krankheiten erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

Wenn Sie die Anwendung von Argentum metallicum praeparatum 0,4 % vergessen haben:

Verwenden Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich bei der Anwendung dieses Arzneimittels nicht ganz sicher sind.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem *Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de* anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Was ist sonst noch wichtig?

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Tube und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Nach Anbruch der Packung ist die Salbe 2 Monate haltbar.

Aufbewahrungsbedingungen

Nicht über 25 °C lagern.

Zusammensetzung

10 g enthalten: Wirkstoff: Argentum metallicum praeparatum Trit. D1 0,4 g.

Salbengrundlage: Dickflüssiges Paraffin, Protegin® WX (Gelbes Vaseline, Ceresin, hydriertes Rizinusöl, Glycerolmonoisostearat, Polyglycerol-3-oleat), Gelbes Vaseline, Gereinigtes Wasser.

Darreichungsform und Packungsgröße

25 g Salbe

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Weleda AG, Postfach 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd

Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-200, E-Mail: dialog@weleda.de

Stand der Information: Dezember 2017