

## Gebrauchsinformation

**Liebe Patientin, lieber Patient, bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und sollte deshalb nicht an Dritte weitergegeben werden.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

### Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Equisetum cum Sulfure tostum und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Equisetum cum Sulfure tostum beachten?
3. Wie ist Equisetum cum Sulfure tostum einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Was ist sonst noch wichtig?

# Equisetum cum Sulfure tostum



WELEDA

## Verreibungen

### 1. Was ist Equisetum cum Sulfure tostum und wofür wird es angewendet?

Equisetum cum Sulfure tostum ist ein anthroposophisches Arzneimittel.

### Anwendungsgebiete

Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehört zu den Anwendungsgebieten die Anregung der Nierentätigkeit im aufbauenden Stoffwechsel, z.B. bei Ausscheidungsstörungen und Ödemen, insbesondere bei chronischen und entzündlichen Nierenerkrankungen und begleitenden Spannungs- und Unruhezuständen; chronische und entzündliche Gelenkerkrankungen; ekzematöse Hautveränderungen.

### 2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Equisetum cum Sulfure tostum beachten?

### Gegenanzeigen

Keine bekannt

### Vorsichtsmaßnahmen für die Einnahme

Bei Harnverhalt, Fieber, trübem oder blutigem Urin sowie bei Schwellung oder Überwärmung von Gelenken oder eitrigen Hautausschlägen ist ein Arzt aufzusuchen.

Bei länger anhaltenden oder unklaren Beschwerden suchen Sie bitte einen Arzt auf.

### Kinder

Zur Anwendung von Equisetum cum Sulfure tostum bei Kindern unter 1 Jahr liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es sollte deshalb nicht angewendet werden.

### Schwangerschaft und Stillzeit

Wie alle Arzneimittel sollte Equisetum cum Sulfure tostum in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

### Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Keine bekannt

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### Wichtige Informationen über bestimmte Bestandteile von Equisetum cum Sulfure tostum

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie es daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

### 3. Wie ist Equisetum cum Sulfure tostum einzunehmen?

Nehmen Sie Equisetum cum Sulfure tostum immer genau nach der Anweisung Ihres Arztes ein.

*Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:*

1 – 3 mal täglich 1 Messerspitze Pulver einnehmen.

Lassen Sie die Verreibung im Mund zergehen oder nehmen Sie sie mit etwas Flüssigkeit ein.

Die für die Behandlung geeignete Potenzstufe wird vom Arzt nach dem jeweiligen Krankheitsbild ausgewählt und für den Patienten individuell verordnet.

#### *Dauer der Anwendung*

Die Behandlung einer akuten Erkrankung sollte nach 1 Woche abgeschlossen sein.

Tritt innerhalb von 2 Tagen keine Besserung ein, ist ein Arzt aufzusuchen. Die Dauer der Behandlung von chronischen Krankheiten erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

*Wenn Sie die Einnahme von Equisetum cum Sulfure tostum vergessen haben:*

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich bei der Anwendung dieses Arzneimittels nicht ganz sicher sind.

### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel können Equisetum cum Sulfure tostum Verreibungen Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Gelegentlich können sich aufgrund einer überschießenden Reaktion Entzündungen zu Beginn der Behandlung etwas verstärken; das Arzneimittel ist dann abzusetzen. Über die Fortführung der Behandlung sprechen Sie in diesem Fall bitte mit Ihrem Arzt.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem *Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)* anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### 5. Was ist sonst noch wichtig?

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

#### **Aufbewahrungsbedingungen**

Die Verreibungen D1 und D3 sind feuchtigkeitsempfindlich. Nach jeder Entnahme muss das Behältnis daher wieder dicht verschlossen werden.

#### **Zusammensetzung**

Arzneimittelbezeichnung	10 g enthalten: Wirkstoff:
Equisetum cum Sulfure tostum D1	Equisetum cum Sulfure tostum Trit. D1 * 10 g
Equisetum cum Sulfure tostum D3	Equisetum cum Sulfure tostum Trit. D3 * 10 g
Equisetum cum Sulfure tostum D4	Equisetum cum Sulfure tostum Trit. D4 * 10 g
Equisetum cum Sulfure tostum D6	Equisetum cum Sulfure tostum Trit. D6 * 10 g

\* (HAB, V. 6) (Ursubstanz hergestellt aus: Equisetum arvense, Herba 99 Teile / Sulfur 1 Teil)

#### **Darreichungsform und Packungsgröße**

20 g Verreibung

#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Weleda AG, Postfach 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd

Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-200, E-Mail: [dialog@weleda.de](mailto:dialog@weleda.de)

**Stand der Information:** Februar 2015