

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

ROWAchol Kapseln

Magensaftresistente Weichkapseln

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen

Levomenthol, (-)-trans-Menthon, α -Pinen, β -Pinen, endo-Borneol, Cineol, Camphen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich schlechter oder nach 1 Woche nicht besser fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist ROWAchol Kapseln und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von ROWAchol Kapseln beachten?
3. Wie ist ROWAchol Kapseln anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist ROWAchol Kapseln aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist ROWAchol Kapseln und wofür wird es angewendet?

ROWAchol Kapseln wird traditionell angewendet zur Besserung des Befindens bei Gallenbeschwerden.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von ROWAchol Kapseln beachten?

ROWAchol Kapseln darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen ätherische Öle oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstige Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- Bei schweren Leberfunktionsstörungen,
- Bei Verschluss der Gallenwege,
- Bei Gallenblasenentzündungen,
- Bei Gallensteinen,
- Bei Ileus (Darmverschluss).

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Dieses Arzneimittel enthält 0,2 mg Natriumethyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) (E 215) und 0,1 mg Natriumpropyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) (E 217) pro magensaftresistenter Weichkapsel. Natriumethyl-4-hydroxybenzoat und Natriumpropyl-4-hydroxybenzoat können allergische Reaktionen, auch mit zeitlicher Verzögerung, hervorrufen.

Dieses Arzneimittel enthält Formaldehyd. Formaldehyd kann Magenbeschwerden und Durchfall hervorrufen.

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro magensaftresistenter Weichkapsel, d.h., es ist nahezu „natriumfrei“.

Kinder

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. ROWAchol Kapseln sollten daher bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Anwendung von ROWAchol Kapseln zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Bei gleichzeitiger Einnahme von ROWAchol Kapseln und magensäurehemmenden Mitteln (Antazida) kann es zu einer vorzeitigen Auflösung des magensaftresistenten Überzugs der Kapseln und damit möglicherweise zu Magenbeschwerden und zu einer Verminderung der erwünschten Wirkung im Darm kommen.

ROWAchol Kapseln sollten bei einer Behandlung mit Arzneimitteln, deren Metabolisierung und Ausscheidung über die Leber erfolgt, lediglich mit Vorsicht angewendet werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. ROWAchol Kapseln sollten wegen nicht ausreichender Untersuchungen in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es gibt keine Hinweise auf eine Beeinträchtigung Ihrer Verkehrstüchtigkeit oder Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durch ROWAchol Kapseln.

3. Wie ist ROWAchol Kapseln anzuwenden?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren nehmen 3-4 mal täglich 1 magensaftresistente Weichkapsel eine 1/2 Stunde vor den Mahlzeiten ein. ROWAchol Kapseln werden unzerkaut mit einem Glas Wasser geschluckt.

Bei Auftreten von Beschwerden, die länger als 1 Woche andauern oder periodisch wiederkehren, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Wenn Sie eine größere Menge ROWAchol Kapseln eingenommen haben als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge an magensaftresistente Weichkapseln eingenommen haben als Sie sollten, benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie die Einnahme von ROWAchol Kapseln vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Nehmen Sie sie ein, sobald Sie sich daran erinnern. Fahren Sie dann mit der nächsten Dosis zur üblichen Zeit fort.

Wenn Sie die Einnahme von ROWAchol Kapseln abbrechen

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Gelegentliche Nebenwirkungen (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen):

Magenbeschwerden

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: <http://www.bfarm.de>, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist ROWAchol aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

ROWAchol Kapseln nicht über 25 °C aufbewahren.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis und dem Umkarton nach „verw. bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Das Arzneimittel ist nach dem Öffnen des Schnappdeckel-Glases 6 Monate, aber höchstens bis zu dem auf der Verpackung und dem Etikett genannten Verfalldatum haltbar.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was ROWAchol Kapseln enthalten

Die Wirkstoffe in einer magensaftresistenten Weichkapsel sind:

Levomenthol	32,0 mg
(-)-trans-Menthon	6,0 mg
α -Pinen	13,6 mg
β -Pinen	3,4 mg
endo-Borneol	5,0 mg
Cineol	2,0 mg
Camphen	5,0 mg

Die sonstigen Bestandteile sind:

Kapselinhalt: Natives Olivenöl.

Kapselhülle: Gelatine, Glycerol, Natriumethyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) (E 215), Natriumpropyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) (E 217), Chlorophyllin-Kupfer-Komplex, Natriumsalz (E 141).

Wie ROWAchol Kapseln aussehen und Inhalt der Packung

ROWAchol Kapseln sind grüne, kugelförmige, magensaftresistente Weichkapseln, die eine grünlich-gelbe Lösung mit einem starken aromatischen Geruch enthalten.

Originalpackungen mit 30, 50 und 100 Kapseln

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

ROWA WAGNER GmbH & Co. KG

Arzneimittelfabrik

Frankenforster Strasse 77

D-51427 Bergisch Gladbach

Telefon: +49-2204-61081

Telefax: +49-2204-61084

E-Mail: info@rowakg.de

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im September 2025.