



# Colocynthis

## Komplex

## Homöopathisches Arzneimittel

**Zusammensetzung:**

10 g (= 10,83 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Colocyntis D4 Dil., Chamomilla D4 Dil. je 5 g Dieses Präparat enthält 53,4 Vol.-% Alkohol.

**Packungsbeilage beachten!**

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

**Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!**

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 2513030.00.00

Inhalt: 50 m

Ch.-B.: 0000

**Verwendbar bis 00/0000**

## 8 Colocynthis Komplex

Homöopathisches Arzneimittel  
Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml  
1 g entspricht 21 Tropfen

### Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne  
Angabe einer therapeutischen Indikation.  
Hinweise: siehe Rückseite.

**Gegenanzeigen:**

Wann dürfen Sie 8 Colocynthis Komplex nicht einnehmen?

Wegen des Alkoholgehaltes soll 8 Colocynthis Komplex A  
bei Alkoholkranken nicht angewendet werden. w

Colocyntis Komplex enthält Chamomilla recutita und sollte daher bei Überempfindlichkeit gegen Kamille oder andere Korbblütler nicht angewandt werden.

Können Sie 8 Colocynthis Komplex erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?

egen des Alkoholgehaltes soll 8 Colocynthis Komplex  
i Leberkranken, Epileptikern und Personen mit  
ganischen Erkrankungen des Gehirns nur nach  
icksprache mit dem Arzt angewendet werden.

## Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und

**Warnhinweise:**

arnhinweis:  
Dieses Arzneimittel enthält 53,4 Vol.-% Alkoholo

Die maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung  
werden bis zu 0.33 g Alkohol zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

### Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht

### **Wirkungen Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite  
**Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:**  
 Soweit nicht anders verordnet 1-3mal täglich 5 Tropfe  
 vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem Teelöffel  
 Wasser einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

**Dauer der Anwendung:** siehe Rückseite

**Nebenwirkungen:** Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.

### Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

s siehe Rückse

Stand der Information: April 2016