



84 Malva Komplex

Homöopathisches Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen
Zusammensetzung:
 10 ml Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile:
 Asclepias tuberosa D3 Dil., Cactus D2 Dil., Guaiacum D4 Dil.,
 Kalium carbonicum D4 Dil., Malva sylvestris (HAB 1934) D2 Dil.
 (HAB, Vorschr. 3a), Balsamum peruvianum (HAB 1934) D4 Dil.
 (HAB, Vorschr. 5a, D1 bis D3 mit Ethanol 86 % m/m, D4 mit
 Ethanol 62 % m/m), Sanguinaria D4 Dil. je 1,4285 ml
 Dieses Präparat enthält 62,0 Vol.-% Alkohol.
 Packungsbeilage beachten!
 Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer
 therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden
 Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
 Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
 Rea.-Nr.: 484.00.00 Apothekenpflichtig Inhalt: 50 ml
Ch.-B.: 0000 **Verwendbar bis 00/0000**

Gebrauchsinformation
84 Malva Komplex
 Homöopathisches Arzneimittel
 Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml

Anwendungsgebiete:
 Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe
 einer therapeutischen Indikation. Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:
 Wann dürfen Sie 84 Malva Komplex nicht einnehmen? 84 Malva
 Komplex soll wegen des Alkoholgehaltes bei Alkoholkranken sowie
 bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Perubalsam nicht
 angewendet werden.
 Wann dürfen Sie 84 Malva Komplex erst nach Rücksprache mit
 dem Arzt anwenden? Bei bestehenden Lebererkrankungen oder
 solchen in der Vorgeschichte und/oder gleichzeitiger Anwendung

leberschädigender Stoffe soll 84 Malva Komplex nur nach
 Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
 Wegen des Alkoholgehaltes soll 84 Malva Komplex bei
 Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen
 Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt
 angewendet werden.
 Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?
 Aufgrund des Bestandteils Kanadischer Blutwurz (Sanguinaria) soll
 84 Malva Komplex in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht
 angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
 Warnhinweis:
 Dieses Arzneimittel enthält 62,0 Vol.-% Alkohol.
 Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bei
 der Akutdosierung bis zu 0,5 g Alkohol und bei der chronischen
 Dosierung bis zu 0,25 g Alkohol zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken,
 Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten
 sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer
 Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.
 Was ist bei Kindern zu berücksichtigen? Zur Anwendung dieses
 Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten
 Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht
 angewendet werden.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
 Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite
Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:
 Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle halbe bis
 ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je 5 Tropfen sowie bei
 chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich je 5 Tropfen mit einem
 Teelöffel Wasser vor bzw. zwischen den Mahlzeiten einnehmen.
 Die Akutdosierung sollte ohne medizinischen Rat nicht länger als 1

Woche erfolgen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit
 der Einnahme zu reduzieren. 1 ml entspricht etwa 25 Tropfen
Dauer der Anwendung: siehe Rückseite. Bei Anwendung über mehr
 als 4 Wochen sollten die Leberfunktionswerte kontrolliert werden.
Nebenwirkungen: Sehr selten können allergische
 Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. In Einzelfällen sind
 während der Anwendung sanguinarinhaltiger Arzneimittel Anstiege
 der Leberfunktionswerte (Transaminasen) und des Bilirubins bis hin
 zu einer arzneimittelbedingten Gelbsucht (medikamentös-toxische
 Hepatitis) beobachtet worden, die sich nach Absetzen des
 Arzneimittels wieder zurückbildeten. Hinweis: siehe Rückseite.
Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:
 siehe Rückseite
Stand der Information: April 2016