

*
1
3
4
0
1
9
1
0
*

184

**Momordica
Komplex**

Homöopathisches
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen
Zusammensetzung:
10 g (= 10,76 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame
Bestandteile: Basilicum, Herba D2 Dil., Natrium sulfuricum D3 Dil.,
Asperula odorata D2 Dil., Carbo vegetabilis D8 Dil., Gratiola D3 Dil.,
Lycopodium D4 Dil., Momordica balsamina D3 Dil., Tamarindus indica
(HAB 1934) D4 Dil. [HAB, Vorschr. 4a, Ø mit Ethanol 62 % (m/m)],
Magnesium carbonicum D8 Dil., Arum maculatum D3 Dil. je 1 g
Dieses Präparat enthält 50,0 Vol.-% Alkohol.
Packungsbeilage beachten!
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer
therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden
Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
Apothekenpflichtig
Reg.-Nr.: 2512430.00.00

Ch.-B.: 0000 **Verwendbar bis 00/0000**

Gebrauchsinformation
184 Momordica Komplex
Homöopathisches Arzneimittel
Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml
1 g entspricht 20 Tropfen.

Anwendungsgebiete:
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher
ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:
Wann dürfen Sie 184 Momordica Komplex nicht
einnehmen?
Wegen des Alkoholgehaltes soll 184 Momordica
Komplex bei Alkoholkranken nicht angewendet

werden.
Wann dürfen Sie 184 Momordica Komplex erst nach
Rücksprache mit dem Arzt anwenden?
Wegen des Alkoholgehaltes soll 184 Momordica
Komplex bei Leberkranken, Epileptikern und Personen
mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach
Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und
Warnhinweise:**
Warnhinweis:
Dieses Arzneimittel enthält 50,0 Vol.-% Alkohol.
Als maximale Tagesgabe nach der
Dosierungsanleitung werden bis zu 0,32 g Alkohol
zugeführt.
Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei

Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern,
Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für
Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer
Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.
Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit
beachten?
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur
Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit
vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach
Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen
keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es
soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht
angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite
Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet 1-3mal täglich 5 Tropfen
vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit
einem Teelöffel Wasser einnehmen.
Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit
der Einnahme zu reduzieren.
Dauer der Anwendung: siehe Rückseite
Nebenwirkungen:
Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.
**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des
Arzneimittels:** siehe Rückseite
Stand der Information: Mai 2016