

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Bei Fragen oder auftretenden Nebenwirkungen holen Sie bitte medizinischen Rat ein.

PROPOLIS Ø HANOSAN

Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung:

100 ml enthalten den Wirkstoff:
Propolis Ø (HAB, Vorschrift 4a,
mit Ethanol 62 % (m/m))

100 ml

Darreichungsform und Packungsgrößen:

Urtinktur

20 ml und 50 ml zum Einnehmen

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

HANOSAN GmbH, Hanosanstraße 1, D-30826 Garbsen
Telefon 05131 / 45930, Fax 05131 / 459345

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Halten die Krankheitssymptome während der Anwendung des Arzneimittels an, holen Sie bitte medizinischen Rat ein.

Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeit gegen Propolis oder Perubalsam.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Dieses Arzneimittel enthält 70 Vol.-% Alkohol.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor.

Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Nicht bekannt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren homöopathisch erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker.

Beeinflussung der Wirkung von anderen Arzneimitteln:

Nicht bekannt.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je 5 Tropfen, bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich, je 5 Tropfen vor den Mahlzeiten unverdünnt oder mit etwas lauwarmem Wasser oder Tee einnehmen.

Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker erfolgen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Hinweis: 1 ml entspricht 40 Tropfen.

Korrekte Anwendungstechnik für Tropfflaschen:

Um die Dosiergenauigkeit zu erhalten, sollte die Tropfflasche in einem Winkel von 45° gehalten werden.

Dauer der Anwendung:

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Nebenwirkungen:

In seltenen Fällen können bei der Einnahme von PROPOLIS Ø HANOSAN allergische Reaktionen an Mund- bzw. Rachenschleimhaut auftreten. In diesen Fällen setzen Sie das Arzneimittel bitte ab und befragen Ihren homöopathisch erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker. Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren homöopathisch erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker befragen.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit:

Das Arzneimittel soll nach Ablauf des auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Eventuell auftretende Trübungen oder Ausfällungen rühren von dem in Naturheilmitteln enthaltenen komplexen Gemisch an Inhaltsstoffen her. Da es sich bei Propolis um ein Naturprodukt handelt, sind leichte Farb- und Geschmacksunterschiede möglich. Die Wirksamkeit und Verträglichkeit wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Vor Gebrauch schütteln!

Nicht über 25°C lagern!

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Stand der Information: November 2016

