

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

VERRUCID®

10 % Lösung

Zur Anwendung bei Kindern und Erwachsenen
Salicylsäure

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 6 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Verrucid und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Verrucid beachten?
3. Wie ist Verrucid anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Verrucid aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Verrucid und wofür wird es angewendet?

Verrucid ist eine 10%ige Lösung von Salicylsäure (ein Schälmittel gegen Verhornungsstörungen). Es wird bei Kindern und Erwachsenen äußerlich auf der Haut zur Behandlung von Warzen sowie bei Hühneraugen und Hornschwielen angewendet.

Wenn Sie sich nach 6 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Verrucid beachten?

Verrucid darf nicht angewendet werden

- wenn Sie allergisch gegen Salicylsäure, Salicylate oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Verrucid sollte nicht angewendet werden bei Säuglingen und bei Patienten mit Niereninsuffizienz.

Verrucid darf nicht mit Schleimhäuten in Berührung kommen, insbesondere ist ein Kontakt mit den Augen zu vermeiden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Verrucid anwenden.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Verrucid ist erforderlich, wenn Verrucid in der Nähe von Entzündungen und Wunden aufgetragen wird. Falls Augen und Schleimhäute in Kontakt mit Verrucid gekommen sind, sollen diese mit Wasser gespült werden.

Verrucid darf nicht im Gesichts- oder Genitalbereich angewendet werden.

Warzen sind übertragbar! Um eine Infektionsausbreitung zu verhindern, sollte das eigene Handtuch nie zur Mitbenutzung an Andere weitergegeben werden. Bei Vorhandensein von Fußwarzen nicht barfuß gehen.

Anwendung von Verrucid zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Salicylsäure kann das Eindringen anderer lokal aufgetragener Arzneimittel in die Haut verstärken. In die Blutbahn aufgenommene Salicylsäure kann schädliche Auswirkungen von Methotrexat erhöhen und die blutzuckersenkende

Wirkung von Sulfonylharnstoffen verstärken.

Anwendung von Verrucid zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Während der Anwendung von Verrucid sollten Sie nicht gleichzeitig essen oder trinken.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Sie sollten Verrucid während der Schwangerschaft nicht anwenden, außer zur kurzfristigen Behandlung einer kleinen einzelnen Hautfläche, kleiner als 5 cm².

Orale Darreichungsformen (z. B. Tabletten) dieser Substanzklasse können bei Ihrem ungeborenen Kind Nebenwirkungen verursachen. Es ist nicht bekannt, ob für Verrucid das gleiche Risiko besteht, wenn es auf der Haut angewendet wird.

Es sollte ferner nicht an der Brust von stillenden Müttern angewendet werden. Sollte der Arzt eine regelmäßige Behandlung großer Hautflächen mit Verrucid für notwendig halten, so ist frühzeitig abzustillen, da Risiken wegen mangelnder Entgiftung bei Neugeborenen nicht auszuschließen sind.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Keine Beeinträchtigung.

Verrucid enthält Alkohol

Dieses Arzneimittel enthält 14,4 mg Alkohol (Ethanol) pro Milliliter Lösung (1,44 % w/v). Bei geschädigter Haut kann es ein brennendes Gefühl hervorrufen. Verrucid ist leicht flüchtig und entflammbar. Von offenem Feuer und Flammen fernhalten!

3. Wie ist Verrucid anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis: Verrucid wird zweimal täglich auf die zu behandelnden Hautbereiche aufgetragen.

Die Lösung wird mit dem am Flaschenverschluss angebrachten Pinsel auf Warzen, Hühneraugen und Hornschwielen aufgetragen. Verrucid ist täglich anzuwenden. Vor jedem neuen Auftragen von Verrucid sollte der vorhandene Pyroxylinfilm entfernt werden. Verrucid wirkt nur äußerlich und darf nicht eingenommen werden. Bei der Applikation von Verrucid ist darauf zu achten, dass die Lösung nicht auf die gesunde Haut fließt. Nach erfolgreicher Behandlung sollte noch 1 Woche lang weiterbehandelt werden. Die durchschnittliche Anwendungsdauer beträgt 6 Wochen.

Kinder

Die Erfahrung bei Kindern ist begrenzt. Aus Sicherheitsgründen sollte daher die maximale Tagesdosis von 1 ml Lösung nicht überschritten und die Gesamtanwendungsdauer auf maximal 6 Wochen beschränkt werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Verrucid angewendet haben, als Sie sollten

Als Gegenmaßnahme empfiehlt sich, das überschüssig applizierte Arzneimittel sofort mit warmem Wasser wegzuspülen.

Wenn Sie die Anwendung von Verrucid vergessen haben
Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben, sondern setzen Sie die Behandlung, wie vorgesehen, fort.

Wenn Sie die Anwendung von Verrucid abbrechen

Bei vorzeitigem Absetzen dieses Arzneimittels kann die Verhornungsstörung weiterhin bestehen bleiben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

- Gelegentlich: kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen
Sehr selten: kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten betreffen

Nach dem Auftragen kann es gelegentlich zu lokaler Reizung, meistens leichtem Brennen, und sehr selten zu Kontaktallergie kommen.

Sehr selten können die folgenden Nebenwirkungen auftreten: Teleangiektasien (Erweiterung und Vermehrung kleiner oberflächlicher Hautgefäße), braune Flecken, Photosensibilisierung (erhöhte Lichtempfindlichkeit der Haut), Dermatitis (entzündliche Hautreaktion), Verdünnung der Oberhaut und Pigmentstörungen.

Wenn Sie von einer der genannten Nebenwirkungen betroffen sind, setzen Sie Verrucid ab und suchen Sie ihren Arzt möglichst umgehend auf.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Webseite: <http://www.bfarm.de>, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Verrucid aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf. Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und auf dem Etikett der Flasche nach „Verw. bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Aufbewahrungsbedingungen

Die Flasche sollte immer gut verschlossen aufbewahrt werden. Das Lösungsmittel ist leicht flüchtig und ent-

flammbar. Das Lösungsmittel kann schnell verfliegen, so dass die Lösung eintrocknet.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch

Nach Anbruch des Behältnisses ist das Arzneimittel bei vorschriftsmäßigem Gebrauch in der Regel 6 Wochen haltbar. Sie dürfen dieses Arzneimittel nicht verwenden, wenn Sie Folgendes bemerken: Durch Stehenlassen der offenen Flasche ist das flüchtige Lösungsmittel weitgehend verdunstet.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Verrucid enthält

- Der Wirkstoff ist: Salicylsäure. 1 g Lösung enthält 100 mg Salicylsäure.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Essigsäure 99 %, Docusat-Natrium, Rizinusöl, Pyroxylin, Ethanol 96 %, Aceton, (2-Methylpropyl)acetat.

Wie Verrucid aussieht und Inhalt der Packung

Verrucid ist eine farblose bis hellgelbe Lösung mit stechendem Geruch nach Essigsäure.

Eine Packung enthält eine Flasche mit 10 ml Lösung mit Schraubverschluss und Pinsel.

Pharmazeutischer Unternehmer

INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH
Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim
www.infectopharm.com

Hersteller

Paul W. Beyvers GmbH
Schaffhausener Straße 26-34, 12099 Berlin (Tempelhof)

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2024.

ZUSATZINFORMATION FÜR DEN PATIENTEN

Liebe Patientin, lieber Patient,

Verrucid ist ein Arzneimittel, das bei richtiger Anwendung geeignet ist, eine Reihe von Verhornungsstörungen wie Warzen, Hühneraugen und Schwielen zu beseitigen. Wir möchten Ihnen im Folgenden einige Hinweise zur Zusammensetzung und Wirkungsweise geben und Ihnen durch einige Tipps die Anwendung erleichtern.

Die Inhaltsstoffe von Verrucid haben unterschiedliche Aufgaben, wobei die von der Salicylsäure ausgehende arzneiliche Wirkung durch andere Bestandteile des Arzneimittels und Hilfsstoffe unterstützt wird.

Salicylsäure weicht die Hornhautschicht auf und löst sie ab. Essigsäure wirkt leicht ätzend auf Warzen und Hühneraugen und fördert das Eindringen von Salicylsäure in tiefere Hautschichten.

Docusat-Natrium hat zwar einen komplizierten Namen, ist jedoch aus dem Alltag gut bekannt: Es ist in vielen Waschmitteln und Geschirrspülmitteln enthalten, weil es hartnäckige Verbindungen unterschiedlicher Stoffe aufzulösen vermag (z. B. Schmutz und Gewebe). Im Verrucid dient es als Netzmittel und gewährleistet, dass die Lösung selbst in die feinsten Hautspalten eindringt und dort ihre Wirkung entfaltet.

Rizinusöl verhindert als fettes Öl ein zu starkes Austrocknen und Einreißen der Haut durch die Behandlung.


Das gelöste Pyroxylin bildet nach dem Auftragen schnell ein weißes Häutchen auf der Hornschicht, mit dem der Wirkstoff am Ort festgehalten wird.

Die Anwendung

Bitte lesen Sie die folgenden Zeilen genau durch, denn eine richtige Anwendung ist die Voraussetzung für den bestmöglichen Erfolg:

Wenden Sie Verrucid beim ersten Male abends an. Baden Sie vor der Anwendung Ihre Füße oder Hände (je nach Anwendungsstelle) in einer Seifenlauge: lösen Sie dazu etwas Seife im Handwaschbecken oder einer Schüssel auf.

Nach dem Bad erfolgt die erste Anwendung (siehe Abbildung). Hierzu tragen Sie mit dem am Flaschenverschluss befindlichen Pinsel etwas Verrucid auf die betreffende Stelle auf und lassen die Lösung antrocknen: Es bildet sich ein weißes Häutchen. Wiederholen Sie die Anwendung zweimal täglich. Jeweils vor erneutem Auftragen von Verrucid sollte der vorhandene Film vorsichtig mit einem Hornhauthobel oder einer Nagelfeile abgetragen werden. Während der Behandlungszeit sollten Sie die Seifenbäder häufiger wiederholen, weil hiernach die durch Verrucid aufgeweichten Hornschichten besonders gut abzulösen sind. Die Anwendungszeit hängt von der Stärke der Verhornung ab; sie beträgt durchschnittlich 6 Wochen.



Weitere Hinweise

Es gibt leider einige Verhornungsstörungen, die so stark ausgebildet sind oder so tief in die Haut reichen, dass auch sorgfältigste Anwendung von Verrucid nicht zum Erfolg führt. Wenden Sie sich bitte in solchen Fällen an Ihren Arzt bzw. Hautarzt; er wird versuchen, Ihnen auf andere Weise zu helfen. Gute Besserung wünscht



Arzneimittel und Consilium GmbH

226160011G03