

# RELIVORA® KOMPLEX

Homöopathisches Arzneimittel  
Mischung

Zur Anwendung bei Kindern ab 1 Jahr, Jugendlichen und Erwachsenen

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

**Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss RELIVORA® Komplex jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt oder Heilpraktiker aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist **RELIVORA® Komplex** und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von **RELIVORA® Komplex** beachten?
3. Wie ist **RELIVORA® Komplex** einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist **RELIVORA® Komplex** aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

## 1. WAS IST RELIVORA® KOMPLEX UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

RELIVORA® Komplex ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

## 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON RELIVORA® KOMPLEX BEACHTEN?

**RELIVORA® Komplex darf nicht eingenommen werden**

- bei Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe, gegen Echinacea (Sonnenhut) oder andere Korbblütler;
- in der Schwangerschaft;
- bei Kindern unter 1 Jahr.
- Aus grundsätzlichen Erwägungen ist RELIVORA® Komplex nicht anzuwenden bei fortschreitenden Systemerkrankungen (wie Tuberkulose, Sarkoidose), systemischen Erkrankungen des weißen Blutzellsystems (z.B. Leukämie bzw. Leukämie-ähnlichen Erkrankungen), Autoimmunerkrankungen (z.B. entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebes (Kollagenosen), multipler Sklerose), Immundefizienz (AIDS / HIV-Infektionen), Immunsuppression (z.B. nach Organ- oder Knochenmarktransplantation, Chemotherapie bei Krebserkrankungen) sowie chronischen Viruserkrankungen.

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von RELIVORA® Komplex ist erforderlich:**

Bei Patienten mit atopischen Erkrankungen (z.B. Neurodermitis, allergisches Asthma, Heuschnupfen) besteht möglicherweise ein erhöhtes Risiko eines anaphylaktischen Schocks. Deshalb sollte RELIVORA® Komplex von Patienten mit atopischen Erkrankungen nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Wegen des Alkoholgehaltes sollte RELIVORA® Komplex bei Leberkranken, Epileptikern und bei Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Kinder:**

Das Arzneimittel darf bei Kindern unter 1 Jahr nicht angewendet werden.

**Stillzeit:**

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte RELIVORA® Komplex in der Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Bei Einnahme von RELIVORA® Komplex mit anderen Arzneimitteln:**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Heilpraktiker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

**Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von RELIVORA® Komplex:** Enthält 32 mg Alkohol (Ethanol) pro 5 Tropfen entsprechend 28 Vol%.

Die Menge in 5 Tropfen dieses Arzneimittels entspricht weniger als 0,8 ml Bier oder 0,3 ml Wein. Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

## 3. WIE IST RELIVORA® KOMPLEX EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie RELIVORA® Komplex immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen der Arzt RELIVORA® Komplex nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da RELIVORA® Komplex sonst nicht richtig wirken kann!

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6x täglich, je 5 Tropfen ein.

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen nehmen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren 1 bis 3 mal täglich jeweils 5 Tropfen ein.

Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenenendosis. Kleinkinder ab 1 Jahr bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte der Erwachsenenendosis.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

### Art der Einnahme:

Die Tropfen sind unverdünnt einzunehmen und einige Zeit im Mund zu belassen. Die Einnahme ist unabhängig von den Mahlzeiten.

### Wie lange sollten Sie RELIVORA® Komplex einnehmen:

RELIVORA® Komplex sollte ohne ärztlichen Rat nicht länger als 10 Tage angewendet werden. Die Wirkungsdauer einer Arzneimittelgabe kann individuell verschieden sein. Wenden Sie sich daher bei Fragen zur Dauer der Anwendung an Ihren Arzt. Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

**Wenn Sie eine größere Menge RELIVORA® Komplex eingenommen haben, als Sie sollten:** Von den homöopathischen Bestandteilen sind keine Vergiftungserscheinungen zu erwarten.

### Nur für die 100 ml Packung:

Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann insbesondere bei Kleinkindern zu einer Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist.

Bei Einnahme des gesamten Flascheninhaltes werden 22 g Alkohol aufgenommen.

### Wenn Sie die Einnahme von RELIVORA® Komplex vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben, sondern dosieren Sie die Tropfen weiter wie oben angegeben.

### Wenn Sie die Einnahme von RELIVORA® Komplex abbrechen

Es kann damit gerechnet werden, dass die Symptome erneut auftreten.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut (Echinacea) wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall, anaphylaktischer Schock, Stevens Johnson Syndrom beobachtet.

Bei Patienten mit atopischen Erkrankungen (z.B. Heuschnupfen, Neurodermitis, allergisches Asthma) können allergische Reaktionen ausgelöst werden. In diesen Fällen sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt aufsuchen.

Die Einnahme von Arzneimitteln mit Zubereitungen aus Sonnenhut wird mit dem Auftreten von Autoimmunerkrankungen in Verbindung gebracht (Multiple Sklerose (Encephalitis disseminata), Erythema nodosum, Immunothrombozytopenie, Evans-Syndrom, Sjögren-Syndrom mit renaler tubulärer Dysfunktion). Bei Langzeitanwendung (länger als 8 Wochen) können Blutbildveränderungen (Verminderung der weißen Blutzellen (Leukopenie)) auftreten. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Hinweis:** Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

**Meldung von Nebenwirkungen:** Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de), anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## 5. WIE IST RELIVORA® KOMPLEX AUFZUBEWAHREN?

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Flaschenetikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

### Aufbewahrungsbedingungen:

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Entsorgen Sie das Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter [www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung](http://www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung).

## 6. WEITERE INFORMATIONEN

### Was RELIVORA® Komplex enthält:

10 ml enthalten an Wirkstoffen:

|   |          |
|---|----------|
| Drosera D3 dil.   | 0,25 ml  |
| Echinacea D2 dil.   | 0,025 ml |
| Juglans (HAB 1934) D4 dil. (HAB, Vorschrift 3a)               | 2,5 ml   |
| Sonstige Bestandteile: Ethanol 30% (m/m), gereinigtes Wasser. |          |
| 35 Tropfen entsprechen 1 ml RELIVORA® Komplex.                |          |

### Inhalt der Packung:

Originalpackung mit 30 ml / 100 ml Mischung.



Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

**SANUM-Kehlbeck**  
GmbH & Co. KG

Postfach 1355 · D-27316 Hoya

Tel.: (0 42 51) 9 35 20 · Fax: (0 42 51) 93 52 291

E-Mail: [info@sanum.com](mailto:info@sanum.com)

Reg.-Nr.: 7549.00.00

Apothekenpflichtig

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt im Juni 2023 überarbeitet.**

Zur weiteren Anwendung steht RELIVORA® Komplex, Flüssige Verdünnung zur Injektion zur Verfügung.



Trennung an der abstehenden Lasche anfassen und rundherum abziehen.



Weißer Schutzkappe mit Daumen und Zeigefinger kräftig anfassen und zur Seite abknicken.



Tropfenweise Entnahme durch vorsichtiges Zusammendrücken der Gummipipette mit Daumen und Zeigefinger



Nach Gebrauch Schutzkappe fest aufdrücken bis sie hörbar einrastet. Hierdurch dichter Verschluss der Tropfflasche.