

*
4
5
3
4
8
4
4
0
*

47 Cimicifuga F Komplex

Homöopathisches
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen
Zusammensetzung:
10 g (= 10,70 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cimicifuga Dil. D3, Cantharis Dil. D4, Conium Dil. D4, Graphites Dil. D8, Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D8, Platinum chloratum Dil. D6, Pulsatilla Dil. D4, Sabina Dil. D4, Secale cornutum Dil. D4, Hydrastis Dil. D4, je 1,0 g
Dieses Präparat enthält 48,9 Vol.-% Alkohol.
Packungsbeilage beachten!
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
Apothekenpflichtig Nicht über 25°C aufbewahren.
Reg.-Nr.: 2512462.00.00 Inhalt: 50 ml
Ch.-B.: 0000 Verwendbar bis 00/0000

Gebrauchsinformation
47 Cimicifuga F Komplex
Homöopathisches Arzneimittel
Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml
1 g entspricht 20 Tropfen
Anwendungsgebiete:
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Hinweise: siehe Rückseite.
Gegenanzeigen:
Wann dürfen Sie 47 Cimicifuga F Komplex nicht einnehmen?
47 Cimicifuga F Komplex soll wegen des Alkoholgehaltes bei Alkoholkranken sowie bei einer Überempfindlichkeit gegen Platinverbindungen nicht angewendet werden.

Wann dürfen Sie 47 Cimicifuga F Komplex erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden? Wegen des Alkoholgehaltes soll 47 Cimicifuga F Komplex bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Warnhinweis:
Dieses Arzneimittel enthält 48,9 Vol.-% Alkohol.
Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bei der Akutdosierung bis zu 0,62 g Alkohol und bei der chronischen Dosierung bis zu 0,31 g Alkohol zugeführt.
Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die

Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.
Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte das Arzneimittel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite
Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle

halbe bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je 5 Tropfen in Flüssigkeit einnehmen. Die Einnahme sollte ohne medizinischen Rat nicht länger als 1 Woche erfolgen.
Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich 5 Tropfen in Flüssigkeit einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.
Dauer der Anwendung: siehe Rückseite
Nebenwirkungen:
Nach Anwendung kann verstärkt Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen. Wegen des Bestandteils „Mercurius“ (Quecksilber) können gelegentlich allergische Reaktionen auftreten. Hinweis: siehe Rückseite.
Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:
siehe Rückseite
Stand der Information: November 2017