

* 4 1 4 4 4 8 4 4 0 *

54 Lilium K Komplex

Homöopathisches Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen
Zusammensetzung:
 10 g (= 10,96 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Senecio aureus Dil. D6, Aletris farinosa Dil. D3, Helonias dioica Dil. D3, Hydrastis Dil. D4, Hypericum Dil. D2, Nuxvomica Dil. D4, Pulsatilla Dil. D4, Thuja Dil. D3, Lilium tigrinum Dil. D3, je 1,1111 g
 Dieses Präparat enthält 59,4 Vol.-% Alkohol.
 Packungsbeilage beachten!
 Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
 Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
 Apothekenpflichtig
 Reg.-Nr.: 2512373.00.00
Ch.-B.: 0000

Inhalt: 50 ml
Verwendbar bis 00/0000

Gebrauchsinformation
54 Lilium K Komplex
 Homöopathisches Arzneimittel
 Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml
 1 g entspricht 22 Tropfen
Anwendungsgebiete:
 Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
 Hinweise: siehe Rückseite.
Gegenanzeigen:
 Wann dürfen Sie 54 Lilium K Komplex nicht einnehmen?
 Wegen des Alkoholgehaltes soll 54 Lilium K Komplex bei Alkoholkranken nicht angewendet werden.
 Wann dürfen Sie 54 Lilium K Komplex erst nach

Rücksprache mit dem Arzt anwenden?
 Wegen des Alkoholgehaltes soll 54 Lilium K Komplex bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
 Warnhinweis:
 Dieses Arzneimittel enthält 59,4 Vol.-% Alkohol.
 Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bei der Akutdosierung bis zu 0,7 g Alkohol und bei der chronischen Dosierung bis zu 0,35 g Alkohol zugeführt.
 Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die

Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.
 Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?
 Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte das Arzneimittel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
 Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:
 Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
 Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite

Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:
 Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je 5 Tropfen in Flüssigkeit einnehmen. Die Einnahme sollte ohne medizinischen Rat nicht länger als 1 Woche erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich 5 Tropfen in Flüssigkeit einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.
Dauer der Anwendung: siehe Rückseite
Nebenwirkungen: Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.
Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: siehe Rückseite
Stand der Information: April 2016