

* 3 3 7 4 8 4 4 0 *

129

Verbascum F Komplex

Homöopathisches Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen
Zusammensetzung: 10 g (= 10,90 ml) Mischung enthalten:
 Arzneilich wirksame Bestandteile: Verbascum D3 Dil., Asarum D12 Dil., Iris D3 Dil., Actaea D3 Dil., Strontium chloratum D4 Dil. [HAB, Vorschr. 5a, Lösung D1 mit Ethanol 43 % (m/m)], Crocus D4 Dil., Gelsemium D4 Dil., Melilotus officinalis D4 Dil., Melissa officinalis D3 Dil. je 1,1111 g
 Dieses Präparat enthält 56,8 Vol.-% Alkohol.
 Packungsbeilage beachten!
 Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
 Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
 Apothekenpflichtig Nicht über 25° C aufbewahren
 Reg.-Nr.: 2512449.00.00 Inhalt: 50 ml

Ch.-B.: 0000 Verwendbar bis 00/0000

Gebrauchsinformation
129 Verbascum F Komplex
 Homöopathisches Arzneimittel
 Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml
 1 g entspricht 22 Tropfen

Anwendungsgebiete:
 Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
 Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:
 Wann dürfen Sie 129 Verbascum F Komplex nicht einnehmen?
 Wegen des Alkoholgehaltes soll 129 Verbascum F Komplex bei Alkoholkranken nicht angewendet werden.
 Wann dürfen Sie 129 Verbascum F Komplex erst nach

Rücksprache mit dem Arzt anwenden?
 Wegen des Alkoholgehaltes soll 129 Verbascum F Komplex bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
 Warnhinweis:
 Dieses Arzneimittel enthält 56,8 Vol.-% Alkohol.
 Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bei der Akutdosierung bis zu 0,67 g Alkohol und bei der chronischen Dosierung bis zu 0,33 g Alkohol zugeführt.
 Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und

Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.
 Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?
 Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
 Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:
 Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
 Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite
Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je 5 Tropfen vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem Teelöffel Wasser einnehmen. Die Einnahme sollte ohne medizinischen Rat nicht länger als 1 Woche erfolgen.
 Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich 5 Tropfen mit einem Teelöffel Wasser einnehmen.
 Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.
Dauer der Anwendung: siehe Rückseite
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
 Hinweis: siehe Rückseite.
Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: siehe Rückseite
Stand der Information: November 2017