* 0 4 4 8 4 8 1 6 *

182
Bismutum
F Komplex

Homöopathisches Arzneimittel

Tabletten zum Einnehmen
Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Thymus vulgaris Trit. D2, Bismutum subnitricum Trit. D3, Stibium sulfuratum nigrum Trit. D6, Carbo vegetabilis Trit. D4, Magnesium carbonicum Trit. D3, Magnesium phosphoricum Trit. D3 je 22,5 mg. Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat, Kartoffelstärke. Enthält Lactose. Packungsbeilage beachten!
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
Nicht über 25 °C aufbewahren. Apothekenpflichtig
Req.-Nr.: 2513056.00.00 Inhalt: 120 Tabletten

Ch.-B.: 0000 **Verwendbar bis 00/0000**

Gebrauchsinformation
182 Bismutum F Komplex
Homöopathisches Arzneimittel
Tabletten, Originalpackung mit 120 Tabletten

Anwendungsgebiete:
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Hinweise: siehe Rückseite.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte das Arzneimittel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter: Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Was müssen Sie vor der Anwendung von 182 Bismutum F Komplex beachten? Besondere Vorsicht bei der Anwendung von 182 Bismutum F Komplex ist erforderlich. Wichtige Warnhinweise über bestimmte Bestandteile von 182 Bismutum F Komplex. Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie 182 Bismutum F Komplex daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite
Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je 1 Tablette vor bzw. zwischen den Mahlzeiten einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.
Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich je 1 Tablette einnehmen.
Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.
Dauer der Anwendung: siehe Rückseite

Hinweise für den Fall der Überdosierung:
Was ist zu tun, wenn 182 Bismutum F Komplex in zu großen Mengen eingenommen wurde?
Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: siehe Rückseite.
Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: siehe Rückseite.
Das Arzneimittel ist nach Anbruch des Behältnisses 6 Monate haltbar.
Stand der Information: Juli 2016