

HAUTDESINFEKTION

DESCODERM® HAUTDESINFEKTION



PREVENT

ALKOHOLISCHES HAUTDESINFEKTIONSMITTEL 2-PROPANOL 70 % (V/V)

1 / 3

bakterizid, tuberkulozid, levurozid
parfümfrei
begrenzt viruzid



VAH

HAUTDESINFEKTION

DESCODERM® HAUTDESINFEKTION



PREVENT

PRODUKTBESCHREIBUNG

2 / 3

Alkoholisches, parfümfreies Desinfektionsmittel zum Aufsprühen auf die Haut. Ohne kumulierende Langzeitwirkstoffe oder sonstige Zusatzstoffe, daher sehr hautverträglich. Dermatologisch getestet und geeignet für haut- bzw. allergieempfindliche Personen.

ANWENDUNGEN UND HINWEISE

Stoff- oder Indikationsgruppe

Desinfektionsmittel.

Darreichungsform

Lösung.

Art der Anwendung

Zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen.

Anwendungsgebiete

Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktions peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktions von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut; Kühlumschläge.

Dosierung und Art der Anwendung

Zur Desinfektion vor einfachen Injektionen und Punktions peripherer Gefäße wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 15 Sekunden lang feucht gehalten. Zur Desinfektion vor Operationen und vor Punktions von Gelenken wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 1 Minute lang feucht gehalten. Zur Desinfektion von talgdrüsenreicher Haut wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 10 Minuten* lang feucht gehalten. Für Kühlumschläge ist die Lösung mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anzuwenden.

*Gemäß VAH Zertifikat wurde eine Einwirkzeit von 3 min für die Desinfektion von talgdrüsenreicher Haut bestätigt.

Hinweise

Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwerissen (z.B. feuchte Haut, Verschmutzungen der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern. Die Lösung wirkt nicht sporenbekämpfend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet.

Ein Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

Gegenanzeigen

Nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Keine bekannt.

Nebenwirkungen

Beim Einreiben in die Haut können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht hier angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, (www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: Wirksamer Bestandteil: 2-Propanol 63,1 g; Sonstiger Bestandteil: gereinigtes Wasser.

Warnhinweise

Leicht entzündlich! Von Zündquellen fern halten! Dicht verschlossen lagern. Bei Ver-schütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Produktstatus

Zugelassen nach AMG (Arzneimittelgesetz) in Deutschland

Zul.-Nr.: 1599.98.99

Stand der Information: 12/2021

HAUTDESINFEKTION

DESCODERM® HAUTDESINFEKTION



PREVENT

3 / 3

WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN

WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN	15 s	30 s	1 min	1,5 min	3 min
Hautantiseptik					
Anwendungsempfehlung zur Hautantiseptik vor Injektionen und Punktions	VAH	●			
Anwendungsempfehlung zur Hautantiseptik vor Punktions von Gelenken, Körperhöhlen und Hohlorganen sowie operativen Eingriffen	VAH		●		
Anwendungsempfehlung zur Hautantiseptik auf talgdrüsenreicher Haut ¹	VAH			●	

¹ – VAH-gelistet zur Hautantiseptik von talgdrüsenreicher Haut mit 3 Min. Einwirkzeit. Einwirkzeit gem. Zulassung: 10 Min.

GEBINDE

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Art. Nr.	PZN	Zulassungsnummer
DESCODERM Hautdesinfektion	Sprühflasche	30	250 ml	00-401-0025	04606343	1599.98.99

ZERTIFIZIERUNGEN



Good
Manufacturing
Practice



Good
Manufacturing
Practice



VCI



Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.

DESCODERM® Hautdesinfektion

Wirkstoff: 2-Propanol 70% (V/V). Alkoholische Hautdesinfektion.

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: 63,1 g 2-Propanol. Sonstiger Bestandteil: gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktions peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktions von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut, Kühlumschläge.

Gegenanzeigen: Nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet.

Nebenwirkungen: Beim Einreiben der Haut sind Rötungen und leichtes Brennen

möglich.

Warnhinweise: Leicht entzündlich! Von Zündquellen fernhalten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie die Beseitigung von Zündquellen. Stand: 12/2021

Hersteller/Pharmazeutischer Unternehmer:

Dr. Schumacher GmbH, Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld, Tel. 05664/9496-0, info@schumacher-online.com.