



Orales öliges Gel aus Tocopherolacetat 100%

1 Tube 8 ml mit Applikator

OHNE KONSERVIERUNGSTOFFE

OHNE ALKOHOL

Nickel und Gluten getestet

Nickel < 1 ppm - Gluten < 10 ppm

ZUSAMMENSETZUNG

Tocopherolacetat

HERSTELLER



PANIN S.R.L.

Viale della Scienza 24 - 45100 Rovigo (ITALY)

VERTRIEB ÜBER

HULKA S.R.L., Viale della Scienza, 26 - 45100 Rovigo (ITALY)

WANN WIRD DIESES MEDIZINPRODUKT ANGEWENDET?

FILME OS ist ein Medizinprodukt auf der Basis von Tocopherolacetat (Vitamin E), welches einen schützenden Film bildet und Läsionen des Mundbereiches isoliert und den Schmerz entzündeter und traumatisierter Schleimhäute sowie das Risiko weiterer Irritationen reduziert. Der durch das Vitamin E entstandene schützende Film unterstützt die physiologischen Heilungsprozesse. FILME OS kann auf Aphten, Stomatitis verschiedener Art und kleinen, durch Zahnsparungen oder feste oder mobile Prothesen entstandenen Läsionen aufgetragen werden. FILME OS brennt nicht bei Kontakt und enthält keine Farb- und Konservierungsstoffe.

Geeignet zur Behandlung der Aphten bei Kindern und Erwachsenen. Trägt zur Reduzierung des Biofilms bei, wobei es die physiologische Mikrobiota der Haut und der Mundschleimhaut in gutem Zustand hält.

GEGENANZEIGEN

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber den Inhaltsstoffen.

WICHTIGE HINWEISE UND SPEZIELLE VORSICHTSMAßNAHMEN ZUR ANWENDUNG

Nicht injizieren. Nicht Einatmen. Kontakt mit den Augen vermeiden. Unbedenklich bei zufälliger Einnahme.

ARZNEIMITTELWECHSELWIRKUNGEN UND ANDERE INTERAKTIONEN

Es sind keine Wechselwirkungen mit Arzneimitteln oder anderen Produkten zur oralen Anwendung bekannt. Sollte ein Mundwasser zur Mundhygiene benutzt werden, tragen Sie FILME OS mindestens 5 Minuten nach der Anwendung desgleichen an.

WIE WIRD DIESES MEDIZINPRODUKT ANGEWENDET

Um der Geschwürbildung der Aphten entgegenzuwirken, FILME OS schon bei den ersten Anzeichen wie Brennen oder Prickeln 3mal täglich über 4/5 Tage auftragen. Die Aufbewahrung im Kühlschrank erhöht die Viskosität des Gels und bedingt somit eine stärkere Linderung der Symptome.

Einen oder zwei Tropfen des öligen Gels so auftragen, dass die Läsion völlig abgedeckt ist, eventuell mit Hilfe eines Fingers. Nicht einmassieren und für 1-2 Minuten die Berührung mit der Zunge vermeiden, um die Bildung des Schutzfilms zu unterstützen. Wir empfehlen Sie, das Produkt mindestens eine Stunde vor dem Essen aufzutragen.

- Den Verschluss der Tube abnehmen
- Den für die Tube bestimmten Applikator aufsetzen und darauf achten, dass dieser korrekt aufgeschraubt wird
- Vor der Anwendung die Schutzkappe des Applikators abnehmen
- FILME OS auf die zu behandelnde Stelle so auftragen, dass die Läsion völlig abgedeckt ist
- Für 1-2 Minuten eine Berührung der behandelten Stelle mit der Zunge vermeiden
- Nach der Anwendung den Applikator mit der Schutzkappe verschließen
- Es ist nicht notwendig, den Applikator abzunehmen

ART UND WEISE DER VERABREICHUNG

Zur äußerlichen Anwendung. Bei Anwendung mit dem Finger vorher die Hände waschen.

HÄUFIGKEIT UND WANN DAS MEDIZINPRODUKT ANGEWENDET WIRD

Die Anwendung kann 3-4mal täglich, je nach Bedarf auch häufiger, vorrangig zwischen den Mahlzeiten, wiederholt werden. Im Falle von anhaltenden Beschwerden einen Arzt befragen.

UNERWÜNSCHTE NEBENWIRKUNGEN

Auch wenn FILME OS im Allgemeinen gut vertragen wird, kann es in seltenen Fällen zu Brennen, Irritationen und allergieähnlichen Symptomen kommen. In diesen Fällen die Anwendung unterbrechen und einen Arzt befragen. Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

AUFBEWAHRUNG DES MEDIZINPRODUKTES

Bei Zimmertemperatur aufbewahren. Nicht nach Ablauf des Verfalldatums auf der inneren und äusseren Verpackung anwenden.

MEDIZINPRODUKT. AUßERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN
NACH GEBRAUCH, BESEITIGEN SIE GEMÄSS DEN GELTENDEN NATIONALEN VORSCHRIFTEN
FREISETZUNG IN DIE UMWELT VERMEIDEN

CE 0476