Omeprazol - 1 A Pharma® 20 mg bei Sodbrennen

aftresistente Harti

na bei Erv enrezol

- elleicht möchten Sie diese später nochmals lesen, reitere Informationen oder einen Rat benötigen. wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Di koungsbellage angegeben sind. Siehe Abschnit 4, ser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an

Omeprazol - 1 A Pharma 20 mg bei Sodbrennen enthä den Wirkstoff Omeprazol. Er gehört zu einer Grupp von Azzneimitteln, die "Protonenpumpenhemmer" ge annt werden. Diese wirken, indern sie die Säuremen ge, die Ihr Magen produziert, verringern.

ng-die in magen produzier, verlingen:
Oneprazio 1 -1 A Pharma 20 mg bel Sodbrennen wird
bel Erwachsenen zur kurzzeitigen Behandlung von ReRuchsechwerden (z. B. Sodbrennen, Stürreichklus)
angewerdet.
Geld begeichte der Seine Stürzeichtung der
die Speisserbre, die sich entzünden und Schmerzeiverursachen kann, Dadurch kann es bei Illnera zu Kraikheitstanzeichen wie einem bis zum Rachen aufsteigenden brennenden Schmerz in der Brust (Sodbrennen)
und einem Bauzen Geschmack im Mund (Säurreichund einem Bauzen Mund (Säurreichünd einem Bauzen Mund (Säurreichünd einem Bauzen Mund (Säurreichünd einem Bauzen (Beschmack im Mund (Baureichünd einem Bauzen (Beschmack im Mund (Baureichünd einem Bauzen (Beschmack im Mund (Baureichünd einem Bauzen (Beschmack im Bauzen))

Was sollten Sie vor der Einnahme von Omeprazol - 1 A Pharma 20 mg bei Sodbrennen beachten?

meprazol - 1 A Pharma 20 mg bei Sodbren en darf nicht eingenommen werden wenn Sie allergisch gegen Omeprazol oder einen de in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile die see Armeinitäte sind. 97 Oars ...
wenn Sie allergisch (gegewenn Sie allergisch (gegewenn Sie allergisch (gegen zu

gene Zuseinstelle sind.

wenn Sie allergisch gegen Azzaleinttel sind, die andere Protonespumpenhemmer enthalten (z. B. Panpotpazal, Lamopozan), Rabeprazal, Ecomepazalo,

enthalt (gegen eine HilV-Infektion).

***Alcher sind, sprechen Sie vor der

****—***Al 20 mg be Sod
*****—***20 mg be Sod-

nn Sie sich nicht sicher sind, sprechen Sie vor der nahme von Omeprazol - 1 A Pharma 20 mg bei Sod-nnen mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

rnhinweise und versichtsmaßnahmen imen Sie Omeprazol - 1 A Pharma 20 mg bei S inen nicht länger als 14 Tage ein, ohne litren Arz agen. Wenn litre Beschwerden nicht nachlass wenn sich litre Beschwerden verschlimmern, in Sie litren Arzt auf. hwere kutane Nebenwirkungen (SCARs), einschließ h Stevens-Johnson-Syndrom (SJS), toxischer epi maier Nekrolyse (TEN), Arzeimittelwirkung mit Eo ophilie. und systemischen. Symptomen. (DRESS owie akut ge GEP), die let urden im Zus

n ei iebensbedohlich oder tödlich sein kör rden im Zusammenhang mit der Omerpracibet gip berichtet. Brechen Sie die Anwendung von 1 20 – 1. A Plama 20 mg be Söcherien als ries der in Abschnitt 4 beschriebenen Sympton sammenhang mit diesen schwerwiecenen ei der Einnahme von Omeprazol kann es zu ndung Ihrer Nieren kommen. Zu den Anze mptomen können eine verringerte Urinm Urin und/oder Überempfindlichkeitsreak eber, Hautausschlag und Gelenksteife geh elden Sie solche Anzeichen dem behandel

source ruixenchen oem behandelnden Arz.

Besee Azzeinstell aun die Aufstellen von Wittenin 81 2

uurch hren Körper beeintrüchtigen, besonders wenne beer einen lingener Azietanum eingenommen wich Elitie enden Sie sich an Thren Arzt, wenn 58 eines der Indenden Synghome benenfelen, des auf die eines der Indenden Synghome benenfelen, des auf dienen riedrigen einer Synghome benenfelen, der Synghome benenfelen, der Geriffelen niedrigen Elterem Müdigkeit oder Enregidesigkeit Gefühl von Nadelschen auf der Haut Eine wurde und role Zunge, Geschwüre im Mund Sehlstönungen

- meprazol 1 A Pharma 20 mg bei Sodbrennen kar Anzeichen anderer Erkrankungen verdecken. Spr en Sie daher umgehend mit Ihrem Azzt, wenn eine die genden Angaben vor oder während der Einnahrn of Siepotzol 1 A Pharma 20 mg bei Sodbrerne of Sie zutriffit:

- skommen Bauchschnerse...
 gen, breichen Nahrung oder Blut.
 heiden schwarzen Stuhl aus (Blut im Stuhl).
 den an schweren oder andauerndem Durchfa
 enprazol mit einer geringen Erhöhung von ar
 endem Durchfall in Verbindung gebracht wird.
 Am Magengeschwür oder eine Opr

- Arternakung.

 Ar

in Hautausschlag auftritt, inst ne ausgesetzten Hautbereich rzüglich Ihren Arzt, da Sie die azol - 1 A Pharma 20 mg bei bbrechen sollten. Vergessen aunfheisser

neimitteln Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, n dere Arzneimittel einnehmen/anwenden, ki re Arzneimittel eingenommen/angewendet beabsichtigen, andere Arzneimittel einzune

nden.

nden.
s ist wichtig, weil Omeprazol - 1 A Pharma 20 mg
Sodbrennen die Wirkung einiger Arzneimittel beeinssen kann, und weil einige Arzneimittel Einfluss auf
Wirkung von Omeprazol - 1 A Pharma 20 mg bei
dbrennen haben können.

lehmen Sie Omeprazol - 1 A Pharma 20 mg bei So rennen nicht ein, wenn Sie ein Arzneimittel anwend as Nelfinavir enthält (zur Behandlung einer HIV-Infi

Apotheker besonders mit-el einnehmen (angewendet, ugen [Pfropfen]). wenn Sie Clopidog utgerinnseln vorzube

- eker mit, wenn Sie ehmen: azol oder Vorico-a von Infektionen.
- n Ang
- hemotophe with the control of the co

- enden. [Rilampicin (angewendet zur Behandlung ein kulose) Abzazanavir (angewendet zur Behandlung ein Infektion) Tarcorilmus (im Falle von Organtransplantatio Johanniskraut (Hypericum perforatum) (ange zur Behandlung on elichten Depressionen) Cilostazol (angewendet zur Behandlung de nannten Schaufensterkrankheit (Claudicatio in annten Schaufensterkrankheit (Claudicatio in Amartilung bes
- Endinin (angewendet zur Behandlung bestimmter Krebserkrankungen)
 Methortwat (ein Arzneimtlet, das in hohen Dosen be der Chemotherapie zur Behandlung von Krebs eingesetzt wirdi, Wenn Sie Methotrexat in hoher Dosis einenhemen, setzt ihr Arzt Ihre Behandlung mit Omeprazol 1 A Pharma 20 mg bel Sodbrennen möglicherweise vorübergehend ab.
 Saquinavir (angewendet zur Behandlung einer HIVInfektion).

chwangerschaft und Stillzeit enn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn S rmuten, schwanger zu sein oder beabsichtige hwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme di s Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. er Arzt wird entschei na 20 mg bei Sodb ie stillen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum I dienen von Maschinen Es ist unwahszeheinlich, dass Omeprazol - 1 A Pha 20 mg bei Sodbrennen ihre Fähigkeit, Auto zu fal oder Werkzeuge oder Maschinen zu bedienen, be trächtigt. irkungen wie Schwindel und Seh auftreten (siehe Abschnitt 4). Sie si ren oder Maschinen bedienen, wenn

Omeprazol - 1 A Pharma 20 mg bei Sodbre nen enthält Saccharose und Natrium Bilte nehmen Sie Omeprazol - 1 A Pharma 20 mg t Sodbrennen erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt e wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträ Enblicht nezenentilber bestützen zurücken Lichten

hmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wit ser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nu weisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Franz bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie ht sicher sind.

ie empfohlene Dosis beträgt 1 Kapsel Ome A Pharma 20 mg bei Sodbrennen (entsp. D mg Omeorazol) 1-mal biglich über 14 Tage

- igen einnehmen.
 Ihre Kapseln im Ganzen mit einem hs
 er: Zerkauen oder zerdrücken Sie d
 da sie überzogene Pellets enthalte ,
 dass das Arzneimittel im Mage
 e zersetzt wird. Es ist vichtig, dass d
 eschädigt werden. Diese Mikropelle
- ffton...
 erzogen, was sie u...
 passage zersetzt zu werden. Die
 h Wirkstoff im Darm frei, wo ei
 honommen wird, um seine Wir

Wenn Sie eine größere Menge 1 A Pharma 20 mg bei Sodbrei men haben, als Sie sollten Wenn Sie eine größere Menge Ome 20 mg bei Sodbrennen eingenomm fohlen, sprechen Sie umgehend n



Wenn Sie die Einnahme von Omeprazol -1 A Pharma 20 mg bei Soddrennen vergessen haben Wenn Sie die Einnahme einer Dosis vergessen haben, nehmen Sie diese, sobiad Sie daran denken. Sollte es jedoch tast Zeit für Ihre nächste Dosis sein, lassen Sie die vergessene Dosis aus, Nehmen Sie nicht die doppelle Menge ein, wem Sie die vorherige Ein-nahme vergessen häben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arznei-nittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apo-

4 Welche Nebenwirkungen sind möglich?

ie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Ne-enwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten üssen. Wenn Sie eine der folgenden seltenen (kann bis zu 1 von 1.000 Behandelten betreffen) oder sehr seltenen (kann bis zu 1 von 1.000 Behandelten betreffen), aber schweren Nebenwirkungen bemerken, beber des Sie die Einnahme von Omeprazol - 1 A Pharma 20 mg bei Sodbrennen und wenden Sie sich umgehend an einen Azzt.

1.A Planma 20 mg bel Sodbrennen und wenden Sie sich ungehend an einen Aztz:

- pötlich auftretende pfellerind Ahrung, Schwellung

- pötlich auftretende pfellerind Ahrung, Schwellung

(Körpers, Haustauschlag, Ohrmacht oder Schluckbeschwerden (sichwere allergüsche Reaktion) (bestind

- Röhung der Hat um Blassenhlung oder Abbloen der

dung um Blütungen an den Lippen, den Augen, dem

um gun Blütungen an den Lippen, den Augen, dem

dung der Nales und den Geschechstehlein auftreten.

Dies Könsten das, Siewers-Johnson-Syndomr- oder

eine "Louisch periomels Netroylers ein (sehr sei
den "Louisch periomels Netroylers ein (sehr sei
eine "Louisch periomels Netroylers ein (sehr sei-

ten). großflächiger Hautausschlag, hohe Körpertemp tur und vergrößerte Lymphiknoten (DRESS-Synd oder Arzneimittelüberempfindlichkeitssyndrom) (en) in roter, schuppiger, großflächiger Hautausschlag ilt Beulen unter der Haut und Blasen begleitet vor ieber. Die Symptome treten normalerweise zu Be inn der Behandlung auf (akut generalisierendes pus-

äufig (kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen)
Kopfschmerzen
Auswirkungen auf Ihren Magen oder Darm: Durchfall,
Bauchschmerzen, Verstopfung, Blähungen (Flatu-lenz)
Übelkeit oder Erbrechen
gutartige Magenpolypen

elegentlich (kann bis zu 1 von 100 E iffen) Schwellung der Füße und Knöchel Schlafstörungen (Schlaflosigkeit) Schwindel, Kribbeln wie "Ameisenla

keit Drehschwindel (Vertigo) Drehschwindel (Vertigo) veränderte Ergebnisse von Bluttests, mit denen über prifft wird, wie die Leber arbeitet Hautausschlag, quaddelartiger Ausschlag (Nessel-sucht) und juckende Haut generelles Urwichlisein und Antriebsarmut

sklen (kann bis zu 1 von 1.000 Behandelten betreffen Blutprobleme, wie z. B. Verminderung der Anzah weißer Blutkfoperchen oder Blutplättchen. Dies Ausgebergen der Blaue Flecke verursachen oder das Auftreten von Infektionen wahrscheinlicher mach niedrige Natfurnkonzentration im Blut. Dies kann zu Schwäche, Übeikeit (Erbrechen) und Krämpfen füh

ren. Gefühl der Aufregung, Verwirrtheit, Ni

Geltali der Aufregung, verwirtheit, Niedergeschlagenheit Geschmacksverfänderungen Schsteinungen wie verschwommenes Sehen piblzäches Gefühl, pfelfend zu atlmen oder kurzatmig zu sein (Bronchisterungh) eine Ertzündung des Mundinnernaums eine Ertzündung des Mundinnernaums eine als "Soor bezeichnet felnfächt, on, die den Darm beeinfrächtigen kann und durch einen Pliz hervorgerufen wird.

Gelenkschmerzen (Art zen (Myalgie)
 schwere Nierenprobler tis)
 vermehrtes Schwitzen

ehr selten (kann bis zu 1 von 10.000 Behandelt effen) derungen des Blutbilds einschließlich Agranu ise (Fehlen weißer Blutkörperchen)

logstose f\u00e4rien we\u00e4be Blutkopenchen)
Aggressiv\u00e4ti
Sehen, F\u00fchen von Dingen, die nicht vorhanden sind felstatunstinoren)
Annache sind felstatunstinoren
Heinerstandung f\u00fchren er
Behrenstandung f\u00fchren er
Muskelschr\u00e4den
Houselschr\u00e4den
Houselschr\u00

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügberen Daten nicht abschätzbar)

Darmentzündung (führt zu Durchfall)

Ausschlag, eventuell verbunden mit Schmerzen in den Gelenken

Meldung von Nebenwirkungen Venn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich In Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Neben-virkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage ange-geben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt

In sehr seitenen Fällen kann Omeprazol – 1 A Pharm 20 mg bei Soddrennen die weillen Blutkörperchen bei meintussen, was zu einer immunzenkwiche führt. Wei meintussen, was zu einer immunzenkwiche führt. Wei mit einem stark herabpestetzen Algemenzustand od Faber mit Kanhalbsarzeichen einer Osieben infeldist wis Schmerzen im Nacken, Rachen oder Mund od Schwierigkeiten bem Hartabssen haben, mübsen Sichwierigkeiten deut hartabssen haben werden kann. In ist wichtig für Sie, dass Sie Brenn Azt über ihr derzei gest Artamitist dichomien.

Bundesinstitut für Arzneimitte Abt. Pharmakovigilanz Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3 D-53175 Bonn

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieges Arzneimittels zur Verfügung gestellt

Wie ist Omeprazol - 1 A Pharma 20 mg bei Sodbrennen aufzube-wahren? Bewahren Sie die lich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Bist packung bzw. dem Elikett und dem Umkarton na "verwendbar bis" oder "verw. bis" angegebenen V fallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdats bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen N

Alu/Alu-Blisterpackungen: In der Originalverpackung aufbewahren, um d vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.

DPE-Flasche: der Originalverpackung aufbewahren. Das Behältnis it verschlossen halten, um den Inhalt vor Licht und uchtligkeit zu schützen. ach Anbruch 100 Tage haltbar. Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasses z. B. nicht über die Toliette oder das Waschbecken). Fagen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu rintsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie ragen damit zum Schutz der Unweit bei. Weitere Infor-nationen finden Sie unter hittps://www.bfam.de/arz-

6 Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Omeprazol - 1 A Pharma 20 mg bei Sod-brennen enthält Der Wirkstoff ist Omeprazol. Jede magensaftresistente Hartkapsel enthält 20 mg

Die sonstigen Bestandteile sind: Kapseinhaft: Zucker-Stärke-Pellets (Saccharose und Maisstärke) Hypromellose, Natriumdocecylsulfat, Povidon K 25, Talkum, schweres Magnesiumoxid, Methacrylsäure-Et-hylacnylat-Ooplymer (1:1) (Ph.Eur) (Typ C), Triethylcit-

Kapselhülle: Gelatine, Titandioxid Wie Omeprazol - 1 A Pharma 20 mg bei Sod-brennen aussieht und Inhalt der Packung Weißes Kapselober- und -unterteil, gefüllt mit fast wei-ßen bis hellbraunen, magensaftresistent überzogenen

Omeprazol - 1 A Pharma 20 mg bei Sodbrennen is hältlich in Blisterpackungen zu 7 und 14 magensaftresiste Hartkapseln HDPE-Flaschen zu 7 und 14 magensaftresiste

HDPE-Flaschen: Dem Behältnis ist ein Trockenmittel in Form einer gekennzeichneten Silica-Gel-Kapsel beige-fügt. Die Trockenmittel-Kapsel darf nicht geschluckt werden.

Es werden möglicherweise nicht alle in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Untern 1 A Pharma GmbH Industriestraße 18 83607 Holzkirchen Telefon: (08024) 908-3030

Hersteller Lek S.A. UI. Podlipie 16 Stryków 95-010 Polen

iese Packungsbeilage wurd rbeitet im November 2024.

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!