

## Gebrauchsinformation

**Liebe Patientin, lieber Patient, bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und sollte deshalb nicht an Dritte weitergegeben werden.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

### Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Levico und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Levico beachten?
3. Wie ist Levico einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Was ist sonst noch wichtig?

# Levico



WELEDA

## Lösung und Flüssige Verdünnung

### 1. Was ist Levico und wofür wird es angewendet?

Levico ist ein anthroposophisches Arzneimittel.

### Anwendungsgebiete

Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehören zu den Anwendungsgebieten: allgemeine Schwäche, Rekonvaleszenz, Infektanfälligkeit, latenter Eisenmangel, Kreislaufregulationsstörungen mit niedrigem Blutdruck, Angstzustände, Begleitbehandlung bei Bronchialasthma; chronisch-entzündliche Gelenkerkrankungen.

### 2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Levico beachten?

#### Kinder

Levico soll nicht angewendet werden bei Säuglingen und Kleinkindern unter 3 Jahren. Kinder von 3 bis 8 Jahren sollten nur Levico D3 erhalten.

#### Schwangerschaft und Stillzeit

Während der Schwangerschaft und in der Stillzeit sollte Levico D1 nicht eingenommen werden. Fragen Sie vor der Anwendung von Levico D3 während der Schwangerschaft und in der Stillzeit Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

#### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Bei länger anhaltenden oder unklaren Beschwerden suchen Sie bitte einen Arzt auf.

#### Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Keine bekannt

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

#### Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

#### Wichtige Informationen über bestimmte Bestandteile von Levico

Dieses Arzneimittel enthält 41 mg Alkohol (Ethanol) pro Einzeldosis von 10 Tropfen, entsprechend 18 Vol.-% Alkohol. Die Menge in 10 Tropfen dieses Arzneimittels entspricht weniger als 2 ml Bier oder 1 ml Wein. Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

### 3. Wie ist Levico einzunehmen?

Nehmen Sie Levico immer genau nach der Anweisung Ihres Arztes ein.

*Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:*

1 – 3 mal täglich 5 – 10 Tropfen mit 1 Glas Wasser verdünnt einnehmen.

Levico D1 darf nicht unverdünnt eingenommen werden, da es sonst zu Reizerscheinungen kommen kann.

Bei Levico D1 kann eventuell eine Trübung der Flüssigkeit auftreten. Um eine gleichmäßige Verteilung bei der Entnahme zu gewährleisten, sollte die Flasche vor Gebrauch geschüttelt werden.

Die für die Behandlung geeignete Potenzstufe wird vom Arzt nach dem jeweiligen Krankheitsbild ausgewählt und für den Patienten individuell verordnet.

#### *Dauer der Anwendung*

Die Behandlung von akuten Erkrankungen sollte nach 2 Wochen abgeschlossen sein. Tritt innerhalb dieses Zeitraums keine Besserung ein, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Die Dauer der Behandlung von chronischen Krankheiten erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

#### *Wenn Sie die Einnahme von Levico vergessen haben:*

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich bei der Anwendung dieses Arzneimittels nicht ganz sicher sind.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem *Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)* anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### **5. Was ist sonst noch wichtig?**

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

#### **Aufbewahrungsbedingungen**

Nicht über 25 °C lagern.

#### **Zusammensetzung**

Arzneimittelbezeichnung	10 g (= 10,2 ml) enthalten: Wirkstoff:	
Levico D1	Levico Dil. D1 [HAB, V. 5a; Lsg. D1 mit Ethanol 15 % (m/m)]	10 g
Levico D3	Levico Dil. D3 [HAB, V. 5a; Lsg. D1 mit Ethanol 15 % (m/m)]	10 g
	(Ursubstanz: Levico "stark" Wasser)	

Sonstige Bestandteile: Levico D1: Gereinigtes Wasser, Salzsäure 36 %.

1 ml entspricht ca. 35 Tropfen.

#### **Darreichungsformen und Packungsgröße**

D1: 50 ml Lösung

D3: 50 ml Flüssige Verdünnung

#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Weleda AG, Postfach 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd

Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-200, E-Mail: [dialog@weleda.de](mailto:dialog@weleda.de)

**Stand der Information:** August 2022