



# Cefamagar<sup>®</sup> Tabletten

Wirkstoff: Fucus vesiculosus trit. D2

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Cefamagar<sup>®</sup> jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

## Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Cefamagar<sup>®</sup> und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Cefamagar<sup>®</sup> beachten?
3. Wie ist Cefamagar<sup>®</sup> einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Cefamagar<sup>®</sup> aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

## 1. Was ist Cefamagar<sup>®</sup> und wofür wird es angewendet?

Cefamagar<sup>®</sup> ist ein homöopathisches Arzneimittel zur unterstützenden Behandlung von Übergewicht.

### Anwendungsgebiet:

Das Anwendungsgebiet entspricht dem homöopathischen Arzneimittelbild: Dazu gehört: Übergewicht.

Hinweis: Eine krankheitsbedingte Ursache der Fettsucht ist vor der Einnahme des Arzneimittels abzuklären. Eine Abklärung durch den Arzt ist gleichfalls bei Kropfleiden erforderlich. Bei anhaltenden Beschwerden ist eine Rücksprache mit dem Arzt notwendig.

## 2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Cefamagar<sup>®</sup> beachten?

Cefamagar<sup>®</sup> darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile sind,
- von Kindern unter 12 Jahren, da für diese Altersgruppe keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen,
- bei einer bekannten Jodüberempfindlichkeit.

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Cefamagar<sup>®</sup> ist erforderlich:**

Bei Schilddrüsenerkrankungen sollten Sie Cefamagar<sup>®</sup> nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.

**Bei Einnahme von Cefamagar<sup>®</sup> mit anderen Arzneimitteln:**

*Unter Wechselwirkungen versteht man die gegenseitige Beeinflussung von Medikamenten und die Beeinflussung von Medikamenten*

*durch Nichtarzneimittel wie Speisen, Getränke oder Genussmittel, die gleichzeitig oder in einem geringen zeitlichen Abstand voneinander angewendet werden. Dabei können die Wirkungen der Medikamente verstärkt bzw. abgeschwächt werden oder andere Unverträglichkeiten auftreten.*

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind bisher nicht bekannt.

### Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

### Schwangerschaft und Stillzeit:

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung vorliegen, darf das Arzneimittel in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Bei vorschriftsmäßiger Einnahme sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Cefamagar<sup>®</sup>:

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Cefamagar<sup>®</sup> Tabletten daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Fortsetzung auf der Rückseite >>

### 3. Wie ist Cefamagar® einzunehmen?

Nehmen Sie Cefamagar® immer genau nach den Anweisungen in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

1 – 3-mal täglich 1 Tablette einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

#### Art der Anwendung:

Tablette im Mund zergehen lassen oder mit ausreichend Wasser einnehmen.

#### Dauer der Anwendung:

Cefamagar® sollte ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung dieses Arzneimittels zu stark oder zu schwach ist.

#### Wenn Sie eine größere Menge Cefamagar® eingenommen haben, als Sie sollten:

Bei der Einnahme großer Mengen (z. B. Packungsinhalt) kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

#### Wenn Sie die Einnahme von Cefamagar® vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, sondern fahren Sie mit der Einnahme, wie von Ihrem Arzt verordnet oder in der Gebrauchsinformation beschrieben, fort.

### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Cefamagar® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Behandelten auftreten müssen.

#### Mögliche Nebenwirkungen:

Eine Schilddrüsenüberfunktion kann verstärkt werden. Es kann zu Übelkeit, Magen-Darm-Beschwerden, Schwindel oder Blutdruckerhöhung kommen.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

#### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de), anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### 5. Wie ist Cefamagar® aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Durchdrückpackung und dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

#### Aufbewahrungsbedingungen:

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

### 6. Weitere Informationen

#### Was Cefamagar® Tabletten enthalten:

##### Der Wirkstoff ist:

1 Tablette enthält:

Fucus vesiculosus trit. D2 205 mg

Die sonstigen Bestandteile sind:

Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat

#### Wie Cefamagar® aussieht und Inhalt der Packung:

Weißer, bikonvex gewölbte Tabletten.

Inhalt: Originalpackungen mit 60 oder 100 Tabletten.

#### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Cefak KG  
Ostbahnhofstr. 15  
D-87437 Kempten  
Telefon: 0831/57401-0  
Telefax: 0831/57401-50  
E-Mail: [cefak@cefak.com](mailto:cefak@cefak.com)

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Juni 2014.

Apothekenpflichtig



seit 1948

Sie haben noch Fragen oder möchten Informationsmaterial – wir informieren Sie gerne!

**Cefak KG – Verbraucherservice**

Postfach 1360 · D-87403 Kempten · Telefon: 08 31/5 74 01-0 · Fax: 08 31/5 74 01-50

E-Mail: [cefak@cefak.com](mailto:cefak@cefak.com)

005071072540000 C-1276

DE/CAB