

# Gebrauchsinformation

*Liebe Patientin, lieber Patient!*

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## Sanukehl® Prot D6 Flüssige Verdünnung

### Homöopathisches Arzneimittel

**Wirkstoff:** Proteus vulgaris extractum cellulae (lyophil., steril.) Dil. D6

**Anwendungsgebiete:** Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

**Hinweis an den Anwender:** Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

#### Gegenanzeigen:

*Wann dürfen Sie **Sanukehl® Prot D6** nicht anwenden?*

Nicht anwenden bei

- bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Proteus-Arten
- Autoimmunerkrankungen
- Kindern unter 12 Jahren
- Schwangeren und Stillenden

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:** Keine bekannt.

#### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

*Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von **Sanukehl® Prot D6**?*

Immunsuppressiv wirkende Arzneimittel können die Wirksamkeit von **Sanukehl® Prot D6** beeinträchtigen. Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist ein Abstand von 4 Wochen einzuhalten.

**Allgemeiner Hinweis:** Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:** Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt nichts anderes verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da dieses Arzneimittel sonst nicht richtig wirken kann!

*Wieviel und wie oft sollten Sie **Sanukehl® Prot D6** anwenden?*

Soweit nicht anders verordnet, werden bei akuten Krankheitszuständen bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren vor einer Mahlzeit 5-10 Tropfen alle 12 bis 24 Stunden eingenommen. Bei chronischen Verlaufsformen werden 10 Tropfen alle 2 Tage eingenommen.

**Sanukehl® Prot D6** kann auch in die Haut eingegeben werden; bei dieser Art der Anwendung werden alle 1 - 2 Tage 5 - 10 Tropfen in die Ellenbeugen eingegeben.

*Wie lange sollten Sie **Sanukehl® Prot D6** anwenden?*

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden. Nach längstens 4 Wochen Therapiedauer sollte **Sanukehl® Prot D6** abgesetzt werden.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.





## Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von **Sanukehl® Prot D6** auftreten?

Aufgrund des Gehaltes von **Sanukehl® Prot D6** an spezifisch organischen Bestandteilen können in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen, hauptsächlich in Form von Hautreaktionen, auftreten und eine Allergie gegen den Bestandteil *Proteus vulgaris* ausgelöst werden.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Das Arzneimittel ist dann abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.

**Hinweis:** Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

**Meldung von Nebenwirkungen:** Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:** Das Verfalldatum ist auf dem Flaschenetikett und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum! - Das Arzneimittel darf nach Öffnung der Flasche höchstens noch 2 Monate verwendet werden. – Bitte verschließen Sie die Flasche sofort nach Gebrauch. Berühren Sie die Tropfmontur nach Entfernung der Abdeckkappe nicht an der Spitze; unsachgemäße Behandlung verkürzt die Haltbarkeit des Arzneimittels. – Falls die Lösung nicht mehr klar, sondern trübe oder flockig aussieht, soll das Arzneimittel auch vor Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwendet werden.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

Weitere Informationen finden sie unter [www.bfarm.de/arzneimittelsorgung](http://www.bfarm.de/arzneimittelsorgung).

## Zusammensetzung:

10 ml flüssige Verdünnung enthalten: Wirkstoff:

10 ml **Proteus vulgaris extractum cellulae (lyophil., steril.) Dil. D6** (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit gereinigtem Wasser). Ein Milliliter enthält 22 Tropfen.

## Darreichungsform und Inhalt:

10 ml / 10 ml (unverkäufliches Muster) / 10 x 10 ml flüssige Verdünnung zum Einnehmen und Einreiben.



**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

**SANUM-Kehlbeck**  
GmbH & Co. KG

Postfach 1355 · D-27316 Hoya  
Tel.: + 49 (0)42 51 - 9352-0  
Fax: + 49 (0)42 51 - 93 52-291  
E-Mail: [info@sanum.com](mailto:info@sanum.com)

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!

Reg.-Nr. 33251.00.00

Apothekenpflichtig

**Stand der Gebrauchsinformation: 10 / 2024**



Trennung  
an der abstehenden  
Lasche  
anfassen  
und rundherum  
abziehen.



Weiße Schutzkappe  
mit Daumen und  
Zeigefinger  
kräftig anfassen  
und zur Seite  
abknicken.



Tropfenweise Ent-  
nahme durch vor-  
sichtiges Zusammen-  
drücken der Gummi-  
Pipette mit Daumen  
und Zeigefinger



Nach Gebrauch  
Schutzkappe fest auf-  
drücken bis sie hörbar  
einrastet. Hierdurch  
dichter Verschluss der  
Tropfflasche.

