

GEBRAUCHSINFORMATION

Isopropylalkohol 70 % (V/V) (= 2-Propanol 70 % (V/V))

Lösung zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen
Für Säuglinge, Kinder und Erwachsene
Wirkstoff: 2-Propanol

Zusammensetzung / Wirkstoff:

100 g Lösung enthalten: 63,1 g 2-Propanol,
Sonstiger Bestandteil: gereinigtes Wasser

Darreichungsform und Inhalt:

100 ml und 200 ml Lösung

Stoff- oder Indikationsgruppe:

Desinfektionsmittel.

Anwendungsgebiete:

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken. Desinfektion talgdrüsenreicher Haut; Kühllumschläge.

Gegenanzeigen:

Isopropylalkohol 70 % (V/V) (= 2-Propanol 70 % (V/V)) ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

Warnhinweise:

Leicht entzündlich! Von Zündquellen fern halten!
Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:

Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit der Lösung eingerieben und 30 Sekunden lang feucht gehalten.

Zur chirurgischen Händedesinfektion werden Hände und Unterarme mit der Lösung eingerieben und 5 Minuten lang feucht gehalten.

Zur Desinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße wird die Haut mit der Lösung sorgfältig eingerieben und 15 Sekunden lang feucht gehalten.

Zur Desinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 1 Minute lang feucht gehalten.

Zur Desinfektion von talgdrüsenreicher Haut wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 10 Minuten lang feucht gehalten.

Für Kühllumschläge ist die Lösung mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anzuwenden.

Hinweise: Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen (z.B. feuchte Haut, Verschmutzung der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern.

Isopropylalkohol 70 % (V/V) (= 2-Propanol 70 % (V/V)) wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung haben, fragen Sie bitte Ihre Ärztin oder Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Nebenwirkungen:

Beim Einreiben der Haut mit Isopropylalkohol 70 % (V/V) (= 2-Propanol 70 % (V/V)) können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt oder Ihrer Apotheke mit.

Hinweise:

Dicht verschlossen aufbewahren. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.



Diese Gebrauchsanweisung wurde zuletzt überarbeitet im September 2024.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Henry Lamotte Oils GmbH
Mercurstraße 47
28197 Bremen
e-mail: rezepturwaren@lamotte-oils.de