Gebrauchsinformation: Information für die Patientin

# Cyclelle® 120 Mikrogramm/15 Mikrogramm pro 24 Stunden vaginales Wirkstofffreisetzungssystem

Etonogestrel/Ethinylestradiol

Wichtige Informationen über kombinierte hormonale Kontrazeptiva (KHK): Bei korrekter Anwendung z\u00e4hlen sie zu den zuverl\u00e4ssigsten revers\u00e4blen Verh\u00fctungsmethode

Sie bewirken eine leichte Zunahme des Risikos für ein Blutderinnsel in den Venen und Arterien, insbesondere im ersten Jahr der Anwendung oder bei Wiederaufnahme der Anwen

Wenn Sie weitere Fragen haben wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Anotheke

dung sinse kombinisatan hormonalan Kontravantisume nach sinar Hoterbrachung von 4 oder mahr Mochar

 Achten Sie bitte aufmerksam auf Symptome eines Blutgerinnsels und wenden Sie sich an litren Arzt, wenn Sie vermuten, diese zu haben (siehe Abschnitt 2, "Blutgerinnsel"). Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung von Cyclelle beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen. Hehen Sie die Packungsheilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals leser

Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sieh

Ihr Arzneimittel ist unter obigem Namen erhältlich, wird in dieser Packungsheilage iedoch als Cyclelle bezeichnet

Was in dieser Packungsbeilage steht 1. Was ist Cyclelle und wofür wird es angewendet?

Was sollten Sie vor der Anwendung von Cyclelle beachten?

3. Wie ist Cyclelle anzuwenden?

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich"

5. Wie ist Cyclelle aufzubewahren?

Allgemeine Hinweise

hait hatten)

ainmal hattani

Cyclelle darf nicht angewendet werden

nisverhütung für Sie besser geeignet ist, wenr

. Sie iemals einen Herzinfarkt oder Schlaganfall hatten

schwerer Diabetes mit Schädigung der Blutgefäße

eaby hoher Blutfettenianal (Cholaeterin order Trinkmerida)

eine Krankheit, die als Hyperhomocysteinämie bekannt ist

Antinhaenhalinid-Antikärna

einer Arterie erhöhen können:

sehr hoher Blutdruck

warten haben (hatten)

schränkt ist

in der Vergangenheit gelitten haber

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

# Was ist Cyclelle und wofür wird es angewendet?

Cyclelle ist ein empfängnisverhütender Vaginalring, der zur Schwangerschaftsverhütung angewendet wird. Jeder Ring enthält eine geringe Menge zweier weihlicher Sexualhormone - Etonogestrel und Ethinylestradiol. Der Ring gibt langsam kleine Mengen dieser Hormone in den Blutkreislauf ab. Aufgrund der niedrigen Menge an Hormonen, die abgegeben werden, wird Cyclelle als niedrig dosiertes hormonales Verhütungsmittel angesehen. Da Cyclelle zwei verschiedene Arten von Hormonen abgibt, spricht man von einem so genannten kombinierten hormonalen Verhütungsmittel

Cvclelle wirkt wie eine kombinierte empfängnisverhütende Pille (die "Pille"), aber anstelle jeden Tag eine Pille einzunehmen, wird der Ring drei Wochen ununterbrochen angewendet Cyclelle setzt zwei weibliche Sexualhormone frei die verbindern, dass eine Fizelle aus den Fierstöcken freigesetzt wird. Wenn keine Fizelle freigesetzt wird. können Sie nicht schwan

# 2 Was sollten Sie vor der Anwendung von Cyclelle beachten?

Bitte lesen Sie die Informationen zu Blutgerinnseln in Abschnitt 2, bevor Sie mit der Anwendung von Cyclelle beginnen. Es ist besonders wichtig, die Informationen zu den Symptomen eines Blutgerinnsels zu lesen - siehe Abschnitt "Blutgerinnsel". In dieser Gebrauchsinformation werden verschiedene Situationen beschrieben, in denen

Sie ein Rhitnerinnzel in einem Blutnef

ß der Reine (tiefe Reinvenenthmehnen TVT) der

Ihnen bekannt ist, dass Sie an einer Störung der Blutgerinnung leiden – beispielswei-

. Sie operiert werden müssen oder längere Zeit bettlägerig sind (siehe Abschnitt "Blut-

. Sie eine Angina pectoris (eine Erkrankung, die schwere Brustschmerzen verursacht und

. Sie an einer der folgenden Krankheiten leiden, die das Risiko für ein Blutgerinnsel in

. Sie an einer bestimmten Form von Migräne (sogenannte "Migräne mit Aura") leiden oder

Sie eine Bauchspeicheldrüsenentzündung (Pankreatitis) verbunden mit hohen Blutfett

. Sie eine schwere Lebererkrankung haben (hatten) und die Leberfunktion noch einge-

ein erstes Anzeichen auf einen Herzinfarkt sein kann) oder eine transitorische ischämi-

sche Attacke (TIA - vorübergehende Symptome eines Schlaganfalls) haben (oder früher

Lunge (Lungenembolie, LE) oder eines anderen Organs haben (oder in der Vergangen-

se Protein-C-Mangel, Protein-S-Mangel, Antithrombin-III-Mangel, Faktor-V-Leiden oder

Informieren Sie Ihren Arzt, wenn einer der folgenden Punkte auf Sie zutrifft. Sie die Anwendung von Cyclelle abbrechen müssen oder in denen Cyclelle weniger zuver-Wenn die Krankheit ausbricht oder sich während der Anwendung von Cyclelle verschlimlässig sein kann. In diesen Situationen sollten Sie keinen Geschlechtsverkehr haben oder mart, colltan Sie abenfalle Ihran Arvt informieren, wennzusätzlich nicht-hormonale Verhütungsmethoden wie ein Kondom oder eine andere Barrie- ain nahar Vanuandter Bruetkrahe hat oder hatte. 

Methoden können unzuverlässig sein, da Cyclelle die monatlichen Temperaturschwankunren Arzneimittelo" nan und Varändarungen des Gehärmutterschleims heeinflusst

Wie andere hormonale Verhütungsmittel bietet Cyclelle keinen Schutz vor

 Sie eine Lebererkrankung (z. B. Gelbsucht) oder eine Gallenblasenerkrankung (z. B. Gal-HIV-Infektionen (AIDS) und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten. Sie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa (chronisch entzündliche Darmerkrankung) haben Sie systemischen Lupus ervthematodes (SLE – eine Krankheit, die Ihr natürliches Ab-

wahrevetam haainträchtinti hahan Wenn einer der nachstehend aufgeführten Punkte auf Sie zutrifft, müssen Sie dies Ihrem Arzt mitteilen. Ihr Arzt wird dann mit Ihnen besprechen, welche andere Form der Empfäng-

 Sie ein h\u00e4molytisch-ur\u00e4misches Syndrom (HUS – eine St\u00f6rung der Blutgerinnung, die zu Nierenvereagen führt) haben Sie Sichelvellanämie (eine arbliche Erkrankung der mten Blutkörnerchen) haben

Sie einen gutartigen oder bösartigen Tumor der Leber haben (hatten)

bei Ihnen nicht abgeklärte Blutungen aus der Scheide auftreten

rung sollten Sie eine nicht-hormonale Verhütungsmethode anwenden

nannten sonstinen Bestandteile dieses Arzneimittels sind

entsprechender Verdacht besteht

zusammen mit anderen Arzneimitteln\*

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

(eigha dan Ahechnitt Blutgaringeal\* untan)

den Abschnitt "So erkennen Sie ein Blutgerinnsel"

Mann colltan Sia eich an Ihran Arrt wander

Suchen Sie unverzüglich ärztliche Hilfe auf

. Sie Brustkrebs oder einen Krebs in den Geschlechtsorganen haben (hatten) oder ein

Sie allergisch gegen Ethinylestradiol oder Etonogestrel oder einen der in Abschnitt 6 ge-

Sollte eine der angeführten Gegebenheiten erstmals während der Anwendung von Cyclelle

auftreten, entfernen Sie sofort den Ring und wenden Sie sich an Ihren Arzt. Bis zur Abklä-

Cyclelle darf nicht angewendet werden, wenn Sie Hepatitis C haben und Arzneimittel ein-

nahman walcha Ombitasuir/Paritanauir/Ritonauir Daeahuuir Glacanauir/Ritoantasuir orlar

Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir enthalten (siehe Abschnitt, "Anwendung von Cyclelle

wenn Sie mögliche Anzeichen eines Blutgerinnsels bemerken, die bedeuten könnter

dass Sie ein Blutgerinnsel im Bein (d. h. tiefe Beinvenenthrombose), ein Blutgerinnsel

in der Lunge (d. h. Lungenembolie), einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall haben

Für eine Beschreibung der Symptome dieser schwerwiegenden Nebenwirkungen siehe

. Sie erhöhte Blutfettspiegel (Hypertriglyceridämie) haben oder diese Erkrankung in Ihrer Familie vorgekommen ist. Hypertriglyceridämie wurde mit einem erhöhten Risiko für eine Pankreatitis (Entzündung der Bauchspeicheldrüse) verbunden

Sie operiert werden müssen oder längere Zeit bettlägerig sind (siehe Abschnitt "Blutgerinneel\*)

Sie vor kurrem enthunden haben ist Ihr Disiko für Blutgeringeel erhöht. Eregen Sie

Ihren Arzt, wie bald nach der Entbindung Sie mit der Anwendung von Cyclelle beginnen können

Sie in den Venen unter der Haut eine Entzündung haben (oberflächliche Thrombophlebi

Sie Kramnfadern (Varizen) haben

folgende Symptome während einer Schwangerschaft oder der vorangegangenen An-

wendung von Sexualhormonen erstmals bei Ihnen auftraten oder sich verschlechterten: Hörstörung, Porphyrie (eine Blutkrankheit), Herpes gestationis (während der Schwangerschaft auftretender Hautausschlag mit Bläschenbildung). Sydenham-Chorea (eine

Erkrankung der Nerven mit unwillkürlich auftretenden Bewegungen) · wenn Sie Symptome eines Angioödems wie Schwellungen des Gesichts, der Zunge und/oder des Rachens und/oder Schwierigkeiten beim Schlucken oder Nesselsucht verbunden mit Schwierigkeiten beim Atmen haben, wenden Sie sich sofort an einen Arzt. Produkte, die Östrogene enthalten, können die Symptome eines angeborenen (hereditä-

ren) und erworbenen Angioödems verursachen oder verschlimmern Sie Chloasma (gelblich-braune Pigmentflecken, so genannte "Schwangerschaftsflecken", vorwiegend im Gesicht) haben (oder hatten). Wenn ja, dann sollten Sie übermäßiges Sonnenlicht und UV-Strahlung meiden.

\* B. Varetonfung, einen Gehärmuttenverfall oder Schmerzen während der Geschlachtewarkshire Sie häufig, dringend Wasserlassen müssen und dabei ein Brennen und/oder Schmerzen verspüren und den Ring nicht in der Scheide lokalisieren körnen. Diese Symptome können ein Anzeichen dafür sein, dass Cyclelle versehentlich in die Hamblase einge-

a in dea Venne (consequents Vennethroughous), contine Throughoushoush aday VTE)

in den Arterien (sogenannte Arterienthromhose" arterielle Thromhoembolie" oder ATE)

Die Ausheilung eines Blutgerinnsels ist nicht immer vollständig. Selten kann es zu schwer-

wiedenden anhaltenden Reschwerden kommen und sehr selten verlaufen Blutgerinn-

Risiko für die Ausbildung eines Blutgerinnsels höher, als wenn Sie keines anwenden. In kombiniertes hormonales Kontrazeptivum angewendet würde.

Woran könnten Sie leiden?

Thrombose einer Netzhaut

Slutgefäße verstopfen

Vene im Auge)

Blutgeringsel

me ven meschen

ntome bemerken

HEXAL

Blutgerinnsel können auftreten

So erkennen Sie ein Blutgerinnsel

Blutgerinnsels aufgrund von Cyclelle gering ist.

Tritt hai Ihnan ainas diasar Anyaichan auf?

Envirmung der hetroffenen Beine

de Blässe Bot- oder Blaufärbung

dem Blut ausgehustet werden kann

starke Magenschmerzen.

zündung der

Bruetheine

ders ausgeprägt ist

zen unbekannter Hreache

riakeiten

Kramnfanfall

Blutgerinnsel in einer Vene

Schwellung eines Beins oder längs einer Vene im Bein

Schmerz oder Druckschmerz im Bein, der mögliche

Änderung der Hautfarbe des Beins, z. B. aufkommen

plötzlicher Husten ohne offensichtliche Ursache be

stechender Brustschmerz, der bei tiefem Finatmen zu

Wenn Sie sich nicht sicher sind, sprechen Sie mit einem

Arrt, da ainine dieser Symptome wie klusten oder Kurzet-

migkeit mit einer leichteren Erkrankung wie z. B. einer Ent-

Atemwege (z. B. einem grippalen Infekt) verwechselt wer-

schmerzloses verschwommenes Sehen, welches

einem Verlust des Sehvermögens fortschreiten kann.

Brustechmarz Hrwohleain Druck Schwaragefühle

Enge- oder Völlegefühl in Brust, Arm oder unterhalb des

Völlegefühl, Verdauungsstörungen oder Erstickungsge

in den Rücken, Kiefer, Hals, Arm und Magen ausstrah-

plötzliche Schwäche oder Taubheitsgefühl des Gesich- Schlaganfal

Schwitzen Übelkeit Erbrechen oder Schwindelgefüh

tes Arms oder Beins die auf einer Körnerseite beson

plötzliche Verwirrtheit. Sprech- oder Verständnisschwie

nlötzliche Sehetörungen in einem oder heiden Augen

plötzliche Gehschwierigkeiten, Schwindelgefühl, Gleich-

niötzlicha, echwara orlar lännar anhaltanda Konfechma

Variust das Baus seteaine oder Ohnmacht mit oder ohne

manchen Fällen können die Symptome eines Schlag-

anfalls kurzfristig sein und mit einer nahezu sofortigen und

ollständigen Erholung einhergehen. Sie sollten sich aber

rotzdem dringend in ärztliche Behandlung begeben, da Sie

Was kann passieren, wenn sich in einer Vene ein Blutgerinnsel bildet?

extreme Schwäche Angst oder Kurzatmickeit

gewichteverlust oder Konrdinationsstönungen

rneut einen Schlaganfall erleiden könnten

etarka Mananechmerzen (akutee Ahdomen

eine Lungenembolie verursachen.

schnelle oder unregelmäßige Herzschläge

starke Benommenheit oder Schwindelgefühl

schneller oder unregelmäßiger Herzschlag

Symptome, die meistens in einem Auge auftreten

sofortiger Verlust des Sehvermögens ode

lende Beschwerden im Oberkörner

plötzliche unerklärliche Atemlosigkeit oder schnelle At- Lungenembolie

oder Fuß, vor allem, wenn gleichzeitig Folgendes auftritt:

waise nur haim Stahan oder Gehan hamerkt wird

Wenn es in einer Vene im Bein oder Fuß zu einem Blutgerinnsel kommt, kann dieses eine tiefe Reinvenenthrombose (TVT) verursachen Wenn ein Rilstgerinnsel vom Rein in die Lunge wandert und sich dort festsetzt, kann es. Tailan Sie Ihrem Arzt mit, wann de hei einem der ohen enurihnten Punkte während der An-

Die Anwendung kombinierter hormonaler Kontrazeptiva wurde mit einem höheren Risiko für Blutgerinnsel in einer Vene (Venenthrombose) in Verbindung gebracht. Diese Nebenwirkungen kommen jedoch nur selten vor. Meistens treten sie im ersten Jahr der Anwendung eines kombinierten hormonalen Kontrazeptivums auf.

Schwellung und leicht bläuliche Verfärbung einer Extre- Blutgerinnsel, die andere

Wann ist das Risiko für die Rildung eines Blutgeringsels in einer Vene am größten? Die gestelnenden Informationen arbiett man aus Studien die mit kombinisaten Madril

Blutgerinnsels pro Jahr

• es aus medizinischen Gründen für Sie schwierig ist. Ovclelle anzuwenden; Sie haben • Sehr selten kann sich ein Blutgerinnsel in einer Vene eines anderen Organs wie z. B. dem anfangen, bei einem nahen Angehörigen aus unbekannter Ursache eine Thrombose auftritt Das Risiko für die Rildung eines Blutgeringsels in einer Vege ist im ersten Jahr der erstma-

Auge (Thromhose einer Netzhautvene) hilden

ko kann außerdem erhöht sein, wenn Sie die Anwendung eines kombinierten hormonalen Kontrazentivums (pleiches oder anderes Azzneimittel) nach einer Unterbeschung von 4 oder empfingnisverbütenden Hormonen, die in der Scheide angewendet werden (wie Cyclelle) mahr Wochan wieder aufnehmen Designations of the control of the c

seltenen Fällen kann ein Blutgerinnsel Blutgefäße verstopfen und schwerwiegende Proble-Wenn Sie die Anwendung von Cyclelle beenden, kehrt das Risiko für ein Blutgerinnsel in wenigen Wochen auf den Normalwert zurück

> Wie groß ist das Risiko für die Bildung eines Blutgerinnsels? Das Risiko ist abhängig von Ihrem natürlichen Risiko für VTE und der Art des von Ihnen an-

> gewendeten kombinierten hormonalen Kontrazentivums Das Gesamtrisiko für ein Blutgerinnsel in Bein oder Lunge (TVT oder LE) mit Cyclelle ist ge-

 I Innefilhr 2 von 10 000 Erauen die werter echwanner eind noch ein kombiniertes hormonales Kontraventicum anuenden erleiden im Verlauf eines Jahres ein Blutzerinnsell

Es ist wichtig, nicht zu vergessen, dass das Gesamtrisiko eines gesundheitsschädlichen Ungefähr 5-7 von 10.000 Frauen, die ein Levonorgestrel. Norethisteron oder ein Norgestimat enthaltendes kombiniertes hormonales Kontrazeptivum anwenden, erleiden im

Various aines Johnes ein Blutnerinneel Suchen Sie dringend ärztliche Hilfe auf, wenn Sie eines der folgenden Anzeichen oder Sym- Ungefähr 6-12 von 10 000 Erzuen, die ein Norelgestromin oder Etonogestrel enthaltendes kombiniertes hormonales Kontrazentivum wie Cyclelle anwenden, erleiden im Ver-

> last piece Johnson ein Dhatanniannal Das Risiko für die Bildung eines Blutgerinnsels ist entsprechend Ihrer persönlichen medizinischen Vorgeschichte unterschiedlich hoch (siehe folgenden Abschnitt "Faktoren,

die das Risiko für ein Blutgerinnsel in einer Vene erhöhen"). Risiko für die Bildung eines

Frauen, die kein kombiniertes hormonales Präparat ungefähr 2 von 10.000 Frauen in Form einer Dille/einer Dflasters/eines Dings anwenden und nicht schwanger sind Frauen, die eine Levonorgestrel, Norethisteron ungefähr 5-7 von 10.000 Frauen oder Norgestimat enthaltende kombinierte hormo nale Dille anwenden Frauen, die Cyclelle anwender innefilhr 6-12 von 10 000 Eraus

Eaktoren, die das Risiko für ein Blutgerinnsel in einer Vene erhöhen
Das Risiko für ein Blutgerinnsel mit Cyclelle ist gering, wird aber durch einige Erkrankungen und Risikofaktoren erhöht. Das Risiko ist erhöht:

 wenn Sie stark übernewichtig sind (Body-Mass-Index oder BMI über 30 kg/m²) wenn bei einem Ihrer nächsten Angehörigen in jungen Jahren (d. h. jünger als 50 Jahre)
 wonn einem Einfluss auf die Blutspiegel von Cyclelle haben ein Blutgerinnsel im Bein, der Lunge oder einem anderen Organ aufgetreten ist. In diesem Fall haben Sie womöglich eine erbliche Blutgerinnungsstörung.

wenn Sie operiert werden müssen oder aufgrund einer Verletzung oder Krankheit längere Zeit bettlägerig sind oder ein Bein eingegipst ist. Es ist möglich, dass die Anwendung von Cyclelle mehrere Wochen vor einer Operation oder bei eingeschränkter Beweglichkeit beendet werden muss. Wenn Sie die Anwendung von Cyclelle beenden müssen. fragen Sie Ihren Arzt, wann Sie die Anwendung wieder aufnehmen können.

 wenn Sie älter werden (insbesondere ab einem Alter von ungefähr 35 Jahren) · wenn Sie vor wenigen Wochen entbunden haben. Das Risiko für die Bildung eines Blutgerinnsels steigt mit der Anzahl der vorliegenden Erkrankungen und Risikofaktoren.

Flugreisen (> 4 Stunden) können Ihr Risiko für ein Blutgerinnsel vorübergehend erhöhen, insbesondere, wenn bei Ihnen weitere der aufgeführten Eaktoren vorliegen

Es ist wichtig, dass Sie Ihren Arzt informieren, wenn einer dieser Punkte auf Sie zutrifft auch wenn Sie sich nicht sicher sind. Ihr Arzt kann dann entscheiden. Cyclelle abzusetzen

Teilen Sie Ihrem Arst mit wenn as hei einem der oben enwijhnten Dunkte wijhrend der Anwandung von Curlalla zu einer Veränderung kommt, zum Beieniel wann hei einem nahen Angehörigen aus unbekannter Ursache eine Thrombose auftritt oder wenn Sie stark zu-

Blutgerinnsel in einer Arterie

nahman

Was kann passieren, wenn sich in einer Arterie ein Blutgerinnsel bildet? Genau wie ein Blutgerinnsel in einer Vene kann auch ein Gerinnsel in einer Arterie schwer-

fall bervorrufen

wiegende Probleme verursachen. Es kann zum Reispiel einen Herzinfarkt oder Schlagan-Faktoren, die das Risiko für ein Blutgerinnsel in einer Arterie erhöhen. Es ist wichtig, zu beachten, dass das Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall aufgrund der Anwendung von Cyclelle sehr gering ist, jedoch ansteigen kann:

 mit zunehmendem Alter (älter als 35 Jahre) wenn Sie rauchen. Bei der Anwendung eines kombinierten hormonalen Kontrazepti-

vums wie Cyclelle wird geraten, mit dem Rauchen aufzuhören. Wenn Sie nicht mit dem Rauchen aufhören können und älter als 35 Jahre sind, kann Ihr Arzt Ihnen raten, eine Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie ein Arzneimittel einnehmen andere Art von Verhütungsmittel anzuwenden wenn Sie übergewichtig sind

· wenn Sie einen hohen Blutdruck haben

· wenn einer Ihrer nächsten Angehörigen in jungen Jahren (jünger als 50 Jahre) einen Herzinfarkt oder Schlaganfall hatte. In diesem Fall könnten Sie ebenfalls ein erhöhtes

Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall haben. wenn Sie oder einer Ihrer n\u00e4chsten Angeh\u00f6rigen einen hohen Blutfettspiegel (Choleste-

rin oder Triglyceride) haben wenn Sie Migräne und insbesondere Migräne mit Aura haben

 wenn Sie an Herzproblemen leiden (Herzklappenerkrankung, Rhythmusstörung namens Vorhofflimmern)

wenn Sie Zucker (Diabetes) haben

Wenn mehr als einer dieser Punkte auf Sie zutrifft oder eine dieser Erkrankungen besonders schwer ist kann Ihr Risiko für die Ausbildung eines Blutgerinnsels zusätzlich erhöht sein. wendung von Cyclelle eine Veränderung gibt, zum Beispiel wenn Sie mit dem Rauchen

orlar wann Sia etark zunahman

la secon seinder enheithmeine ab

unaden Co liberten auch für Cudalle mitreffen Informationen über die Angendung und liegen night vor

Brustkrebs wurde bei Frauen, die kombinierte Pillen einnehmen, geringfügig bäufiger gefunden. Es ist iedoch nicht bekannt, ob dies auf die Einnahme der Pille zurückzuführen ist Dies kann zum Beisniel auch darauf zurückzuführen sein, dass sich Frauen, die die Pille einnehmen, öfter ärztlich untersuchen lassen und dadurch öfter Tumoren gefunden werden Nach Absetzen der kombinierten Pille nimmt die erhöhte Häufinkeit an Brustkrebserkran-

Es ist wichtig dass Sie regelmäßig Ihre Brüste abtasten. Sie sollten Ihren Arzt aufsuchen wenn Sie einen Knoten spüren. Berichten Sie Ihrem Arzt auch, wenn ein naher Verwandter Brustkrebs hat oder iemals hatte (siehe Abschnitt "Warnhinweise und Vorsichtsmaßnah-Rei Dillan-Anwanderinnen wurde selten über autertine Lebertumoren und noch seltener über hörestine Lebertumoren herichtet Suchen Sie Bren Arzt auf wenn unüblich eterke

Bauchechmarzen auftreten Es wurde darüber berichtet, dass bei Anwenderinnen von kombinierten Pillen seltener

Krebs des Endometriums (Gebärmutterschleimhaut) und der Eierstöcke auftritt. Dies könnte such für Cuclelle sutreffen, en wurde jedoch noch nicht hentiitint Psychiatrische Erkrankungen Manche Frauen, die hormonale Verhütungsmittel wie Cyclelle anwenden, berichten über

Depression oder depressive Verstimmung. Depressionen können schwerwiegend sein und gelegentlich zu Selbsttötungsgedanken führen. Wenn bei Ihnen Stimmungsschwankungen und depressive Symptome auftreten, lassen Sie sich so rasch wie möglich von Ihrem Arzt medizinisch beraten. Vinder and basedilebe

Die Sicherheit und Wirksamkeit von Cyclelle bei Jugendlichen unter 18 Jahren wurden night untersucht

Anwendung von Cyclelle zugammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie stets den Arzt, der Ihnen Cyclelle verschreibt, welche anderen Arzneimittel

oder offenzlichen Pränerete Sie einnehmen oder enwanden Informieren Sie außerdem is. den anderen Arzt oder Zahnarzt, der Ihnen ein anderes Medikament verschreibt, (bzw. Ihren

Apotheken, dass Sie Cyclelle anwenden. Sie können Ihnen auch sagen, ob Sie zusätzliche Methoden zur Empfängnisverhütung (z. B. Kondome für Männer) anwenden müssen und. falls ia, wie lange oder ob die Anwendung anderer Arzneimittel, die Sie benötigen, geändert

Einine Armeimitte

 können zu einer Mindenung der empfängnieuerhütenden Wirkeamkeit führen können zu unerwarteten Blutungen führen.

Dazu gehören Arzneimittel zur Rehandlung von:

 Follensie (z. B. Primidon, Phenytoin, Barbiturate, Carbamazenin, Oxcarbazenin, Toniramat Felhamati

 Tuberkulose (z. B. Rifampicin HIV-Infektionen (z. B. Ritonavir, Nelfinavir, Nevirapin, Efavirenz)

. Hepatitis C-Virus-Infektionen (z. B. Boceprevir, Telaprevir)

anderen Infektionskrankheiten (z. B. Griseofulvin)

hohem Blutdruck in den Blutgefäßen der Lunge (Bosentan)

 depressiver Verstimmung (das pflanzliche Heilmittel Johanniskraut [Hypericum] perforatum])

Wenn Sie Arzneimittel oder pflanzliche Pränarate einnehmen, die die Wirksamkeit von

thode angewendet werden. Andere Arzneimittel können die Wirksamkeit von Cyclelle his zu 28 Tage nachdem Sie die Anwendung beendet haben beeinflussen. Deshalb ist es notwendig, die zusätzliche empfängnisverhütende Barrieremethode ehenso lange anzuwenden. Hinweis: Verwenden Sie Cyclelle nicht zusammen mit einem Diaphragma, einer

Zervixkappe oder einem Kondom für Frauen. Ovolelle kann auch die Wirksamkeit anderer Arzneimittel beeinflussen, z. B. Armaimittal, dia Cicloenorio anthaltan

Cyclelle herabsetzen könnten, sollte zusätzlich eine empfängnisverhiltende Barriereme

· das Antiepileptikum Lamotrigin (dies könnte zu einer gesteigerten Anfallshäufigkeit füh-

Cyclelle darf nicht angewendet werden, wenn Sie Hepatitis C haben und Arzneimittel ein-

nahman walcha Ombitasvir/Paritanzavir/Ditonavir Darahuvir Glacanzavir/Dibrantasvir oder Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir enthalten, da diese Arzneimittel die Ergebnisse

eines Leberfunktionsbluttests erhöhen können (Ansteigen der ALT-Leberenzyme). Ihr Arzt wird ein anderes Verhütungsmittel vor Beginn der Behandlung mit diesen Arzneimitteln verschreiben. Zwei Wochen nach Beendigung der Behandlung kann mit Cyclelle wieder begonnen werden. Siehe Abschnitt "Cyclelle darf nicht angewendet werden"

Während der Anwendung von Cyclelle können Sie Tampons verwenden. Legen Sie zuerst

Cyclelle ein, bevor Sie einen Tampon einführen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Tampon entfernen, und achten Sie darauf, dass der Ring nicht versehentlich mit herausgezogen wird. Wenn dies doch passiert, so spülen Sie den Ring einfach mit kaltem bis lauwarmem Wasser ab und legen ihn sofort wieder ein. Der Gebrauch von Spermiziden oder Mitteln gegen Pilzinfektionen zur Anwendung in der

Scheide beeinträchtigt nicht die empfängnisverhütende Wirkung von Cyclelle. Cyclelle kann das Ergebnis einiger Labortests beeinflussen. Informieren Sie bitte deshalb

das medizinische Fachpersonal darüber, dass Sie Cyclelle anwenden, wenn bei Ihnen ein Blut- oder Urintest durchgeführt wird.

Schwangerechaft und Stillzeit

Cyclelle darf nicht von Schwangeren oder von Frauen, die vermuten, sie könnten schwan-

ger sein, angewendet werden. Wenn Sie während der Anwendung von Cyclelle schwanger werden, sollten Sie den Ring entfernen und Ihren Arzt aufsuchen

Fortsetzung auf der Rückseite >>

Sie bitte die Informationen im Abschnitt 3. "Wenn Sie die Anwendung von Cyclelle beenden wollen". Die Anwendung von Cyclelle während der Stillzeit wird üblicherweise nicht empfohlen. Wenn Sie währand der Stillzeit Cucialla smuandan undan en harrachen Sia dies hitte mit Ihram Arst

## Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es ist unwahrscheinlich, dass Cyclelle Ihre Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt

# 3 Wie ist Cyclelle anzuwenden?

Ihnen Ihr Arzt sagen, wann Sie Cyclelle einlegen sollen. Der Vaginalring muss am richtigen Tag Ihres Monatszyklus in die Scheide eignelent werden (siehe Abschnitt. Wann wird der erste Ring eingetes wonstanytois il nu control de la control Ring in liner Scheide befindet (zum Reisniel vor und nach dem Geschlechtsverkehr) um sicherzugeben dass Sie vor eine Schwangerschaft geschützt sind. Nach der dritten Woche entfernen Sie Cyclelle. Nun folgt eine 1-wöchige Anwendungspause. Normalerweise werden Sie während dieser ringfreien Zeit Ihre Monatsblutung haben.

Verwenden Sie Cyclelle nicht zusammen mit bestimmten Barrieremethoden für Frauen, wie einem Diaphragma zur Anwendung in der Scheide, einer Zervixkappe oder einem Kondom für Frauen. Diese Barrieremethoden zur Empfängnisverhiltung dürfen nicht als zusätzliche Verhütungsmethode angewendet werden da Cyclelle für die korrekte Finlage und Position eines Diaphragmas, einer Zervixkanne oder eines Kondoms für Frauen hinderlich sein kann "ledoch kann ein Kondom für den Mann als zusätzliche Rarrieremethode annewendet werden

# Wie wird Cyclelle eingelegt und entfernt

- Bevor Sie den Ring einlegen, überprüfen Sie das Verfallsdatum (siehe Abschnitt 5. "Wie ist Cyclelle aufzubewahren?").
- Waschen Sie sich Ihre H\u00e4nde, bevor Sie den Ring einlegen oder entfernen. Wählen Sie für die Einlage die für Sie beguemste Haltung, wie ein angewinkeltes Bein, hockend
- oder liegend. 4. Nehmen Sie Cyclelle aus dem Reutel. Hehen Sie den Reutel für die spätere Verwendung auf 5. Halten Sie den Ring zwischen Daumen und Zeigefinger fest, drücken Sie die gegenüberliegender
- Seiten zusammen und legen Sie den Bing in die Scheide ein (siehe Abhildungen 1–4) Wenn Cyclelle richtig eingelegt wurde, sollten Sie nichts spüren. Haben Sie das Gefühl, dass Cyclelle nicht richtig liegt, so schieben Sie den Ring behutsam etwas tiefer in die Scheide. Es ist nicht wich-
- tig, dass der Ring an einer bestimmten Stelle in der Scheide liegt. Nach drei Wochen entfernen Sie Cyclelle aus der Scheide, indem Sie mit dem Zeigefinger in den Ring einhaken oder den Rand mit zwei Fingern ergreifen und den Ring herausziehen (siehe Abbildung 5). Wenn Sie die Position des Rings in der Scheide ertastet haben, ihn iedoch nicht entfernen können, so sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.
- 7. Der gebrauchte Ring kann, vorzugsweise im wieder verschließharen Beutel, mit dem Haushaltsmüll entsorat werden. Ritte entsoraen Sie Cyclelle nicht über die Toilette





Nehmen Sie Cyclelle aus dem Beutel





Nehmen Sie für die Einlage des Rings eine bequeme Haltung ein



Abbildung 3





Abbildung 4C

Eilbran Sie dan Bing mit einer kland in die Scheide ein (Abhildung 4A): falle notwendig können die Schamlippen mit der anderen Hand gespreizt werden. Schleben Sie den Ring in die Scheide his er sich angenehm eingepasst anfühlt (Abbildung 4B). Lassen Sie den Ring 3 Wochen lang in dieser Position (Abbildung 4C).

Cyclelle kann durch Einhaken des Zeigefingers oder Fassen mit dem Zeige- und Mittelfinger aus der Scheide entfernt werden

## Wenn Sie die Anwendung von Cyclelle beenden wollen, weil Sie schwanger werden möchten, beachten Drei Wochen Anwendung, eine Woche Pause

- Mit Beginn der Einlage muss der Vaginalring drei aufeinander folgende Wochen ununterbrochen aingelegt bleiben
- Nach drei Wochen entfernen Sie den Ring am selben Wochentag und ungefähr zur gleichen Zeit.
  - mi dar Sia dan Ring aingalagt hahan. Zum Baignial: Sia hahan Cuclalla an ainam Mittunch ungafilhr um 22:00 Libr einnelent. Dann sollten Sie Curlelle drei Wochen später am Mittunch ungefähr um 22-00 Libr entfernen 2 Nachdam Sie dan Ding entfernt haben, wenden Sie eine Worke Jang keinen Ding an Wilhmord die-
- ser Woche sollten Sie Ihre Monatsblutung bekommen. Diese beginnt gewöhnlich zwei bis drei Tage. nachdam Sia Ovclalla antfarnt haban
- Sehr selten kann Cyclelle brechen. Im Zusammenhang mit einem Ringbruch wurde über Verletzungen in Nach genau einer Woche (wieder am gelhen Wochentag umgeführ zur gleichen Zeit) legen Sie einen der Scheide herichtet. Wenn Sie hemerken, dere Oudelle gehanden ist en verwenden Sie diesen Bing neuen Ring ein. Auch dann, wenn Ihre Monatsblutung noch anhält. nicht weiter enndern herinnen Sie en hald wie möglich mit einem neuen Bing Benützen Sie wilhrend der nächsten sieben Tage zusätzliche Verhütungsmethoden (wie ein Kondom für den Mann). Hatten
- Sie können Cyclelle selbst einlegen und entfernen. Wenn Sie zum ersten Mal Cyclelle anwenden, wird Wenn der neue Ring mehr als drei Stunden zu spät eingelegt wird, kann die empfängnisverhütende Wirkung beeinträchtigt sein. Folgen Sie den Anweisungen in Abschnitt "Was ist zu tun, wenn Sie vergessen haben, nach der ringfreien Zeit einen neuen Ring einzulegen\*

ungefähr zur gleichen Zeit bekommen.

### Wann wird der erete Ring eingelegt

 Wenn Sie im vorangegangenen Monat keine hormonalen Verhütungsmittel angewendet haben Lagan Sie den ereten Bing am ereten Tag Ihree Monateruklue (d. h. am ereten Tag der Monatehlutunn) ein Cuclelle beginnt enfort zu wirken. Sie miliesen keine anderen Verhütungsmethoden anwen-

Sie vergessen haben, nach der ringfreien Zeit einen neuen Ring einzulegen Sie können Cyclelle auch an den Tagen 2-5 Ihres Monatszyklus einlegen. Allerdings sollten Sie dann während der ersten sieben Tage der Cyclelle-Anwendung zusätzlich ein anderes Verhütungsmittel für Männer), wenn Sie innerhalb der nächsten sieben Tage Geschlechtsverkehr haben. Hatten Sie • Flüssigkeitsansammlungen im Körper (Öderne)

### Wenn Sie im vorangegangenen Mogat eine kombinierte Pille eingenommen haben.

Legen Sie Cyclelle spätestens am ersten Tag nach der tablettenfreien Zeit Ihrer Pille ein Enthält Ihre. Sie vergessen haben, den Ring zu entfernen Pillennackung auch Tabletten ohne Wirkstoff legen Sie Cyclelle spätestens am ersten Tag nach der Finnahme der letzten wirkstofffreien Tablette ein. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Tablette dies ist fragen Sie Ihren Arzt oder Anotheker Verlängern Sie niemals die vorgeschriebene hormonfreie Zeit der Pille. Wenn Sie die Pille regelmäßig und korrekt eingenommen haben und Sie sich sicher sind dass Sie nicht schwanger sind, können Sie an iedem beliebigen Tag die Pilleneignahme beenden und safort mit der Anwendung von Cyclelle beginnen

 Wenn Sie im vorangegangenen Monat ein Verhütungspflaster angewendet haben Legen Sie Guclelle spätestens am ersten Tag nach der pflasterfreien Zeit ein Verlängern Sie niemals die vorgeschriebene offasterfreie Zeit

Wenn Sie das Verhütungspflaster regelmäßig und korrekt angewendet haben und Sie sich sicher sind, dass Sie nicht schwanger sind, können Sie an jedem beliebigen Tag die Anwendung des Verhütungspflasters beenden und sofort mit der Anwendung von Cyclelle beginnen.

Wenn Sie im vorangegangenen Monat eine Minipille (reine Gestagen-Pille) eingenommen haben Sie können die Einnahme der Minipille an jedem beliebigen Tag beenden und am nächsten Tag zur gewohnten Einnahmezeit Cyclelle einlegen. Benutzen Sie aber während der ersten sieben Tage der Anwendung des Rings zusätzliche Verhütungsmethoden (wie ein Kondom), wenn Sie Geschlechtsverkehr haben

. Wenn Sie im vorangegangenen Monat eine Hormonspritze, ein Implantat oder eine hormonhaltige Während der Anwendung von Cyclelle treten bei einigen Frauen zwischen den normalen Monatsblutun-Spirale (ein IUD - intrauterines Gestagen-Freisetzungssystem) angewendet haben gen unerwartete Blutungen aus der Scheide auf. Es könnte sein, dass Sie entsprechende Hygieneartikel Legen Sie Cyclelle an dem Tag ein an dem Ihre nächste Hormonspritze fällig wäre, oder an dem Tag an dem Ihr Implantat oder die hormonhaltige Spirale entfernt wird. Benutzen Sie aber während der wie gewohnt fort. Dauern die unregelmäßigen Blutungen an, werden sie stärker oder wiederholen sich diese, so suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.

ersten siehen Tage der Anwendung des Rings zusätzliche Verbütungsmethoden (wie ein Kondom) wenn Sie Geschlechtsverkehr haben Nach einer Geburt

## Nach einer Geburt wird Ihnen Ihr Arzt raten, dass Sie Ihre erste normale Monatsblutung abwarten,

bevor Sie mit der Anwendung von Cyclelle beginnen. Manchmal ist es auch möglich, früher zu beginnen. Ihr Arzt wird Sie entsprechend beraten. Wenn Sie stillen und Cyclelle anwenden wollen. sollten Sie dies erst mit Ihrem Arzt besprechen

Nach einer Fehlgeburt oder einem Schwangerschaftsabbruch Ihr Arzt wird Sie entsprechend beraten

#### Was ist zu tun, wenn.

#### Ihr Ring versehentlich aus Ihrer Scheide ausgestoßen wurde Cyclelle kann versehentlich aus der Scheide ausgestoßen werden zum Beisniel falls der Ring nicht

korrekt eingelegt wurde hei der Entfernung eines Tampons während des Geschlechtsverkehrs hei Verstonfung oder bei einem Gebärmuttervorfall. Deshalb sollten Sie regelmäßig prüfen, ob sich der Ring. noch in Ihrer Scheide befindet (zum Beispiel vor und nach dem Geschlechtsverkehr)

Wenn der Ring weniger als drei Stunden außerhalb der Scheide war, ist die empfängnisverhütende Wirkung nicht beeinträchtigt. Spülen Sie den Ring mit kühlem bis lauwarmem (nicht heißem) Wasser ab und legen Sie ihn wieder ein. Wenn der Ring mehr als drei Stunden außerhalb der Scheide war, kann die empfängnisverhütende Wirkung beeinträchtigt sein. Siehe Hinweise im Abschnitt "Was ist zu tun, wenn ... Ihr Ring zeitweise außerhalb der Scheide war\*.

## Ihr Ring zeitweise außerhalb der Scheide war

Innerhalb der Scheide setzt Cyclelle langsam Hormone in den Körper frei, um eine Schwangerschaft zu verhindern. Wenn der Ring länger als drei Stunden außerhalb der Scheide war, kann er Sie möglicherweise nicht mehr vor einer Schwangerschaft schützen. Deshalb darf der Ring innerhalb von 24 Stunden niemals länger als drei Stunden außerhalb der Scheide sein.

 Wenn der Ring weniger als drei Stunden außerhalb der Scheide war, ist die empfängnisverhütende Wirkung nicht beeinträchtigt. Sie sollten den Ring so rasch wie möglich, iedoch spätestens innerhalb von drei Stunden wieder einlegen.

Wenn der Ring während der ersten oder zweiten Anwendungswoche mehr als drei Stunden au-Berhalb der Scheide war oder Sie dies vermuten, könnte die empfängnisverhütende Wirkung herabgesetzt sein. Legen Sie den Ring wieder in die Scheide ein, sobald Sie daran denken. Der Ring muss mindestens die nächsten sieben Tage ohne Unterbrechung eingelegt bleiben. Wenn Sie während dieser sieben Tage Geschlechtsverkehr haben, so benützen Sie zusätzlich ein Kondom, Befinden Sie sich in der ersten Anwendungswoche und Sie hatten während der vorangegangenen sieben Tage Geschlechtsverkehr, könnten Sie schwanger geworden sein. In diesem Fall kontaktieren Sie bitte

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei iedem auftreten müssen. Wenn Sie Nebenwirkungen bekommen, insbesondere wenn diese schwerwiegend Wenn der Ring während der dritten Anwendungswoche mehr als drei Stunden außerhalb der Scheide war oder Sie dies vermuten, könnte die empfängnisverhütende Wirkung herabgesetzt sein. Sie sollten diesen Ring entsorgen und eine der folgenden Möglichkeiten wählen:

1) Legen Sie sofort einen neuen Ring ein. Dedurch starten Sie die nächsten drei Anwendungswochen. Ihre Monatsblutung gerinnsel in den Venen (venöse Thromboembolie, VTE) oder Arterien (arterielle Thromboembolie, ATE). Umkarten und dem Beutel nach "verwendbar bis" oder "verw. bis" angegeben ist. Das Verfallsdatum kann ausbleiben, es könnten iedoch Durchbruchblutungen oder Schmierblutungen auftreten.

21 Legger Sie keinen Ring ein. Warten Sie ihre Monatsblutung ab und legger Sie dann innerhalb ter hormonaler Kontrazzectiva siehe Abschnitt 2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Cyclelle be- Wenden Sie Cyclelle nicht an. wenn Sie Farbveränderungen oder sichtbare Anzeichen einer Beschädivon sieben Tagen, nachdem der vorherige Ring ausgestoßen oder entfernt wurde, einen neuen achten?".

eiahan Tanan ununterbrochen annewandet hatten

ren Sie Ihren Arzt, bevor Sie einen neuen Ring einlegen.

Cia llama Aust and mana disea Decalmondes fortheatabas

dauerte, desto größer ist das Risiko, dass Sie schwanger geworden sind

Kontaktieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie einen neuen Ring einlegen.

Sie haben die Anwendungshinweise für Cyclelle genau befolgt

wenn Ihr Arzt eine Schwangerschaft ausgeschlossen hat.

Sie den ersten Tag Ihrer Monatsblutung verschieben wollen

(aber niemals verlängern!) Sie die ringfreie Zeit.

Sie Ihre Monatsblutung verzögern wollen

rauchten Ring einen neuen Ring einlegen

Wenn Sie die Anwendung von Cyclelle beenden wollen

4 Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Sie haben die Anwendungshinweise für Cyclelle nicht befolgt

Ihre Monatshlutung ausgeblieben ist

Sie unerwartete Blutungen haben

früher als gewohnt einlegen.

trächtigt. Fahren Sie mit einer ringfreien Woche fort und setzen Sie dann einen neuen Bing ein

Wenn Ihr Ring mehr als 4 Wochen eingelegt war besteht die Möglichkeit schwanger zu werden

Wenn Ihre Manatshlutung ausgeblieben ist. Sie iedoch die Anwendungshinweise für Cyclelle genau.

befolgt und keine anderen Arzneimittel eingenommen/angewendet haben, so ist es sehr unwahr-

Bleiht Ihre Monatshlutung iedoch zweimal hintereinander aus, so besteht die Möglichkeit, dass Sie

dass Sie schwanger sind. Suchen Sie Ihren Arzt auf, bevor Sie einen neuen Ring einlegen.

anwenden müssen. Belassen Sie den Ring auf ieden Fall in der Scheide und setzen Sie die Anwendung

Wenn Sie Cyclelle wie vorgeschrieben anwenden, wird Ihre Monatsblutung (Abbruchblutung) in der

ringfreien Woche beginnen. Wenn Sie den ersten Tag der Monatsblutung ändern wollen, so verkürzen

Wenn Sie die rinafreie Zeit sehr verkürzen (z. B. drei Tage oder weniger), so kann es sein, dass Ihre

Der neue Ring kann bis zu drei Wochen in der Scheide verbleiben. Während der Anwendung des neuen

Rings können Schmierblutungen (Blutstropfen oder Blutflecken) oder Durchbruchblutungen auftreten.

Wenn Sie möchten, dass Ihre Monatsblutung beginnt, entfernen Sie den Ring einfach. Halten Sie die

Schmierblutungen (Blutstropfen oder Blutflecken) oder Durchbruchblutungen auftreten

France Sie Breen Arst um Det wenn Sie eich nicht eicher eind wie Sie vormehen enllen

male einwöchige ringfreie Zeit ein und legen Sie dann einen neuen Ring ein

Sie können die Anwendung von Cyclelle, wann immer Sie wollen. beenden.

gewohnte Monatsblutung ausbleibt. Während der Anwendung des nächsten Rings können jedoch

scheinlich, dass Sie schwanger sind. Fahren Sie mit der Anwendung von Cyclelle wie gewohnt fort.

schwanger sind. Besprechen Sie dies sofort mit Ihrem Arzt. Wenden Sie den nächsten Ring erst an.

Ihr Ring bricht

Von dieser Möglichkeit sollten Sie nur Gebrauch machen, wenn Sie Cyclelle in den vorangegangenen

auna hemerker

## Schwerwiegende Nebenwirkungen

Mann Curtalla für eine unheirannte Zeit außerhalb der Vanina war eind Sie mönlichenweise nicht und/oder Schwierigkeiten beim Schlucken oder Nesselsucht werbunden mit Schwierigkeiten beim Atmehr vor einer Schwangerschaft geschützt. Machen Sie einen Schwangerschaftstest und konsultiemen eisehe auch Abschrintt, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen"). Treten diese Anzeichen auf, so entfernen Sie Cyclelle und suchen Sie unverzüglich Ihren Arzt auf.

#### Mäufier kann hie zu 1 von 10 Erauen hetreffen Bauchechmerren Übelkeit

- Sie Geschlechtsverkehr, bevor Sie bemerkten, dass der Ring gebrochen ist, so kontaktieren Sie bitte Infektionen der Scheide durch Hefe-Keime (wie "Soor"); Unbehagen in der Scheide aufgrund des
  - Kopfschmerzen oder Migräne: depressive Verstimmung: verminderter Sexualtrieb
- . Brustschmerzen: Schmerzen im Becken: schmerzhafte Monatsblutungen Es liegen keine Meldungen über schwerwiegende Auswirkungen einer Überdosierung der in Cyclelle . Akna
- enthaltenen Hormone vor. Wenn Sie versehentlich mehr als einen Ring eingelegt haben, können Übel- Gewichtszunahme keit. Erbrechen oder Zwischenblutungen auftreten. Entfernen Sie die überzähligen Ringe und suchen • Der Ring wird ausgestoßen.
  - Gelegentlich: kann his zu 1 von 100 Frauen betreffen
- Sehstörungen; Schwindel Wenn Ihre ringfreie Zeit länger als sieben Tage dauerte: Sobald Sie dies bemerken, legen Sie ei - aufgeblähter Bauch; Erbrechen; Durchfall oder Verstopfung
- nen neuen Ring in die Scheide ein. Benützen Sie zusätzliche Verhütungsmethoden (wie ein Kondom Müdigkeit, Unwohlsein, Reizbarkeit; Stimmungsänderungen; Stimmungsschwankungen
- (wie ein Kondom) anwenden, wenn Sie Geschlechtsverkehr haben. Dies gilt jedoch nur, wenn Sie während der ringfreien Zeit Geschlechtsverkehr, so besteht die Möglichkeit, dass Sie schwanger 

  Blassnentzündung der Entzündung der Entzündung der Harnwege geworden sind. In diesem Fall kontaktieren Sie unverzünlich Ihren Azzt. Je länger die ringfreie Zeit an
  Schwierigkeiten oder Schmerzen beim Wasserfassen: verstärktes Hamdranggefühl vermehrtes
  - Probleme während des Geschlechtsverkehrs wie Schmerzen Blutungen oder der Sexualnartner
  - Wenn Ihr Ring 3 bis 4 Wochen eingelegt war, ist die empfängnisverhütende Wirkung nicht beeinspürt den Hing
    Blutdruckerhöhung
    Blutdruckerhöhung Appetitzupshme
    - Rückenschmerzen: Muskelkrämpfe: Schmerzen in den Beinen oder Armen herabgesetzte Empfindlichkeit der Haut
    - Brustschmerzen oder Vergrößerung der Brüste: fibrozystische Mastopathie (Zysten in den Brüsten. die anschwellen oder schmerzhaft werden können Entzündung des Gebärmutterhalses; Bildung von Polypen im Gebärmutterhals (Geschwülste im Ge-
    - bärmutterhals): Ausstülpung des Gebärmutterhalses (Ektropion) Veränderungen des Blutungsverhaltens (es kann z. B. zu starken, langen oder irregulären Monatsblutungen kommen oder diese können gänzlich ausbleiben): Beschwerden im Beckenbereich: prä-
    - menstruelles Syndrom: Gebärmutterkrampf Scheidenentzündung (verursacht durch Bakterien oder Pilze); Brennen, Geruch, Schmerzen, Be-
  - schwerden oder Trockenheit in der Scheide oder den äußeren Geschlechtsteilen Haarausfall, Ekzeme, Juckreiz, Hautausschlag oder Hitzewallungen Mann Ibra Monatehkitung susgahliahan ist. Sia dia Anwandungshirusaisa für Curlalla nicht hafolgt haben und die zu enwartende Monatehlutung in der ereten rindfreien Zeit aushleiht. könnte er sein

#### Selten: kann bis zu 1 von 1.000 Frauen betreffen gesundheitsschädliche Blutgerinnsel in einer Vene oder Arterie, zum Beispiel:

- in einem Bein oder Fuß (d. h. VTF)
- in einer Lunge (d. h. LF) Herzinfarkt
- Schlaganfal
- Mini-Schlaganfall oder vorübergehende, einem Schlaganfall ähnelnde Symptome, die als transitorische ischämische Attacke (TIA) bezeichnet werden Blutgerinnsel in der Leber, dem Magen/Darm, den Nieren oder dem Auge.
- Die Wahrscheinlichkeit für ein Blutgerinnsel kann erhöht sein, wenn Sie an einer anderen Erkrankung leiden, die dieses Risiko erhöht (weitere Informationen zu den Erkrankungen, die das Risiko für ein Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im November 2024
- Blutgerinnsel erhöhen und die Symptome eines Blutgerinnsels siehe Abschnitt 2). Zum Beispiel: Beginnt Ihre Monatsblutung gewöhnlich an einem Freitag, so können Sie dies ab dem \* Absonderung aus der Brustdrüse nächsten Monat auf den Dienstag (drei Tage früher) verschieben. Sie müssen den Ring nur drei Tage Nicht bekannt: Häufickeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar
  - Chloasma (gelblich-braune Pigmentflecken in der Haut, vorwiegend im Gesicht) Penisheschwerden beim Sexualnartner (wie Hautreizung, Hautausschlag, Juckreiz)
  - der Ring kann ohne ärztliche Unterstützung nicht entfernt werden (z. B. weil der Ring an der Scheidenwand anhaftet) vaginale Verletzung auf Grund eines gebrochenen Rings.

Bei Anwenderinnen von kombinierten hormonalen Kontrazeptiva wurde über Brustkrebs und Lebertumoren herichtet. Weitere Informationen hierzu siehe Abschnitt 2. Warnbinweise und Vorsichtsmaß-Obwohl dies nicht der empfohlenen Anwendungsvorschrift entspricht, können Sie Ihre Monatsblutung nahmen Krebs\*

Übbruchblukuna) verzögern, indem Sie die ringfreie Zeit auslassen und unmittelbar nach dem ge-In sehr seltenen Fällen kann Cyclelle brechen. Weitere Informationen hierzu siehe Abschnitt 3, "Was ist zu tun wenn ... Ihr Ring bricht". Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Neberwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt der Sie können Ihren Arzt um Rat fragen, bevor Sie sich dazu entscheiden, Ihre Monatsblutung zu verzögern. Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Abt. Pharmakovigilanz Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3 D-53175 Bonn

Wenn Sie nicht schwanger werden möchten, so fragen Sie Ihren Arzt nach anderen Verhütungsmetho-Website: https://www.bfarm.de

Wenn Sie die Anwendung von Cyclelle aufgrund eines Kinderwursches beenden, so sollten Sie eine anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen normale Monatsblutung abwarten, bevor Sie versuchen, schwanger zu werden. Dies hilft, den Geburtsüber die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Wie ist Cyclelle aufzubewahren?

# Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Wenn Sie bemerken, dass ein Kind mit den in Cyclelle enthaltenen Hormonen in Kontakt gekommen ist, so fragen Sie Ihren Arzt um Bat und arhaltend sind, oder wenn sich Ihr Gesundheitszustand verändert und Sie dieses auf Cyclelle zu-Für dieses Arzneimittel sind bezüglich der Temperatur keine besonderen Lagerungsbedingungen er-

forderlich. In der Originalvernackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen Alle Frauen, die kombinierte hormonale Kontrazeptiva anwenden, haben ein erhöhtes Risiko für BlutCyclelle sollte spätestens 1 Monat vor Ablauf des Verfallsdatums eingelegt werden, welches auf dem Weitere Einzelheiten zu den verschiedenen Filsiken im Zusammenhang mit der Anwendung kombinier-bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Dieses Arzneimittel kann ein Risiko für die I Imwelt darstellen. Nach dem Entfernen sollte Cyclelle in den

Wenden Sie sich unverziglich an einen Arzt wenn hei Ihnen eines der folgenden Symptome (Häufigkeit wiederverschließbaren Reutel zurückgegeben werden. Der verschlossene Reutel sollte entsprechend unbekannt) eines Anginädems auftritt: Schwellungen des Gesichts, der Zunge und/oder des Rachens, den nationalen Anforderungen mit dem normalen Hausmüll entsordt oder zur korrekten Entsorgung in

Spülen Sie Ovclelle nicht in der Tollette hinunter. Entsorgen Sie, wie andere Arzneimittel auch, ungebrauchte oder verfallene Ringe nicht im Abwasser. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie ungebrauchte Ringe Anwenderingen eines Etnongestrel/Ethinylestrarfiol-haltigen Rings haben über folgende Neberwirkun-Zu entsorgen sind, die nicht mehr benötigt werden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei

# Inhalt der Packung und weitere Informationen Was Cyclelle enthält

# Die Wirkstoffe sind: Etonogestrel und Ethinylestradiol

Cyclelle enthält 11 0 mg Etonogestrel und 3 474 mg Ethinylestradiol. Der Ring setzt über einen Zeitraum

von 3 Wochen über 24 Stunden im Durchschnitt 120 Mikrogramm Etonogestrel und 15 Mikrogramm Ethioptoptical feet Die sonstigen Bestandteile sind: Polylethylen-co-vinylacetat) (72:28) (28 % Vinylacetat) und Polyure-

## than (ain Kunstetoff, der nicht vom Körner aufgenommen wird) Wie Cyclelle gussieht und Inhalt der Packung

Vaninalae Wirketofffraieat a massustam

Cyclelle ist ein biedsamer, durchsichtiger, farbloser bis fast farbloser Ring, mit einem Außendurchmesser von 54 mm und einem Querschnittsdurchmesser von 4 mm Lardon Dinas int in aircon Atronio implantal companial Day Boutal int accommon mit dinasa Boulo manhoi Jace und Aufklebern für Ihren Kalender in einer Faltschachtel vernackt. Die Aufkleber helfen Ihnen daran

zu denken, wann Sie den Ring einlegen und entfernen müssen. lada Estrechachtal anthält 1, 3 odar 6 Dino(a)

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

# Pharmazeutischer Unternehmer

Mayel AG Industriaetraßa 28

Telefon: (08024) 908-0

## Telefax: (08024) 908-1290 F-Mail: service@hexal.com

## Laboratorios León Farma S.A. C/ La Vallina s/n

Niederlander

Poligono Industrial Navateiera 24193 Villaguilambra, Laón

#### Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen Solvetta Vaginalring 0.120 mg/0.015 mg pro 24 Stunden - vaginales Wirkstofffrei-Österreich:

setzunassysten Deutschland: Cyclelle Italian: Solvetta

> Etonogestrel / Ethinylestradiol Sandoz 0.120 mg /0.015 mg per 24 uur, hulpmiddel voor vaninaal gebruik

Ihre Ärztin/Ihr Arzt, Ihre Apotheke und Hexal wünschen aute Besserung!

# 50110270\_917124-01