

diarrhoesan[®] elektrolyt

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) • Mit Zucker und Süßungsmittel • Verbraucherinformation

Zum Diätmanagement bei Durchfallerkrankungen mit erhöhtem Bedarf an Flüssigkeit und Elektrolyten

Für Kinder und Erwachsene – mit Heidelbeer-Geschmack

Bitte lesen Sie diese Information aufmerksam durch, da sie wichtige Angaben darüber enthält, was bei der Anwendung dieses Lebensmittels für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zu beachten ist. Wenden Sie sich bei Fragen an die Firma Dr. Loges + Co. GmbH, Postfach 1262, 21412 Winsen (Luhe), Tel. 04171 707-0 oder schreiben Sie eine E-Mail an info@loges.de. Vertrieb in Österreich: Dr. Loges Österreich GmbH, Mayrwiesstraße 25, 5300 Hallwang bei Salzburg, www.loges.at.

| Nährwertdeklaration | Pro 100 g | Pro 100 ml | Pro Portion | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | 1 Beutel | 2 Beutel |
| Energie | 1.417 kJ/ 333 kcal | 45 kJ/ 11 kcal | 89 kJ/ 21 kcal | 178 kJ/ 42 kcal |
| Fett | < 0,5 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 76 g | 2,4 g | 4,8 g | 9,6 g |
| davon Zucker | 62 g | 2,0 g | 3,9 g | 7,8 g |
| Glukose (Dextrose) | 60 g | 1,9 g | 3,8 g | 7,6 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Salz | 11 g | 0,35 g | 0,69 g | 1,4 g |
| Natrium | 4.384 mg | 138 mg | 276 mg | 552 mg |
| Kalium | 2.481 mg | 78 mg | 156 mg | 312 mg |
| Chlorid | 4.508 mg | 142 mg | 284 mg | 568 mg |

Konzentration der fertigen Lösung: Natrium 60 mmol/l, Kalium 20 mmol/l, Chlorid 40 mmol/l, Citrat 16 mmol/l, Glukose (Dextrose) 105 mmol/l und Osmolarität nach Zubereitung ca. 241 mmol/l

diarrhoesan[®] elektrolyt ist in seiner speziellen Formulierung mit Mineralien und Glukose so zusammengesetzt, dass ein mit Durchfallerkrankungen einhergehender erhöhter Bedarf an Elektrolyten und Flüssigkeit gezielt gedeckt werden kann. Das Mengenverhältnis der Bestandteile ist genau auf die gestörte Resorption der Patienten abgestimmt und entspricht, wie auch die Osmolarität der zubereiteten verzehrfertigen Lösung, den Empfehlungen pädiatrischer Leitlinien.

diarrhoesan® elektrolyt



Zutaten

Dextrose-Anhydrat, Maltodextrin, Natriumchlorid, Trikaliumcitrat-Monohydrat, Trinatriumcitrat-Dihydrat, Heidelbeer-Fruchtpulver, Heidelbeer-Extrakte, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Süßungsmittel: Sucralose



vegan



lactosefrei



glutenfrei

Pro Portionsbeutel = 6,3 g Pulvermischung

Anwendungshinweis

Der Inhalt eines Beutels wird – unmittelbar vor Verwendung – in 200 ml Trinkwasser gelöst und direkt getrunken. Achten Sie bei der Zubereitung bitte genau auf das angegebene Mischungsverhältnis.

Die Häufigkeit der Anwendung von diarrhoesan® elektrolyt richtet sich nach dem individuellen Bedarf. In der Regel mehrmals täglich bzw. nach jedem flüssigen Stuhlgang:

- Kinder ab 3 Jahren: 1 Beutel nach jedem Stuhlgang, max. 5 Beutel in 24 Stunden.
- Kinder ab 4 Jahren: 1 Beutel nach jedem Stuhlgang, max. 8 Beutel in 24 Stunden.
- Jugendliche und Erwachsene: 1 bis 2 Beutel nach jedem Stuhlgang.

Die individuelle Dauer der Anwendung richtet sich nach der Anweisung des Arztes. Sollte der Durchfall länger andauern, ist nochmals der Arzt aufzusuchen.

- Kinder ab 3 Jahren: In der Regel 6–12 Stunden, 24 Stunden sollten nicht überschritten werden.
- Kinder ab 4 Jahren, Jugendliche und Erwachsene: Bis zum Abklingen des Durchfalls, höchstens 36 Stunden.

Über Dr. Loges

Die einzigartige Kraft der Natur hat uns schon immer fasziniert. Seit 1958 entwickeln, produzieren und vertreiben wir als deutsches Familienunternehmen in zweiter Generation Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel. Gemäß dem Leitgedanken „Dr. Loges – ganz meine Natur“ bezeugen heute über 70 apothekenexklusive Präparate unsere tiefe Verbundenheit von Mensch und Natur.

Wichtige Hinweise

Bei diarrhoesan® elektrolyt handelt es sich um eine bilanzierte Diät. Dieses Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke ist nicht als einzige Nahrungsquelle geeignet und darf nur unter ärztlicher Aufsicht verwendet werden.

Geeignet für Kinder ab 3 Jahren, Jugendliche und Erwachsene.

Tritt nach 36 Stunden keine Besserung ein, sollte unbedingt erneut ein Arzt aufgesucht werden.

Bei Herzleistungsschwäche (Herzinsuffizienz) und erhöhtem Blutdruck ist wegen der zugeführten Flüssigkeits- und Natriummengen ein Arzt zu befragen. Aufgrund des Glukose-Gehaltes sollten Diabetiker diarrhoesan® elektrolyt nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt einnehmen.

diarrhoesan® elektrolyt darf nicht bei eingeschränkter Nierenfunktion, unstillbarem Erbrechen, Bewusstseinstörung bzw. Schock bei schweren Flüssigkeitsmangelzuständen, metabolischer Alkalose, Monosaccharid-Malabsorption und Verschlusskrankheiten im Verdauungstrakt verwendet werden.

Nicht zur parenteralen Anwendung geeignet.

Bitte bewahren Sie diarrhoesan® elektrolyt an einem trockenen Ort, vor Licht geschützt und nicht über 25 °C auf.

Packungsgrößen

diarrhoesan® elektrolyt ist in einer Packung mit 10 Portionsbeuteln in der Apotheke erhältlich.