

PZN: 16149603	Datum: 11.10.24 [V24-01]
Produktname: diarrhoesan® elektrolyt	Dr. Loges + Co. GmbH Schützenstraße 5 21423 Winsen (Luhe)

Status:

- ☐ Nahrungsergänzungsmittel ☐ Lebensmittel ☒ diätetisches Lebensmittel
☐ _____

Zutaten:

Dextrose-Anhydrat, Maltodextrin, Natriumchlorid, Trikaliumcitrat-Monohydrat, Trinatriumcitrat-Dihydrat, Heidelbeer-Fruchtpulver, Heidelbeer-Extrakte, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Süßungsmittel: Sucralose

Zusammensetzung:

Nährwertdeklaration	Pro 100 g	Pro 100 ml	Pro Portion	
			1 Beutel	2 Beutel
Energie	1.417 kJ/333 kcal	45 kJ/11 kcal	89 kJ/21 kcal	178 kJ/42 kcal
Fett	< 0,5 g	0 g	0 g	0 g
davon gesättigte Fettsäuren	< 0,1 g	0 g	0 g	0 g
Kohlenhydrate	76 g	2,4 g	4,8 g	9,6 g
davon Zucker	62 g	2,0 g	3,9 g	7,8 g
Glukose (Dextrose)	60 g	1,9 g	3,8 g	7,6 g
Eiweiß	< 0,5 g	0 g	0 g	0 g
Salz	11 g	0,35 g	0,69 g	1,4 g
Natrium	4.384 mg	138 mg	276 mg	552 mg
Kalium	2.481 mg	78 mg	156 mg	312 mg
Chlorid	4.508 mg	142 mg	284 mg	568 mg

Packung enthält 10 bzw. 5 Portionen.

Konzentration der fertigen Lösung:

Natrium 60 mmol/l, Kalium 20 mmol/l, Chlorid 40 mmol/l, Citrat 16 mmol/l, Glukose (Dextrose) 105 mmol/l und Osmolarität nach Zubereitung ca. 241 mmol/l

Aufbewahrungsbedingung und ggf. Verwendungsbedingung nach dem Öffnen:

Bitte bewahren Sie diarrhoesan® elektrolyt an einem trockenen Ort, vor Licht geschützt und nicht über 25 °C auf.

Nettofüllmenge/Stückzahl/Abtropfgewicht:

10 Portionsbeutel = 63 g

Gebrauchsanleitung, Zubereitungshinweis, sonstige Hinweise:

Anwendungshinweis:

Der Inhalt eines Beutels wird - unmittelbar vor Verwendung - in 200 ml Trinkwasser gelöst und direkt getrunken. Achten Sie bei der Zubereitung bitte genau auf das angegebene Mischungsverhältnis.

Die Häufigkeit der Anwendung von diarrhoesan® elektrolyt richtet sich nach dem individuellen Bedarf. In der Regel mehrmals täglich bzw. nach jedem flüssigen Stuhlgang:

- Kinder ab 3 Jahren: 1 Beutel nach jedem Stuhlgang, max. 5 Beutel in 24 Stunden.
- Kinder ab 4 Jahren: 1 Beutel nach jedem Stuhlgang, max. 8 Beutel in 24 Stunden.
- Jugendliche und Erwachsene: 1 bis 2 Beutel nach jedem Stuhlgang.

Die individuelle Dauer der Anwendung richtet sich nach der Anweisung des Arztes. Sollte der Durchfall länger andauern, ist nochmals der Arzt aufzusuchen.

- Kinder ab 3 Jahren: In der Regel 6-12 Stunden, 24 Stunden sollten nicht überschritten werden.
- Kinder ab 4 Jahren, Jugendliche und Erwachsene: Bis zum Abklingen des Durchfalls, höchstens 36 Stunden.

Wichtige Hinweise:

Bei diarrhoesan® elektrolyt handelt es sich um eine bilanzierte Diät. Dieses Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke ist nicht als einzige Nahrungsquelle geeignet und darf nur unter ärztlicher Aufsicht verwendet werden.

Geeignet für Kinder ab 3 Jahren, Jugendliche und Erwachsene.

Tritt nach 36 Stunden keine Besserung ein, sollte unbedingt erneut ein Arzt aufgesucht werden.

Bei Herzleistungsschwäche (Herzinsuffizienz) und erhöhtem Blutdruck ist wegen der zugeführten Flüssigkeits- und Natriummengen ein Arzt zu befragen. Aufgrund des Glukose-Gehaltes sollten Diabetiker diarrhoesan® elektrolyt nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt einnehmen.

diarrhoesan® elektrolyt darf nicht bei eingeschränkter Nierenfunktion, unstillbarem Erbrechen, Bewusstseinstörung bzw. Schock bei schweren Flüssigkeitsmangelzuständen, metabolischer Alkalose, Monosaccharid-Malabsorption und Verschlusskrankheiten im Verdauungstrakt verwendet werden.

Nicht zur parenteralen Anwendung geeignet.