

**Gebrauchsinformation: Information für Anwender**  
**Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray Honig- und Zitronengeschmack 8,75 mg/ Dos**  
**Spray zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung**  
 Für Erwachsene Flurbiprofen

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**  
 - Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4. Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

**Was in dieser Packungsbeilage steht**  
 1. Was ist Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray Honig- und Zitronengeschmack und wofür wird es angewendet?  
 2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray

Honig- und Zitronengeschmack beachten?  
 3. Wie ist Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray Honig- und Zitronengeschmack anzuwenden?  
 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?  
 5. Wie ist Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray Honig- und Zitronengeschmack aufzubewahren?  
 6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

**1. Was ist Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray Honig- und Zitronengeschmack und wofür wird es angewendet?**

Der Wirkstoff ist Flurbiprofen. Flurbiprofen gehört zu einer Gruppe von Arzneimitteln, die man nicht-steroidale entzündungshemmende Arzneimittel (NSAR) nennt. Diese Arzneimittel wirken, indem sie die Reaktion des Körpers auf Schmerzen, Schwellungen und erhöhte Temperatur beeinflussen. Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray Honig- und Zitronengeschmack wird zur kurzzeitigen Linderung der Symptome bei Halsschmerzen wie Entzündungen der Rachenschleimhaut, Schmerzen, Schwellungen und Schluckbeschwerden bei Erwachsenen ab 18 Jahren angewendet.

**2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray Honig- und Zitronengeschmack beachten?**

**Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray Honig- und Zitronengeschmack darf nicht angewendet werden, wenn Sie**  
 - allergisch gegen Flurbiprofen, andere nicht-steroidale entzündungshemmende Arzneimittel (NSAR), Acetylsalicylsäure, Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) (E218), Propyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) (E216) oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile sind,  
 - vorher schon einmal nach der Einnahme eines nicht-steroidalen entzündungshemmenden Arzneimittels (NSAR) oder Acetylsalicylsäure eine allergische Reaktion hatten, wie z. B. Asthma, Kurzatmigkeit, Juckreiz, eine laufende Nase, Hautausschläge, Schwellung, ein Geschwür oder Blutungen (zwei- oder mehrmaliges Auftreten von Magengeschwüren) im Magen-/ Darmbereich haben oder hatten,  
 - jemals eine schwere Dickdarmentzündung (Colitis) hatten,  
 - jemals nach der Einnahme von NSAR an Blutgerinnungsstörungen oder Blutungen gelitten haben, in den letzten drei Monaten Ihrer Schwangerschaft sind, eine schwerwiegende Herz-, Nieren- oder Leberschwäche haben,  
 - jünger als 18 Jahren sind.

**1. Was ist Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray Honig- und Zitronengeschmack und wofür wird es angewendet?**

Der Wirkstoff ist Flurbiprofen. Flurbiprofen gehört zu einer Gruppe von Arzneimitteln, die man nicht-steroidale entzündungshemmende Arzneimittel (NSAR) nennt. Diese Arzneimittel wirken, indem sie die Reaktion des Körpers auf Schmerzen, Schwellungen und erhöhte Temperatur beeinflussen. Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray Honig- und Zitronengeschmack wird zur kurzzeitigen Linderung der Symptome bei Halsschmerzen wie Entzündungen der Rachenschleimhaut, Schmerzen, Schwellungen und Schluckbeschwerden bei Erwachsenen ab 18 Jahren angewendet.

**2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray Honig- und Zitronengeschmack beachten?**

**Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**  
 Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray Honig- und Zitronengeschmack anwenden, wenn Sie  
 - bereits ein anderes nicht-steroidales entzündungshemmendes Arzneimittel (NSAR) oder Acetylsalicylsäure einnehmen, während Sie an einer Infektion (Tonsillitis) haben oder glauben, eine bakterielle Halsentzündung zu haben (weil sie möglicherweise Antibiotika benötigen),  
 - eine Infektion haben – siehe Abschnitt „Infektionen“ unten, älter sind (da Nebenwirkungen bei Ihnen mit größerer Wahrscheinlichkeit auftreten können),  
 - Asthma haben oder jemals hatten oder an Allergien leiden, Hauterkrankungen namens systemischer Lupus erythematoses oder Mischkollagenose haben, Bluthochdruck haben, eine Vorgeschichte mit Darmkrankungen haben (Colitis ulcerosa, Morbus Crohn),  
 - Herz-, Nieren- oder Leberprobleme haben, einen Schlaganfall hatten, in den ersten 6 Schwangerschaftsmonaten oder in der Stillzeit sind.

**Während der Anwendung von Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray Honig- und Zitronengeschmack**

- Brechen Sie die Anwendung des Sprays bei den ersten Anzeichen von Hautreaktionen (Hautausschlag, Schalen der Haut, Blasenbildung) oder anderen Anzeichen einer allergischen Reaktion ab und suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.  
 - Informieren Sie Ihren Arzt bei ungewöhnlichen Symptomen im Bauch (vor allem Blutungen).  
 - Sprechen Sie mit einem Arzt, wenn es Ihnen nicht besser geht, es Ihnen schlechter geht oder neue Symptome auftreten.  
 - Die Anwendung von Arzneimitteln, die Flurbiprofen enthalten, ist möglicherweise mit einem geringfügig erhöhten Risiko für Herzinfälle (Herzinfarkt) oder Schlaganfälle verbunden. Jedes Risiko ist wahrscheinlicher mit hohen

Infektionen  
 Nicht-steroidale entzündungshemmende

Arzneimittel (NSAIDs) können Anzeichen von Infektionen wie Fieber und Schmerzen verschleiern. Dies kann eine angemessene Behandlung der Infektion verzögern, was zu einem erhöhten Komplikationsrisiko führen kann. Wenn Sie dieses Arzneimittel anwenden, während Sie an einer Infektion leiden, und die Symptome der Infektion anhalten oder sich verschlimmern, wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt oder Apotheker.  
**Während der Anwendung von Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray Honig- und Zitronengeschmack**

- Brechen Sie die Anwendung des Sprays bei den ersten Anzeichen von Hautreaktionen (Hautausschlag, Schalen der Haut, Blasenbildung) oder anderen Anzeichen einer allergischen Reaktion ab und suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.

- Informieren Sie Ihren Arzt bei ungewöhnlichen Symptomen im Bauch (vor allem Blutungen).  
 - Sprechen Sie mit einem Arzt, wenn es Ihnen nicht besser geht, es Ihnen schlechter geht oder neue Symptome auftreten.  
 - Die Anwendung von Arzneimitteln, die Flurbiprofen enthalten, ist möglicherweise mit einem geringfügig erhöhten Risiko für Herzinfälle (Herzinfarkt) oder Schlaganfälle verbunden. Jedes Risiko ist wahrscheinlicher mit hohen

Infektionen  
 Nicht-steroidale entzündungshemmende

Dosen und länger dauernder Behandlung. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Dosis oder Behandlungsdauer (siehe Abschnitt 3).  
**Kinder und Jugendliche**  
 Dieses Arzneimittel sollte nicht bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren angewendet werden.  
**Anwendung von Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray Honig- und Zitronengeschmack zusammen mit anderen Arzneimitteln**  
 Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt. Dies gilt insbesondere für folgende Arzneimittel:

- andere nicht-steroidale entzündungshemmende Arzneimittel (NSAR) einschließlich selektiver Cyclooxygenase-2-Hemmer gegen Schmerzen oder Entzündung, da diese das Risiko von Magen- oder Darmblutungen erhöhen können,  
 - Warfarin, Acetylsalicylsäure und andere blutverdünnende oder gerinnungshemmende Arzneimittel,  
 - ACE-Hemmer, Angiotensin-II-Antagonisten (Arzneimittel, die den Blutdruck senken),  
 - Diuretika (Entwässerungstabletten) einschließlich kaliumsparender

Diuretika, selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRIs) (zur Behandlung von Depressionen),  
 - herzwirksame Glykoside wie z. B. Digoxin (gegen Herzerkrankungen),  
 - Ciclosporin (um nach einer Transplantation das Abstoßen von Organen zu verhindern),  
 - Kortikoide (zur Entzündungshemmung),  
 - Lithium (bei Stimmungsstörungen),  
 - Methotrexat (zur Behandlung von Psoriasis, Arthritis und Krebs),  
 - Mifepriston (ein Arzneimittel, das für einen Schwangerschaftsabbruch angewendet wird). NSARs sollten 8 – 12 Tage nach der Einnahme von Mifepriston nicht angewendet werden, da sie die Wirkung von Mifepriston verringern können.  
 - Orale Antidiabetika,  
 - Phenytoin (zur Behandlung von Epilepsie),  
 - Probenecid, Sulfapyrazon (gegen Gicht und Arthritis),  
 - Chinolon-Antibiotika wie Ciprofloxacin, Levofloxacin (bei bakteriellen Infektionen),  
 - Tacrolimus (Immunsuppressivum nach Organtransplantation),  
 - Zidovudin (zur Behandlung von HIV).

**Anwendung von Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray Honig- und Zitronengeschmack zusammen mit Nahrungsmitteln,**

**Getränken und Alkohol**  
 Während der Behandlung mit Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray Honig- und Zitronengeschmack sollten Sie keinen Alkohol zu sich nehmen, da dies das Risiko von Magen- oder Darmblutungen erhöhen kann.  
**Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit**  
 Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.  
 - Wenden Sie dieses Arzneimittel nicht an, wenn Sie in den letzten 3 Monaten Ihrer Schwangerschaft sind.  
 - Wenn Sie in den ersten 6 Monaten Ihrer Schwangerschaft sind oder stillen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie dieses Arzneimittel anwenden.

Flurbiprofen gehört zu einer Gruppe von Arzneimitteln, die die Fruchtbarkeit von Frauen beeinträchtigen können. Der Effekt ist nach Absetzen des Arzneimittels umkehrbar.  
**Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**  
 Dieses Arzneimittel sollte Ihre Fähigkeit, ein Fahrzeug zu führen oder Maschinen zu bedienen, nicht beeinflussen. Allerdings sind Schwindel und Sehstörungen mögliche Nebenwirkungen nach der Einnahme von NSAIDs. Fahren Sie nicht Auto und bedienen Sie keine Maschinen, wenn Sie davon

beeinträchtigt sind.  
**Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray Honig- und Zitronengeschmack**  
 Dieses Arzneimittel enthält einen Duftstoff mit Anisylalkohol, Citral, Citronellol, D-Limonene, Geraniol und Linalool. Anisylalkohol, Citral, Citronellol, D-Limonene, Geraniol und Linalool können allergische Reaktionen hervorrufen.  
**3. Wie ist Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray Honig- und Zitronengeschmack anzuwenden?**  
 Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind. Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene ab 18 Jahren:  
 Bei Bedarf alle 3-6 Stunden eine Dosis von 3 Sprühstößen in den hinteren Rachenraum einsprühen. Höchstens 5 Dosen in einem Zeitraum von 24 Stunden anwenden.  
 Eine Dosis (3 Sprühstöße) enthält 8,75 mg Flurbiprofen.  
 Wenden Sie dieses Arzneimittel nicht bei Kindern oder Jugendlichen unter 18 Jahren an. Nur für die Anwendung in der Mundhöhle.  
 - Sprühen Sie nur in den hinteren Rachenraum.  
 - Atmen Sie während des Sprühens nicht ein.  
 - Wenden Sie nicht mehr als 5 Dosen (15 Sprühstöße) in 24 Stunden an.  
 Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray Honig- und Zitronengeschmack ist nur für den kurzzeitigen Gebrauch bestimmt.  
 Zur Linderung der Symptome sollte die niedrigste wirksame Dosis für die kürzeste erforderliche Dauer angewendet werden. Wenn Sie an einer Infektion leiden, wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt oder Apotheker, sofern die Symptome (wie Fieber und Schmerzen) andauern oder sich verschlimmern (siehe Abschnitt 2).  
 Wenn Reizungen im Mundraum auftreten, sollte die Behandlung mit Flurbiprofen abgebrochen werden.  
 Wenden Sie dieses Arzneimittel nicht länger als 3 Tage an, es sei denn, Ihr Arzt hat es Ihnen verordnet.

50053418

Component Code  
 Font: OCRB 6pt

Component Code  
 Font: OCRB 6pt

Blasenbildung, einschließlich Stevens-Johnson-Syndrom und toxischer epidermaler Nekrolyse (seltene Erkrankungen aufgrund schwerwiegender Nebenwirkungen auf Medikamente oder Infektionen, bei denen eine heftige Reaktion der Haut und Schleimhäute ausgelöst wird). Häufigkeit: Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar).

Anzeichen einer anaphylaktischen Reaktion charakterisiert durch Schwellungen im Gesicht, der Zunge oder im Rachen, die Atembeschwerden verursachen, Herzrasen, Blutdruckabfall bis hin zum Schock (diese können auch bei der ersten Anwendung des Arzneimittels auftreten). Häufigkeit: Selten (kann bis zu 1 von 1.000 Behandelten betreffen).

Anzeichen von Überempfindlichkeit und Hautreaktionen wie Rötung, Schwellung, Schalen der Haut, Blasenbildung, Ablösung oder Haut- und Schleimhautgeschwüre. Häufigkeit: Gelegentlich (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen).

Anzeichen einer allergischen Reaktion, wie Asthma, unerwartet erschwertes Ein- und/oder Ausatmen, Kurzatmigkeit, Juckreiz, laufende Nase oder Hautausschläge. Häufigkeit: Gelegentlich (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen).

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie eine der folgenden Nebenwirkungen oder Nebenwirkungen, die nicht gelistet sind, bemerken:  
**Häufig (kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen)**  
 - Schwindel, Kopfschmerzen  
 - Reizung im Rachenraum  
 - Geschwüre im Mund, Schmerzen oder Taubheit im Mund  
 - Halsschmerzen  
 - Beschwerden bei der Anwendung im Mundbereich (Brennen oder Wärmegefühl)  
 - Übelkeit und Durchfall  
 - Kribbeln und Juckreiz der Haut  
**Gelegentlich (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen)**  
 - Schläfrigkeit  
 - Blasenbildung im Mund oder Rachenraum, Taubheitsgefühl im Rachen  
 - Gebälter Magen, Bauchschmerzen, Flatulenz, Verstopfung, Verdauungsstörungen, Übelkeit  
 - Trockener Mund  
 - Brennen im Mund, veränderter Geschmackssinn  
 - Fieber, Schmerzen  
 - Müdigkeit oder Schwierigkeiten beim Einschlafen  
 - Verschlimmerung von Asthma, erschwertes Ein- und/oder Ausatmen, Kurzatmigkeit  
 - Vermindertes Empfinden im Rachenraum

zu Blutergüssen und Blutungen führen kann)  
 - Schwellungen (Ödeme), Bluthochdruck, Herzinsuffizienz oder Herzinfarkt  
 - Hepatitis (Leberentzündung)  
**Meldung von Nebenwirkungen**  
 Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.  
 Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**5. Wie ist Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray Honig- und Zitronengeschmack aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf. Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Flasche nach: „Verw. bis“ und dem Umkarton nach: „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats. Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.

Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht länger als 6 Monate nach dem Öffnen.  
 Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.  
 Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/arzneimittelsorgung.

**6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**  
**Was Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray Honig- und Zitronengeschmack enthält**  
 Der Wirkstoff ist Flurbiprofen. Eine Dosis (3 Sprühstöße) enthält 8,75 mg/ml Flurbiprofen, entspricht.  
 Die sonstigen Bestandteile sind: Betadex, Natriummonohydrogenphosphat-Dodecahydrat (Ph.Eur.), Citronensäure-Monohydrat, Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) (E218), Propyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) (E216), Natriumhydroxid, Honig-Aroma, Zitronen-Aroma, N,2,3-Trimethyl-2-(propan-2-yl)butanamid, Saccharin-Natrium, Hydroxypropylbetadex 0,62 und gereinigtes Wasser.

**Wie Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray Honig- und Zitronengeschmack aussieht und Inhalt der Packung**  
 Das Spray ist eine klare, farblose bis leicht gelbliche Lösung mit Honig- und Zitronengeschmack.

Belgien Streifen Spray Citroen 8,75 mg/dose spray voor oromucosaal gebruik, oplossing

Bulgarien Стрeпeпcилc Интeнзив Мед и Лимон 8,75 мг/доза спрей за устна лигавица, разтвор

Dänemark Strefzap Honning og Citron

Deutschland Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray Honig- und Zitronengeschmack

Estonia Strepsils Intensive Honey & Lemon

Finnland Streifen Hunaja & Sitruuna, 16,2 mg/ml sumute suuonteloon, liuos

Griechenland Streifen Direct Honey and Lemon

Irland Strepsils Intensive Honey & Lemon 8.75 mg/dose Oromucosal Spray.

Island Streifen Honung & Citron 16,2 mg/ml munnhólsúði, lausn

Italien BENACTIVDOL GOLA ANTINFAMMATORIO

Kroatien Streifen s okusom meda i limuna za odrasle, 8,75 mg po dozi, sprej za usnu sluznicu, otopina

Lettland Strepsils Intensive Honey & Lemon

Litauen Stefan Honey & Lemon

Luxemburg Streifen Spray Sans Sucre Miel et Citron 8,75 mg/dose solution pour pulvérisation buccale

Niederlande Streifen Citroen & Honing Suikervrij 8,75 mg keelspray

Norwegen Streifen 8,75 mg/dose munnspray, oppløsning med honning- og sitronsmak

Österreich Strepsils Honig & Zitrone

Polen Strepsils Intensive Direct o smaku miodu i cytryny

Portugal Streifen Spray Mel e Limão

Rumänien Strepsils Intensiv Miere si Lămâie 8,75 mg/doză spray bucofaringian, solutie

Schweden Streifen Honung & Citron

Slowenien Streifen za odrasle z okusom medu in limone 8,75mg/odmerek oralno prsilo, raztopina

Slowakei Streifen Sprej Med a Citron

Spanien Streifen Spray 8,75mg/dosis solución para pulverización bucal sabor miel y limón

Tschechische Republik Streifen Sprej Med a Citron

Ungarn Streifen DIREKT méz és citrom ízű 16,2 mg/ml szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray

Vereinigtes Königreich Streifen Honey & Lemon flavour 8,75mg/dose oromucosal spray

Zypern Streifen Direct Honey & Lemon

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2023.

Oberseite der Pumpe zu nehmen.

Atmen Sie während des Sprühens nicht ein.

Wenn Sie eine größere Menge von Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray Honig- und Zitronengeschmack angewendet haben, als Sie sollten

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker oder suchen Sie umgehend das nächstgelegene Krankenhaus auf. Beschwerden einer Überdosierung können Übelkeit, Erbrechen, Magenschmerzen oder seltener Durchfall sein. Ein Klingeln in den Ohren, Kopfschmerzen und Magen-Darm-Blutungen sind ebenfalls möglich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. BEENDEN Sie die Anwendung dieses Arzneimittels und suchen Sie unverzüglich Ihren Arzt auf, wenn eine dieser Nebenwirkungen bei Ihnen auftritt:  
 - Schwere Hautreaktionen wie

Drücken Sie die Sprühpumpe mit einer leichten schnellen Bewegung dreimal herunter. Achten Sie darauf, die Pumpe für jeden Sprühstoß ganz herunter zu drücken und den Finger zwischen den Sprühstößen von der

50053418

Component Code  
 Font: OCRB 6pt

