ALLEMAGNE	
Couleur	CMJN + 158C
Format	65 X 32 X 91 mm
Taille police	1,2 mm

CHRONOBIANE

Melatonin Retard LP

CHRONOBIANE

Melatonin Retard LP

Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von Melatonin, marinem Magnesium, Vitamin D3 und Vitamin E.

Weitere Informationen durch Scannen des QR-Codes oder unter chronobiane.pileje.de

Nährwerttabelle

	Pro Tablette	NRW*
Melatonin	1 mg	
Vitamin D3	10 µg	200 %
Vitamin E	1,8 mg	15 %
Magnesium	150 mg	40 %

*NRW: Nährstoffreferenzwert

HERGESTELLT IN FRANKREICH

RESULTAT DER FORSCHUNG VON PILEJE

PiLeJe Deutschland GmbH
Lindleystraße 8
60314 Frankfurt am Main

Nettogewicht: 49 g

Chronobiane Melatonin Retard LP ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das auf Basis von Melatonin, marinem Magnesium, Vitamin D3 und Vitamin E hergestellt wird.

*Melatonin trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu verkürzen. Die positive Wirkung stellt sich ein, wenn kurz vor dem Schlafengehen 1 mg Melatonin eingenommen wird, d. h. 1 Tablette. Magnesium trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

Inhaltsstoffe

Füllstoffe: Kalziumphosphat und mikrokristalline Zellulose, Hypro-ri® Mag (Reisproteinhydrolysat und marines Magnesiumoxyd), Magnesiumoxyd, Baoba-Pulver (*Adansonia digitata* L., Fruchtfleisch), Verdickungsmittel: Natriumalginat und vernetzte Natriumcarboxymethylcellulose, Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Farbstoffe: Spirulin- und Apfelkonzentrat, Zitronen-und Färberdistelkonzentrat, Vitamin D3, Vitamin E, Melatonin.

10CHR00006

CHRONOBIANE

Melatonin Retard LP

MELATONIN, MARINES MAGNESIUM, VITAMIN D3 UND E

Verkürzt die Einschlafzeit*

60 TABLETTEN MIT ALLMÄHLICHER FREISETZUNG

2 MONATE EINNAHMEDAUER

PiLeJe LABORATOIRE

RV2 ALL

PZN - 17584399

Anwendungshinweise

1 Tablette pro Tag mit einem Glas Wasser einnehmen. Zum Erzielen der positiven Wirkung muss die Einnahme 1 Std. vor dem Schlafengehen erfolgen. Bei kontinuierlicher Einnahme über mehrere Monate wird empfohlen, einen ärztlichen Rat einzuholen. Dauer der Anwendung: 2 Monate.

Vorsichtsmaßnahmen

Abgeraten für Kinder unter 12 Jahren. Bei Personen unter 18 Jahren ärztlichen Rat einholen. Nicht geeignet für schwangere oder stillende Frauen, Personen, die an entzündlichen Erkrankungen oder Autoimmunkrankheiten sowie Epilepsie, Asthma, Stimmungsschwankungen, Verhaltens- oder Persönlichkeitsstörungen leiden. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Gefahr von Schläfrigkeit. Bei zeitgleicher Einnahme von Medikamenten lassen Sie sich von Ihrem Arzt oder Apotheker beraten. Dieses Nahrungsergänzungsmittel kann eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise nicht ersetzen. Vor Kindern geschützt aufbewahren. An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Mindestens haltbar bis/Los-Nr.: siehe Unterseite.