Gebrauchsinformation: Information für Anwender

NUROFEN®

400 mg Weichkapseln

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 40 kg

Kopfschmerzen (1 Zahn oder Kopfschmerzen bei Jugendlichen ab 40 kg

Lesen Sie diese Gebrauchsinformation vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung des Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Bewahren Sie diese Gebrauchsinformation auf. Möglicherweise müssen Sie sie später wieder lesen.
- Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Es darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Es kann anderen Personen schaden, auch wenn es deren Krankheitsbild ähnlich erscheinen lassen mag.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Das gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was ist Nurofen und wofür wird es angewendet?

1. Was ist Nurofen und wofür wird es angewendet?

Ibuprofen gehört zur Gruppe der sogenannten nichtsteroidalen Entzündungshemmer (NSAIDs), kurz: Ibuprofen wirkt gegen Schmerzen und Fieber.

Wirkungsweise: Ibuprofen wirkt entzündungshemmend, schmerzlindernd und fiebersenkend. Es wird angewendet bei Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Menstruationsschmerzen, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Rückenschmerzen, Gliederschmerzen und Fieber.

Nurofen wird bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 40 kg Körpergewicht (12 Jahre oder älter) angewendet.

2. Wann darf Nurofen nicht eingenommen werden, wenn Sie

- allergisch gegen Ibuprofen, Sojabohnen oder Erdnüsse sind (Überempfindlichkeit mit Hautausschlag, Juckreiz, Atemnot oder Kreislaufbeschwerden nach Einnahme von Acetylsalicylsäure oder anderen NSAIDs);
- in der Vergangenheit Krankheitsanzeichen wie Asthmaanfälle, Atemnot, Hautausschlag oder Hautschwellungen (Quaddeln) in der Vergangenheit gezeigt haben;
- an einer bestehenden Magen- oder Darmblutung leiden;
- an einer bestehenden oder in der Vergangenheit wiederkehrenden Magen- oder Darmgeschwür oder -blutung (mindestens zwei getrennte Geschehnisse) leiden;
- an einer bestehenden oder in der Vergangenheit aufgetretenen Magen- oder Darmentzündung leiden;
- an einer bestehenden oder in der Vergangenheit aufgetretenen Magen- oder Darmentzündung mit Magenschleimhautentzündung leiden;
- an einer bestehenden oder in der Vergangenheit aufgetretenen Magen- oder Darmentzündung mit Magenschleimhautentzündung und Magensäurebeschwerden leiden;
- an einer bestehenden oder in der Vergangenheit aufgetretenen Magen- oder Darmentzündung mit Magenschleimhautentzündung und Magensäurebeschwerden leiden, wenn Sie bereits zwei Tabletten Ibuprofen 400 mg eingenommen haben;
- an einer bestehenden oder in der Vergangenheit aufgetretenen Magen- oder Darmentzündung mit Magenschleimhautentzündung und Magensäurebeschwerden leiden, wenn Sie bereits zwei Tabletten Ibuprofen 400 mg eingenommen haben und Sie Ihre Tagesdosis Ibuprofen 400 mg nicht überschreiten wollen;
- an einer bestehenden oder in der Vergangenheit aufgetretenen Magen- oder Darmentzündung mit Magenschleimhautentzündung und Magensäurebeschwerden leiden, wenn Sie bereits zwei Tabletten Ibuprofen 400 mg eingenommen haben und Sie Ihre Tagesdosis Ibuprofen 400 mg