

# Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma® 10 mg/10 mg Filmtabletten

# Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma® 10 mg/20 mg Filmtabletten

# Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma® 10 mg/40 mg Filmtabletten

# Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma® 10 mg/80 mg Filmtabletten

## Ezetimib und Atorvastatin

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

- Die Packungsbeilage der Filmtabletten möchten Sie dies später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma beachten?
3. Wie ist Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen



### 1 Was ist Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma und wofür wird es angewendet?

Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma ist ein Arzneimittel zur Senkung erhöhter Cholesterinwerte. Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma enthält die Wirkstoffe Ezetimib und Atorvastatin.

Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma wird bei erwachsenen Patienten zur Senkung des Gesamtcholesterins, des sogenannten „schlechten“ Cholesterins (LDL-Cholesterin) sowie weiterer Fette, den sogenannten Triglyceriden, im Blut angewendet. Außerdem erhöht Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma die Spiegel des sogenannten „guten“ Cholesterins (HDL-Cholesterin).

Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma senkt die Cholesterinwerte über zwei Wege. Es vermindert sowohl die Aufnahme von Cholesterin aus dem Darm als auch die körpereigene Cholesterinproduktion.

Cholesterin ist eine von mehreren Fettsäuren im Blut. Ihr Gesamtcholesterin besteht hauptsächlich aus LDL- und HDL-Cholesterin.

LDL-Cholesterin wird häufig als „schlechtes“ Cholesterin bezeichnet, da es sich in den Gefäßwänden von Adern (Arterien) ansammelt kann und so zu Verengungen (sogenannte Plaques) bildet. Diese Plaques können letztendlich zu einer Verengung der Arterien führen. Diese Verengung kann zu einer Durchblutungsstörung bis hin zum Gefäßverschluss in lebenswichtigen Organen wie Herz oder Gehirn führen. Ein Gefäßverschluss kann einen Herzinfarkt oder Schlaganfall auslösen.

HDL-Cholesterin wird häufig als „gutes“ Cholesterin bezeichnet, da es dazu beiträgt, zu verhindern, dass sich „schlechtes“ Cholesterin in den Arterien ansammelt, kann und Herzerkrankungen vorbeugt.

Triglyzeride sind weitere Blutfette, die ebenfalls Ihr Risiko für Herzerkrankungen erhöhen können.

Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma wird bei den Patienten angewendet, deren Cholesterinspiegel nicht durch eine cholesterinsenkende Diät allein gesenkt werden können. Sie sollten Ihre cholesterinsenkende Diät auch während der Behandlung mit diesem Arzneimittel fortsetzen.

- Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma wird zusätzlich zu Ihrer cholesterinsenkenden Diät angewendet, wenn Sie:
- erhöhte Cholesterinspiegel (*primäre Hypercholesterinämie* (*heterozytöse familiäre und nicht familiäre*)) oder erhöhte Fettspiegel im Blut haben (*gemischte Hyperlipidämie*),
  - für deren Behandlung ein Wirkstoff aus der Klasse der Statine alleine nicht ausreicht, um Ihre Cholesterinwerte zu senken, oder
  - wenn Sie zur Behandlung bereits ein Statin und Ezetimib als einzelne Tabletten erhalten haben.
- eine Erkrankung haben, welche zu erhöhten Cholesterinwerten im Blut führt (*homozygote familiäre Hypercholesterinämie*). Sie erhalten in diesen Fällen meist weitere Behandlungen.
- eine Herzerkrankung haben, Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma senkt das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall sowie das Risiko, dass eine Operation zur Verbesserung der Herzdurchblutung oder eine Krankenhausaufweisung aufgrund von Brustschmerzen notwendig wird.

Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma ist nicht zur Unterstützung einer Gewichtsabnahme geeignet.

### 2 Was sollten Sie vor der Einnahme von Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma beachten?

- Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma darf nicht eingenommen werden,**
- wenn Sie allergisch gegen die Wirkstoffe Ezetimib oder Atorvastatin oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind,
  - wenn Sie zur Zeit an einer Lebererkrankung leiden oder früher eine Lebererkrankung hatten,
  - wenn Sie im Rahmen von Blutuntersuchungen unerklärliche Abweichungen Ihrer Leberfunktionstests hatten,
  - wenn Sie als Frau schwanger werden könnten und keine zuverlässige Verhütungsmethode anwenden,
  - wenn Sie schwanger sind oder beabsichtigen, schwanger zu werden, oder stillen,
  - wenn Sie eine Kombination aus Gilecepravir/Pibrentasvir zur Behandlung einer Hepatitis-C-Infektion erhalten.

### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma einnehmen.
- Wenn Sie bereits einen Schlaganfall mit Impulstherapie oder kleine Flüssigkeitsansammlungen im Gehirn als Folge von früheren Schlaganfällen haben,
  - wenn Sie Nierenprobleme haben
  - wenn Sie an einer Schilddrüsenunterfunktion leiden (*Hypothyreose*) oder wiederholte oder anhaltende Muskelschmerzen hatten oder in einer eigenen bzw. in der Krankengeschichte Ihrer Familie Muskelschmerzen bekannt sind

- wenn Sie während der Behandlung mit anderen Lipidsenkern (z. B. Arzneimitteln mit Wirkstoffen aus den Klassen der Fibrate oder Statine) früher schon Muskelschmerzen hatten
- wenn Sie regelmäßig große Mengen Alkohol zu sich nehmen
- wenn in Ihrer Krankengeschichte Lebererkrankungen bekannt sind
- wenn Sie älter als 70 Jahre sind
- wenn Ihr Arzt Ihnen mitteilt hat, dass Sie bestimmte Zuckerkarten nicht vertragen, wenden Sie sich vor der Einnahme dieses Arzneimittels an Ihren Arzt.
- wenn Sie Myasthenie (eine Erkrankung mit allgemeiner Muskelschwäche, einschließlich in einigen Fällen einer Schwäche der Atemmuskulatur) oder okuläre Myasthenie (eine Erkrankung, die eine Muskelschwäche der Augen verursacht) haben oder hatten, da Statine diese Erkrankung manchmal verschlimmern oder zum Auftreten von Myasthenie führen können (siehe Abschnitt 4).
- wenn Sie Arzneimittel zur Behandlung von bakteriellen Infektionen mit Ezetimib/Atorvastatin einnehmen oder in den letzten 7 Tagen eingenommen haben oder ihnen solche Arzneimittel als Injektion gegeben wurden. Die Kombination von Arzneimitteln mit dem Wirkstoff Fusidinsäure und Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma kann zu schweren Muskelproblemen führen (Zerfall von Muskelzellen (*Rhabdomyolyse*)).

**Wenn Sie unklare Muskelschmerzen, Empfindlichkeit oder Schwäche der Muskulatur während der Behandlung mit Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma bemerken, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Arzt.** Dies ist erforderlich, da Erkrankungen der Muskulatur in seltenen Fällen schwerwiegender sein können, was bis zu einem Zerfall von Muskelzellen (*Rhabdomyolyse*) führen kann. Ein Zerfall von Muskelzellen ist bekannt dafür, Muskelerkrankungen zu verursachen. Über Muskelerkrankungen wurde ebenfalls bei Anwendung von Ezetimib berichtet.

Informieren Sie ebenfalls Ihren Arzt oder Apotheker, wenn bei Ihnen anhaltende Muskelschwäche auftritt. Zur Diagnose und Behandlung dieses Zustands sind möglicherweise weitere Untersuchungen und Arzneimittel notwendig.

Sprechen Sie vor der Behandlung mit Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma mit Ihrem Arzt oder Apotheker,

- wenn Sie an schwerwiegenden Atemproblemen leiden.

Wenn einer oder mehrere dieser Punkte auf Sie zutreffen oder Sie sich nicht sicher sind, sprechen Sie vor der Behandlung mit Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma mit Ihrem Arzt oder Apotheker, da Ihr Arzt vor möglicherweise während Ihrer Behandlung mit Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma eine Blutuntersuchung durchführen muss, um Ihr Risiko hinsichtlich muskelbezogener Nebenwirkungen festzustellen. Das Risiko von muskelbezogenen Nebenwirkungen wie z. B. der Zerfall von Muskelzellen (*Rhabdomyolyse*) steigt bekanntlich, wenn bestimmte Arzneimittel gleichzeitig eingenommen werden (siehe Abschnitt 2 unter „Einnahme von Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma zusammen mit anderen Arzneimitteln“).

Während der Behandlung mit Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma wird Ihr Herz es geschmächigt überwachen, wenn Sie eine Blutzuckererkrankung (*Diabetes*) haben oder das Risiko besteht, dass Sie eine Blutzuckererkrankung entwickeln. Das Risiko, eine Blutzuckererkrankung zu entwickeln, besteht, wenn Sie erhöhte Blutzucker- und Blutfettwerte haben, Übergewichtig sind und einen hohen Blutdruck haben.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über alle Ihre Erkrankungen und Allergien.

Die gemeinsame Anwendung von Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma mit Fibraten (Lipidsenker, die Wirkstoffe aus der Klasse der Fibrate enthalten) sollte vermieden werden, da die gemeinsame Anwendung von Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma mit Fibraten nicht untersucht wurde.

### Kinder und Jugendliche

Die Anwendung von Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma bei Kindern und Jugendlichen wird nicht empfohlen.

### Einnahme von Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma zusammen mit anderen Arzneimitteln

- Cyclosporin, ein Arzneimittel, das oft nach Organtransplantation angewendet wird,
- Erythromycin, Clarithromycin, Telithromycin, Fusidinsäure\*, Rifampin\* (Arzneimittel zur Behandlung von bakteriellen Infektionen), Ketoconazol, Itraconazol, Voriconazol, Fluconazol, Posaconazol (Arzneimittel zur Behandlung von Pilzinfektionen),
- Gemfibrozil\* oder andere Wirkstoffe aus der Klasse der Fibrate, Nicotinsäure\* oder verwandte Wirkstoffe, Colestipol\* oder Colestyramin\* (Arzneimittel zur Regulierung von Blutfettspiegeln)

- einige Calciumkanalblocker zur Behandlung von Angina pectoris oder Bluthochdruck z. B. Amlodipin, Diltiazem
- Digoxin, Verapamil, Amiodaron (Arzneimittel zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen)
- Arzneimittel zur Behandlung von HIV z. B. Ritonavir, Lopinavir, Atazanavir, Indinavir, Darunavir oder der Kombination von Tipliranavir/Ritonavir etc. (Arzneimittel gegen die Immunschwäche AIDS)
- einige Arzneimittel zur Behandlung einer Hepatitis-C-Virusinfektion der Leber z. B. Telaprevir, Boceprevir und die Kombination aus Ebasvir/Grazoprevir
- Daptomycin (Arzneimittel zur Behandlung von komplizierten Haut- und Hautstruktureinfektionen, sowie Bakteriämie).

**“Wenn Sie Arzneimittel mit dem Wirkstoff Fusidinsäure zur Behandlung einer bakteriellen Infektion einnehmen müssen, müssen Sie die Einnahme dieses Medikaments vorübergehend aussetzen. Ihr Arzt wird Sie informieren, wann Sie die Einnahme von Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma sicher fortsetzen können. Die gleichzeitige Einnahme von Fusidinsäure und Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma kann in seltenen Fällen zu Muskelschwäche, Muskelpainlichkeit oder Muskelschmerzen (*Rhabdomyolyse*) führen. Weitere Informationen zu *Rhabdomyolyse* siehe Abschnitt 4.**

- Weitere Arzneimittel mit bekannten Wechselwirkungen mit Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma
  - orale Kontrazeptiva (Arzneimittel zur Schwangerschaftsverhütung)
  - Sturgepilen (Arzneimittel zur Behandlung von Epilepsie [Antikonvulsiva])
  - Cimetidin (Arzneimittel zur Behandlung von Sodbrennen und Magenbeschwerden)
  - Phenazon (Schmerzmittel)
  - Antacida (Arzneimittel zur Behandlung von Verdauungsbeschwerden, die Aluminium oder Magnesium enthalten)
  - Warfarin, Phenprocoumon\* oder Fludionid (Arzneimittel zur Verhütung von Blutgerinnseln)
  - Colchicin (Arzneimittel zur Behandlung von Gicht)
  - Johanniskraut (Arzneimittel zur Behandlung von Depressionen)

**Einnahme von Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma zusammen mit Nahrungsmitteln und Alkohol**  
Zu Hinweisern, wie Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma eingenommen wird, siehe Abschnitt 3. Bitte beachten Sie darüber hinaus die folgenden Hinweise:

### Grapefruitsaft

Nehmen Sie pro Tag nicht mehr als 1-2 kleine Gläser Grapefruitsaft zu sich, da größere Mengen Grapefruitsaft die Wirkungen von Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma verändern können.

### Alkohol

Vermeiden Sie es, zu viel Alkohol während der Behandlung mit diesem Arzneimittel zu trinken. Zu weiteren Einzelheiten, siehe Abschnitt 2 unter „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“.

### Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Sie dürfen Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma nicht einnehmen, wenn Sie schwanger sind, eine Schwangerschaft planen oder vermuten, schwanger zu sein. Sie dürfen Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma nicht einnehmen, wenn Sie schwanger werden könnten, es sei denn, Sie verwenden eine zuverlässige Verhütungsmethode. Wenn Sie während der Behandlung mit Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma schwanger werden, unterbrechen Sie die Behandlung sofort und teilen Sie dies Ihrem Arzt mit.

Sie dürfen Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma nicht einnehmen, wenn Sie stillen.

Die Sicherheit von Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma während der Schwangerschaft und Stillzeit ist nicht erwiesen.

Fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wird nicht erwartet, dass Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma Ihre Verkehrstüchtigkeit oder Ihre Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt. Sie sollten dabei jedoch berücksichtigen, dass manche Personen nach der Einnahme von Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma schwindlig werden kann.

**Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg Filmtabletten enthalten Lactose**  
Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma enthält Zucker (*Lactose*). Bitte beachten Sie, dass Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma zusammen mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

**Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma enthält Natrium**  
Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma enthält weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro Tablette, d. h., es ist nahezu „natriumfrei“.

Forstsetzung auf der Rückseite >>>



### 3 Wie ist Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt ein. Ihr Arzt wird für Sie die geeignete Tablettenstärke entsprechend Ihrer bisherigen Behandlung und Ihrer individuellen Risikofaktoren festordnen.  
Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Vor Beginn der Behandlung mit Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma sollten Sie eine geeignete Diät beginnen, um Ihr Cholesterin zu senken.  
Sie sollten diese cholesterinsenkende Diät auch während der Behandlung mit Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma fortsetzen.

**Wieviel Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma einzunehmen ist**  
Die empfohlene Dosis ist eine Filmtablette Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma zur einmal täglichen Einnahme.

**Wann Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma einzunehmen ist**  
Nehmen Sie Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma zu jeder festgesetzten Zeit ein. Sie können dieses Arzneimittel unabhängig von den Mahlzeiten einnehmen.

Wenn Ihnen Ihr Arzt Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma zusammen mit einem weiteren Cholesterinsenker mit dem Wirkstoff Colestyramin oder mit anderen Arzneimitteln, die Gallensäure-bindende Wirkstoffe enthalten, verschrieben hat, nehmen Sie Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma mindestens 2 Stunden vor oder mindestens 4 Stunden nach dem Gallensäure-bindenden Arzneimittel ein.

**Wenn Sie eine größere Menge von Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma eingenommen haben, als Sie sollten**  
Wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

**Wenn Sie die Einnahme von Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma vergessen haben**  
Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Setzen Sie die Behandlung am nächsten Tag zur gewohnten Zeit mit der Einnahme der verordneten Dosis fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

### 4 Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

**Wenn Sie eine der nachfolgenden schwerwiegenden Nebenwirkungen oder Symptome bemerken, brechen Sie die Einnahme der Tabletten ab und wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt oder begeben Sie sich unverzüglich in die Notfallaufnahme des nächstgelegenen Krankenhauses.**

- schwere allergische Reaktionen mit Schwellungen im Gesicht, der Zunge und des Rachens, die zu erheblichen Atemschwierigkeiten führen können
- schwerwiegende Erkrankungen mit starken Abschälungen und Schwellungen der Haut, Blasenbildung der Haut, am oder im Mund, an den Augen oder im Genitalbereich und Fieber; Hautausschlag mit Blasen bis hin zu roten Flecken vor allem an Handflächen und Fußsohlen mit möglicher Blasenbildung
- Muskelschwäche, Muskelpfindlichkeit (z. B., Druckschmerz), Muskelschmerzen, Muskelfaserrisse oder rotbraune Verfärbung der Urins. Insbesondere, wenn diese Anzeichen gleichzeitig mit Unwohlsein oder Fieber einhergehen, können sie durch einen krankhaften Nierenleberfunktionsversagen sein, welcher lebensbedrohlich sein kann und zu Nierenkrankungen führt.
- Lupus-ähnliches Syndrom (einschließlich Hautausschlag, Gelenkerkrankungen und Beeinträchtigung der Blutzellen).

Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf, falls Sie Probleme mit unerwarteten oder ungewöhnlichen Blutungen oder Blutergüssen bekommen, da dies auf Leberbeschwerden hindeuten kann.

**Folgende Nebenwirkungen wurden häufig berichtet (kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen):**

- Durchfall
- Muskelschmerzen

**Folgende Nebenwirkungen wurden gelegentlich berichtet (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen):**

- Grippe
- Depression; Einschlafstörungen; Schlaflosigkeit
- Schwindelgefühl; Kopfschmerzen; Kribbelgefühl
- verlangsamerter Herzschlag
- Hitzewallungen
- Kurzatmigkeit
- Bauchschmerzen; aufgeblähter Bauch; Verstopfung; Verdauungsstörungen; Blähungen; häufiger Stuhlgang; Magenentzündung; Übelkeit; Magenbeschwerden; Magenverminderung
- Akne; Quaddeln
- Muskelschmerzen; Rückenschmerzen; Beinkrämpfe; Muskelermüdung; Muskelschmerzen; Muskelschwäche; Schmerzen in Armen und Beinen
- unübliches Schwächegefühl; Müdigkeitsgefühl oder Gefühl von Unwohlsein; Schwellungen insbesondere im Bereich der Fußknöchel (Ödeme)
- erhöhte Laborwerte bei Blutuntersuchungen zur Leber- oder Muskelfunktion (Kreatininkininase)
- Gewichtszunahme

Darüber hinaus wurden folgende Nebenwirkungen von Patienten berichtet, die entweder mit Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma oder Arzneimitteln, die einzeln die Wirkstoffe Ezetimib oder Atorvastatin enthalten, behandelt wurden: • allergische Reaktionen mit Schwellungen an Gesicht, Lippen, Zunge und/oder Rachen, die Probleme beim Atmen oder Schlucken verursachen können und einer sofortigen ärztlichen Behandlung bedürftig sind

• erhabener, rötlicher Ausschlag mit manchmal juckendenbläschenförmigem Aussehen

• Leberbeschwerden

• Husten

• Sodbrennen

• verminderter Appetit; Appetitlosigkeit

• Bluthochdruck

• Hautausschlag und Jucken; allergische Reaktionen, einschließlich Urtikaria mit Ausschlag und Quaddeln

• Sehnenverletzungen

• Gallensteine oder Entzündung der Gallenblase, welche zu Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen führen kann

• Entzündung der Bauchspeicheldrüse mit oft schweren Bauchschmerzen

- erniedrigte Anzahl bestimmter Blutzellen, die zu Blutergüssen und Blutungen führen kann (Thrombozytopenie)
- Entzündung der Nasengänge; Nasenbluten
- Nackenschmerzen; Schmerzen; Schmerzen im Brustkorb; Halserschmerzen
- erhöhte oder erniedrigte Blutzuckerwerte (kontrollieren Sie Ihre sorgfältig Ihre Blutzuckerwerte, wenn Sie an der Blutzuckerkrankheit (Diabetes) leiden)
- Apururie
- Taubheitsgefühl oder Kribbeln in Fingern und Zehen
- vermehrte Schmerzempfinden oder verminderte Berührungsempfindlichkeit
- Störung der Geschmackswahrnehmung; Mundtrockenheit
- Gedächtnisverlust
- Ohrenschmerzen und/oder Geräusche im Kopf; Hörverlust
- Erbrechen
- Aufstoßen
- Haarausfall
- erhöhte Temperatur
- positiver Urintest auf weiße Blutkörperchen
- verschwommenes Sehen; Sehstörungen
- Synkopsen (Veränderung der Brustdrüse beim Mann)

**Mögliche Nebenwirkungen, die bei einigen Statinen berichtet wurden:**

- Störung der Sexualfunktion
- Depression
- Atemprobleme einschließlich anhaltender Husten und/oder Kurzatmigkeit
- Schwellen oder Fieber
- Blutzuckerkrankung (Diabetes):

Das Risiko für die Entwicklung einer Blutzuckerkrankung wird größer, wenn Sie erhöhte Blutzucker- und Blutfettwerte haben, Übergewicht sind und einen hohen Blutdruck haben. Ihr Arzt wird Sie während der Behandlung mit diesem Arzneimittel überwachen.

• Muskelschwäche, Muskelpfindlichkeit oder anhaltende Muskelschwäche, insbesondere wenn Sie zur gleichen Zeit Beschwerden haben wie Unwohlsein und Fieber, die auch nach Absetzen von Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma nicht abklingen (Häufigkeit nicht bekannt)

• Myasthenia gravis (eine Erkrankung, die zu allgemeiner Muskelschwäche führt, einschließlich in einigen Fällen einer Schwäche der Muskulatur)

• okulare Myasthenie (eine Erkrankung, die eine Muskelschwäche der Augen verursacht).

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie in Ihren Armen oder Beinen ein Schwächegefühl verspüren, das sich nach Phasen der Aktivität verändert, bei Doppelsehen oder Hängen Ihrer Augenlider, Schluckbeschwerden oder Kurzatmigkeit.

**Meldung von Nebenwirkungen**  
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch ohne einen Arztbesuch melden.

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte  
Abt. Pharmakovigilanz  
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3  
D-53175 Bonn  
Website: <https://www.bfarm.de>

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### 5 Wie ist Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.  
Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Blisterpackung und dem Umkarton nach „verwendbar bis“ oder „verw. bis“ angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie Arzneimittel zu entsorgen sind, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden sie unter <https://www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung>.

### 6 Inhalt der Packung und weitere Informationen

**Was Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma enthält**  
Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma 10 mg/10 mg Filmtabletten: Jede Filmtablette enthält 10 mg Ezetimib und 10 mg Atorvastatin (als Calcium-Trihydrat).

Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma 10 mg/20 mg Filmtabletten: Jede Filmtablette enthält 10 mg Ezetimib und 20 mg Atorvastatin (als Calcium-Trihydrat).

Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma 10 mg/40 mg Filmtabletten: Jede Filmtablette enthält 10 mg Ezetimib und 40 mg Atorvastatin (als Calcium-Trihydrat).

Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma 10 mg/80 mg Filmtabletten: Jede Filmtablette enthält 10 mg Ezetimib und 80 mg Atorvastatin (als Calcium-Trihydrat).

Die sonstigen Bestandteile sind:

**Tabletten Kern:**  
Mikrokrystalline Cellulose, Mannitol (Ph.Eur.), Calciumcarbonat, Croscarmellose-Natrium, Hydroxypropylmethylcellulose (K100, Hydroxypropylgruppen), Polyborax 80, Eisen(III)-hydroxyd-oxid x H<sub>2</sub>O, Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich], Povidon K-29/32, Natriumdodecylsulfat

**Filmüberzug:**  
Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg, 10 mg/80 mg  
Lactose-Monohydrat  
Hypropyllose  
Sandoz  
Macrogol 4000

Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma 10 mg/80 mg:  
Hypropyllose  
Titanioxyd  
Talkum  
Macrogol 400  
Eisen(III)-hydroxyd-oxid x H<sub>2</sub>O

**Wie Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma aussieht und Inhalt der Packung**  
Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma 10 mg/10 mg Filmtabletten: Weiße, runde, bikonvexe Filmtabletten mit einem Durchmesser von ca. 8,1 mm.

Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma 10 mg/20 mg Filmtabletten: Weiße, ovale, bikonvexe Filmtabletten mit Abmessungen von ca. 11,6 x 7,1 mm.

Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma 10 mg/40 mg Filmtabletten: Weiße, kapselförmige, bikonvexe Filmtabletten mit Abmessungen von ca. 16,1 x 6,1 mm.

Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma 10 mg/80 mg Filmtabletten: Gelbe, längliche, bikonvexe Filmtabletten mit Abmessungen von ca. 19,1 x 7,8 mm.

Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg, 10 mg/80 mg Filmtabletten  
OPA/Alu/PVC/Alu-Blisterpäckungen mit 30, 90 und 100 Filmtabletten  
OPA/Alu/PVC/Alu-Einzeloidos-Blisterpäckungen mit 30x1, 90x1 und 100x1 Filmtabletten

Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma 10 mg/80 mg Filmtabletten; OPA/Alu/PVC/Alu-Blisterpäckungen mit 30, 90 (2x50) und 100 (2x50) Filmtabletten  
OPA/Alu/PVC/Alu-Einzeloidos-Blisterpäckungen mit 30x1, 90x1 (2x45x1) und 100x1 (2x50x1) Filmtabletten

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

**Pharmazeutischer Unternehmer**  
1 A Pharma GmbH  
Industriestrasse 9  
83607 Holzkirchen  
Germany  
Telefon: (08024) 908-3030

**Hersteller**  
Lek Pharmaceuticals d.d.  
Verovskova ulica 57  
1526 Ljubljana  
Slowenien

**Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:**

Deutschland Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma 10 mg/10 mg Filmtabletten  
Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma 10 mg/20 mg Filmtabletten  
Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma 10 mg/40 mg Filmtabletten  
Ezetimib/Atorvastatin - 1 A Pharma 10 mg/80 mg Filmtabletten

Niederlande Ezetimibe/Atorvastatine Sandoz 10 mg/10 mg, filmomhulde tabletten  
Ezetimibe/Atorvastatine Sandoz 10 mg/20 mg, filmomhulde tabletten  
Ezetimibe/Atorvastatine Sandoz 10 mg/40 mg, filmomhulde tabletten  
Ezetimibe/Atorvastatine Sandoz 10 mg/80 mg, filmomhulde tabletten

Belgien Tmyzato 10 mg/10 mg filmomhulde tabletten  
Tmyzato 10 mg/20 mg filmomhulde tabletten  
Tmyzato 10 mg/40 mg filmomhulde tabletten  
Tmyzato 10 mg/80 mg filmomhulde tabletten

Frankreich EZETIMIBE/ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg/10 mg, comprimé pelliculé  
EZETIMIBE/ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg/20 mg, comprimé pelliculé  
EZETIMIBE/ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg/40 mg, comprimé pelliculé  
EZETIMIBE/ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg/80 mg, comprimé pelliculé

Griechenland Ezetimibe e Atorvastatina Sandoz  
Italien Ezetimib/atorvastatin Sandoz 10 mg/10 mg filmomhulde tablette  
Kroatien Ezetimib/atorvastatin Sandoz 10 mg/20 mg filmomhulde tablette  
Ezetimib/atorvastatin Sandoz 10 mg/40 mg filmomhulde tablette  
Ezetimib/atorvastatin Sandoz 10 mg/80 mg filmomhulde tablette

Litauen Ezetimibe/Atorvastatin Sandoz 10 mg/10 mg plevėle dengtos tabletės  
Ezetimibe/Atorvastatin Sandoz 10 mg/20 mg plevėle dengtos tabletės  
Ezetimibe/Atorvastatin Sandoz 10 mg/40 mg plevėle dengtos tabletės  
Ezetimibe/Atorvastatin Sandoz 10 mg/80 mg plevėle dengtos tabletės

Polen Ezetimibe 1 A Atorvastatin Sandoz  
Portugal Atorvastatina - Ezetimiba Sandoz Farmacêutica  
Rumänien Ezetimib/Atorvastatin Sandoz 10 mg/10 mg comprimate filmate  
Ezetimib/Atorvastatin Sandoz 10 mg/20 mg comprimate filmate  
Ezetimib/Atorvastatin Sandoz 10 mg/40 mg comprimate filmate  
Ezetimib/Atorvastatin Sandoz 10 mg/80 mg comprimate filmate

Slowakei Ezetimib/Atorvastatin Sandoz 10 mg/10 mg  
Ezetimib/Atorvastatin Sandoz 10 mg/20 mg  
Ezetimib/Atorvastatin Sandoz 10 mg/40 mg  
Ezetimib/Atorvastatin Sandoz 10 mg/80 mg

Spanien Ezetimiba/Atorvastatina Sandoz Farmacêutica 10 mg/10 mg comprimidos recubiertos con película EFC  
Ezetimiba/Atorvastatina Sandoz Farmacêutica 10 mg/20 mg comprimidos recubiertos con película EFC  
Ezetimiba/Atorvastatina Sandoz Farmacêutica 10 mg/40 mg comprimidos recubiertos con película EFC  
Ezetimiba/Atorvastatina Sandoz Farmacêutica 10 mg/80 mg comprimidos recubiertos con película EFC

Ungarn Ezetimib/Atorvastatin 1 A Pharma 10 mg/10 mg filmtableta  
Ezetimib/Atorvastatin 1 A Pharma 10 mg/20 mg filmtableta  
Ezetimib/Atorvastatin 1 A Pharma 10 mg/40 mg filmtableta  
Ezetimib/Atorvastatin 1 A Pharma 10 mg/80 mg filmtableta

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Dezember 2024.**