Gebrauchsinformation: Information für Patienten

Minoxidil nio 2,5 mg Tabletten
Minoxidil nio 5 mg Tabletten
Minoxidil nio 10 mg Tabletten
Minoxidil

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Minoxidil nio und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Minoxidil nio beachten?
3. Wie ist Minoxidil nio einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Minoxidil nio aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Minoxidil nio und wofür wird es angewendet?

Das von Ihrem Arzt verordnete Arzneimittel ist ein blutdrucksenkendes Arzneimittel und gehört zur Gruppe der sogenannten Antihypertonika. Der Wirkstoff heißt Minoxidil.

Minoxidil nio wird angewendet, wenn mit anderen Arzneimitteln – auch in Kombination (übliche Dreifachkombination) – keine ausreichende Blutdruckkontrolle erreicht werden kann (therapieresistente Hypertonie).

Minoxidil nio sollte gleichzeitig mit einem harntreibenden Mittel (Diuretikum) und einem Mittel, das die Adrenalinwirkung hemmt (Betarezeptorenblocker), gegeben werden (siehe auch Abschnitt 2).

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Minoxidil nio beachten?

Minoxidil nio darf nicht eingenommen werden,
- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen den Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- wenn Sie an Bluthochdruck im kleinen Kreislauf (pulmonale Hypertonie) aufgrund einer Verengung der Klappenöffnung zwischen linkem Vorhof und linker Herzkammer (Mitralstenose) leiden.
- wenn Sie einen Tumor des Nebennierenmarks (Phäochromozytom) haben.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn einer der oben aufgeführten Punkte auf Sie zutrifft, da Sie dann Minoxidil nio nicht einnehmen dürfen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Minoxidil nio einnehmen.

Wenn Sie einen Herzinfarkt (Myokardinfarkt) hatten, sollten Sie erst nach Stabilisierung Ihres Zustands mit Minoxidil nio behandelt werden.

Dieses Medikament kann zu beschleunigtem Herzschlag sowie zu anfallsartigen Schmerzen in der Brust (Angina pectoris) führen. Daher ist es notwendig, Minoxidil nio zusammen mit Arzneimitteln einzunehmen, die diesen Reaktionen entgegenwirken (Betarezeptorenblocker oder andere Sympatholytika). Wenn Sie an Angina pectoris leiden, darf Minoxidil nur mit Vorsicht angewendet werden.

Kurz nach Behandlungsbeginn treten bei ca. 60 % der Patienten Veränderungen in der Richtung und im Ausmaß der T-Wellen im EKG auf. Diese Veränderungen verschwinden gewöhnlich bei längerer Behandlungsdauer und gehen nach Absetzen von Minoxidil wieder zurück.

Bei ca. 3 bis 5 % der mit Minoxidil behandelten Nichtdialysepatienten traten krankhafte Veränderungen des Herzbeutels auf (Perikardergüsse, gelegentlich mit Tamponade). Die Perikardergüsse ereigneten sich vor allem bei Patienten, die eine ungenügende oder eingeschränkte Nierenfunktion oder andere bereits bestehende schwere Krankheitszustände hatten. Ihr Arzt wird Sie daher möglicherweise sorgfältig auf Anzeichen von Perikarderguss und Herzbeutelbeschwerden beobachten.

Minoxidil nio wird nicht zur Behandlung eines leichten oder labilen Bluthochdrucks empfohlen.

<u>Wirkung auf den Salz- und Wasserhaushalt:</u>
Bei Einnahme von Minoxidil können körperliche Anzeichen wie eine Wasseransammlung im Gewebe (Ödembildung) oder eine Verschlechterung einer bestehenden Herzleistungsschwäche auftreten. Dies gilt in verstärktem Maße, wenn Minoxidil ohne zusätzliche Arzneimittel eingenommen wird. Es ist deshalb notwendig, dass Minoxidil nio zusammen mit einem harntreibenden Mittel eingenommen wird, das überflüssige Salz- und Wasseransammlungen aus dem Körper schwemmt. Auf eine kochsalzarme Kost ist zu achten.
Bitte kontrollieren Sie täglich Ihr Körpergewicht. Sollten Sie rasch 2 kg oder mehr an Körpergewicht zunehmen oder Schwellungen im Gesicht, an den Augenlidern oder Händen, den Fußknöcheln oder in der Magengegend feststellen, so könnte dies ein Zeichen vermehrter Wasseransammlungen in Gewebe sein. Ihr Arzt muss dann eventuell die Dosierung Ihrer Arzneimittel ändern.
Körpergewichtszunahmen im Bereich von 1 bis 1,5 kg treten häufig zu Beginn der Behandlung auf. Eine solche Zunahme verschwindet aber meist bei fortgesetzter Behandlung. Die Einlagerung von Wasser und Salz im Körper (mehr als 1 bis 1,5 kg) kann die Wirksamkeit von Minoxidil nio verringern. Ihr Arzt sollte Ihnen die Einhaltung einer Therapie mit harntreibenden Mitteln sorgfältig erklären.

Wenn Sie an eingeschränkter Nierenfunktion leiden, die keine Blutreinigung (Dialyse) erfordert, sollte unter Minoxidil nio-Behandlung besonders der Salz- und Wasserhaushalt kontrolliert werden, damit dieser ausgewogen bleibt.

Wenn Sie an Nierenversagen leiden oder Dialysepatient sind, benötigen Sie möglicherweise eine niedrigere Dosis von Minoxidil nio.

Bei den meisten Patienten, die Minoxidil einnahmen, trat eine Verlängerung, Farbintensivierung und Verdichtung der feinen Körperbehaarung an verschiedenen Körperbereichen auf. Diese Erscheinung wurde ca. 3 bis 6 Wochen nach Behandlungsbeginn beobachtet. Zuerst wird der Haarwuchs auf der Stirn, den Schläfen, zwischen den Augenbrauen oder dem oberen Teil der Wangen sichtbar, später verstärkt sich die Behaarung auf dem Rücken, den Armen, Beinen oder der Kopfhaut. Manche Patienten nehmen den vermehrten Haarwuchs kaum wahr. Frauen und Kinder empfinden dieses jedoch oft als lästig. Unerwünschte Haare können mit Haarentfernungsmitteln oder durch Rasieren entfernt werden. 1 bis 6 Monate nach Absetzen der Minoxidilbehandlung verschwindet der vermehrte Haarwuchs wieder. Beenden Sie keinesfalls eigenmächtig die Einnahme von Minoxidil nio aufgrund dieser Nebenwirkungen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Diese Nebenwirkungen können zwar lästig sein, sie sind aber ungefährlich.

Selten kam es zu einer Verminderung von Blutbestandteilen (Thrombozytopenie, Leukopenie).

Einnahme von Minoxidil nio zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich eingenommen haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen.

Mit anderen blutdrucksenkenden Arzneimitteln (z. B. Guanethidin, Betanidin) kann es zu einer übermäßigen Blutdrucksenkung kommen. Es könnte sein, dass Ihr Körper den Blutdruck im Sitzen oder Stehen schlechter anpassen kann (Orthostase). Daher wird empfohlen, einige Tage vor Beginn der Behandlung mit Minoxidil nio die anderen Arzneimittel in Absprache mit Ihrem Arzt abzusetzen. Falls das nicht möglich ist, sollte Ihre Behandlung unter Beobachtung im Krankenhaus begonnen werden.

Erregungshemmende Arzneimittel (Neuroleptika)
Es wurde eine verstärkte blutdrucksenkende Wirkung bei gleichzeitiger Gabe von Minoxidil und Neuroleptika beobachtet.

Harntreibende Mittel (Diuretika)
Die durch Minoxidil nio verursachte Wasseransammlung im Körper kann durch zusätzliche Diuretika wirksam eingeschränkt werden (siehe Abschnitt 4).

Mittel zur Senkung von Herzfrequenz, Schlagkraft und Erregbarkeit (Betarezeptorenblocker)
Der bei alleiniger Gabe von Minoxidil nio verursachte erhöhte Puls wird von einem Betarezeptorenblocker wirksam unterdrückt (siehe Abschnitt 4).

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit
Schwangerschaft
Es liegen nur begrenzte Daten zur Anwendung von Minoxidil bei schwangeren Frauen vor. Minoxidil wird nicht zur Anwendung während der Schwangerschaft und bei gebärfähigen Frauen, die keine Verhütung anwenden, empfohlen.

Stillzeit
Es liegen Berichte vor, dass Minoxidil in die Muttermilch ausgeschieden wird. Ein Risiko für das zu stillende Kind kann nicht ausgeschlossen werden. Über die Anwendung in der Stillzeit muss, nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung, der Arzt entscheiden.

Fortpflanzungsfähigkeit
Für die Anwendung von Minoxidil beim Menschen liegen keine Daten zur Fortpflanzungsfähigkeit vor.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein, oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
Es wurden keine Studien zur Wirkung von Minoxidil auf die Verkehrstüchtigkeit oder die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt. Die Fähigkeit, Auto zu fahren oder Maschinen zu bedienen, kann abhängig von Ihrem individuellen Ansprechen auf die Behandlung beeinflusst werden, insbesondere zu Beginn der Therapie.

Minoxidil nio enthält Lactose
Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. Wie ist Minoxidil nio einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Gewöhnlich wird Ihr Arzt zwei weitere Arzneimittel zusammen mit Minoxidil nio verordnen. Diese unterstützen ebenfalls die Senkung Ihres Bluthochdrucks und unterdrücken unerwünschte Wirkungen von Minoxidil nio.

Wird der Blutdruck gesenkt, z. B. durch ein Arzneimittel wie Minoxidil nio, so versucht der Körper, wieder die ursprüngliche Blutdruckhöhe zu erreichen. Dies erfolgt mithilfe von Wasseransammlungen im Körper (das Herz hat dann mehr Flüssigkeit zu pumpen) und schnellerem Schlagen des Herzens. Um dies zu verhindern, wird Ihr Arzt normalerweise ein harntreibendes Mittel *(Diuretikum)* verschreiben und ein weiteres Mittel, das den Herzschlag *(Puls)* erniedrigt *(Betarezeptorenblocker)*.

Die regelmäßige Einnahme von Minoxidil nio und der weiteren Arzneimittel ist gerade bei Ihrer Krankheit unbedingt erforderlich. Verändern Sie keinesfalls eigenmächtig die Dosis von Minoxidil nio und der weiteren Arzneimittel. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

Die Einstellung mit Minoxidil sollte in einer Spezialambulanz oder -klinik vorgenommen werden. Regelmäßige Kontrolluntersuchungen durch die genannten Institutionen müssen gewährleistet sein. Dabei muss das harntreibende Mittel so dosiert werden, dass keine Gewichtszunahme infolge vermehrter Wasseransammlung im Gewebe *(Wasserretention)* erfolgen kann.

Wie viele Tabletten von Minoxidil nio Sie einnehmen sollen

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, wird üblicherweise wie folgt dosiert:

<u>Erwachsene und Kinder über 12 Jahre</u>
Die übliche Anfangsdosis von Minoxidil nio für Erwachsene und Kinder über 12 Jahren beträgt 5 mg Minoxidil (2 Tabletten zu 2,5 mg, 1 Tablette zu 5 mg oder ½ Tablette zu 10 mg) pro Tag.

Falls erforderlich, kann Ihr Arzt die Dosierung erhöhen. Eine Dosiserhöhung sollte frühestens nach 3 Tagen oder nach einem noch längeren Abstand erfolgen.

<u>Anwendung bei Kindern bis zu 12 Jahren</u>

Während der Behandlung mit Minoxidil sollte das Kind von einem Facharzt überwacht werden. Die Tagesdosis von Minoxidil wird durch den Facharzt festgelegt und kann entsprechend der Bedürfnisse des Kindes angepasst werden. Das Kind wird während der Therapie zusätzlich nach Maßgabe des Facharztes noch andere Arzneimittel erhalten, um einen beschleunigten Herzschlag und eine Flüssigkeitsansammlung im Körper zu vermeiden. Sie sollten einen Arzt aufsuchen, wenn das Kind eines der folgenden Symptome hat: sehr schneller Herzschlag, beschleunigte Atmung, geschwollene Beine, schnelle Gewichtszunahme und verminderte Harnausscheidung. Während das Kind mit Minoxidil behandelt wird, muss es zu regelmäßigen Kontrolluntersuchungen zum Arzt.

Was die maximale Tagesdosis ist
Eine maximale Tagesdosis von 100 mg Minoxidil bei Erwachsenen und 50 mg Minoxidil bei Kindern sollte nicht überschritten werden.

Bei Patienten mit schweren Nierenfunktionsstörungen (Kreatinin-Clearance unter 30 ml/min) oder bei Dialysepatienten kann die erforderliche Dosierung geringer sein. Minoxidil nio sollte nach der Dialyse oder spätestens 2 Stunden vor der Dialyse eingenommen werden.

Bei Patienten mit eingeschränkter Leberfunktion wird die Dosis möglicherweise angepasst werden. Die Therapie kann mit einer reduzierten Dosis einmal täglich begonnen und dann gesteigert werden, bis mit der niedrigsten wirksamen Dosis der gewünschte therapeutische Effekt erreicht ist.

Minoxidil nio sind in verschiedenen Stärken erhältlich. Achten Sie bitte auf das Aussehen der Tabletten (siehe „Wie Minoxidil nio aussieht und Inhalt der Packung“).

Zu Beginn der Behandlung mit Minoxidil nio wird Ihr Arzt Sie häufiger sehen müssen, um die richtige Dosis für Sie zu bestimmen. Nehmen Sie Ihr Arzneimittel entsprechend dem von Ihrem Arzt verordneten Dosierungsschema ein.

Wenn Sie von mehreren Ärzten behandelt werden, teilen Sie allen Ärzten mit, dass Sie ein Bluthochdruckpatient sind, der mit Minoxidil nio behandelt wird.

Art der Anwendung

Zum Einnehmen.

Nehmen Sie Minoxidil nio mit ausreichend Flüssigkeit ein.

Minoxidil nio 2,5 mg Tabletten
Die Tablette kann in gleiche Dosen geteilt werden.

Minoxidil nio 10 mg Tabletten
Die Tablette kann in gleiche Dosen geteilt werden.

Dauer der Behandlung

Eine bestimmte zeitliche Begrenzung ist nicht vorgesehen. Die Dauer der Anwendung hängt vom Verlauf Ihrer Erkrankung ab. Bitte sprechen Sie darüber mit Ihrem Arzt.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Minoxidil nio zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge von Minoxidil nio eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie versehentlich eine größere Menge von diesem Arzneimittel eingenommen haben, als Sie sollten, wird als wahrscheinlichste Nebenwirkung ein zu niedriger Blutdruck auftreten.

Gelegentlich wurde als weitere Nebenwirkung eine Verminderung der Harnausscheidung beschrieben. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie zu viele Tabletten eingenommen haben.

Wenn Sie die Einnahme von Minoxidil nio vergessen haben

Lassen Sie keine Dosis aus. Falls Sie eine Dosis vergessen haben, nehmen Sie die versäumte Dosis nicht nachträglich ein, sondern setzen Sie die Einnahme zum nächsten Einnahmetermin wie verordnet fort

Wenn Sie die Einnahme von Minoxidil nio abbrechen

Unterbrechen oder beenden Sie die Einnahme von Minoxidil nio oder der Zusatzarzneimittel nicht ohne Rücksprache mit Ihrem behandelnden Arzt.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Wenn Sie Minoxidil einnehmen, kann es in der Regel zu einer Verringerung bereits bestehender Nebenwirkungen kommen, die auf Ihre Krankheit oder eine frühere Therapie zurückzuführen sind.

Sehr häufige Nebenwirkungen (kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen)
- erhöhte Herzfrequenz (Tachykardie). Minoxidil kann eine Erhöhung der Anzahl der Herzschläge pro Minute verursachen. Um dies zu vermeiden, müssen Sie die von Ihrem Arzt verschriebenen zusätzlichen Arzneimittel einnehmen. Kontrollieren Sie Ihren Puls in Ruhestellung. Wenn der Puls mehr als 20 Schläge pro Minute über dem Normalwert (ca. 70 Schläge) liegt, sollten Sie sofort einen Arzt aufsuchen. Bitte fragen Sie Ihren Arzt, wie oft Sie Ihren Puls kontrollieren sollten.
- Entzündung des Herzbeutels (Perikarditis),
- verstärkter Haarwuchs (Hypertrichose), Veränderung der Haarfarbe,
- abnormales Elektrokardiogramm (EKG).

Häufige Nebenwirkungen (kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen)
- Flüssigkeitsansammlung im Gewebe (Salz- und Wasserretention), Ödeme (Flüssigkeitsansammlung im Gewebe),
- Flüssigkeitsansammlung um das Herz (Perikarderguss), Kompression des Herzens aufgrund von Flüssigkeitsansammlung (Perikardtamponade),
- Magen-Darm-Unverträglichkeiten.

Gelegentliche Nebenwirkungen (können bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen)
- Ansammlung von Flüssigkeit zwischen den Gewebeschichten, die die Lungen und die Brusthöhle auskleiden (Pleuraergüsse),
- Spannungsgefühl in der Brust.

Seltene Nebenwirkungen (kann bis zu 1 von 1 000 Behandelten betreffen)
- Verminderung der weißen Blutkörperchen (Leukopenie) und der Blutplättchen (Thrombozytopenie), in Einzelfällen auch Verkürzung der Lebensdauer bestimmter Blutbestandteile (hämolytische Anämie),

- allergische Reaktionen,
- antinukleäre Antikörper,
- Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckerarten (Glukoseintoleranz),
- Engegefühl in der Brust, neue oder sich verschlimmernde Schmerzen in Brust, Armen, Schultern oder Oberbauchbeschwerden. Dies können Anzeichen für ernsthafte Herzprobleme (Angina pectoris) sein. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- zu niedriger Blutdruck (Hypotonie) im Zusammenhang mit einer früheren oder gleichzeitigen Anwendung von Guanethidin (zur Behandlung von Bluthochdruck oder zur lokalen Blockade eines Nervs),
- pulmonale Infiltrate,
- Übelkeit,
- schwere fieberhafte Erkrankungen mit Entzündungen und Blasenbildung der Haut und Schleimhäute, z. B. im Bereich von Mund, Nase oder Genitalien (Stevens-Johnson-Syndrom),
- Ausschlag,
- Entzündungen und Blasenbildung der Haut (bullöse Dermatitis),
- Vergrößerung der Brust bei Männern (Gynäkomastie),
- Anstieg der Leberenzyme.

Nicht bekannt (Häufigkeit kann anhand der verfügbaren Daten nicht abgeschätzt werden)
- Schwindel, Schläfrigkeit, Schwächegefühl,
- Atembeschwerden, insbesondere im Liegen,
- schwere und möglicherweise lebensbedrohliche Hautreaktionen (toxische epidermale Nekrolyse),
- Schwellungen der Knöchel, Füße oder Finger (Ödeme an den Extremitäten) mit oder
- ohne Gewichtszunahme,
- Vorübergehende Veränderung folgender Blutwerte zu Beginn der Behandlung: Abnahme von Hämoglobin und Hämatokrit, Anstieg der Serumkreatinin- und Blutharnstoffwerte.

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Minoxidil nio aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Blisterpackung nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Minoxidil nio enthält

- Der Wirkstoff ist Minoxidil. Jede Tablette enthält entweder 2,5 mg, 5 mg oder 10 mg Minoxidil.
- Die sonstigen Bestandteile sind Lactose-Monohydrat; Mikrokristalline Cellulose; Maisstärke; Hochdisperses Siliciumdioxid und Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich].

Wie Minoxidil nio aussieht und Inhalt der Packung

Minoxidil nio 2,5 mg-Tabletten
Minoxidil nio 2,5 mg-Tabletten sind weiße bis cremefarbene, runde, bikonvexe Tabletten mit der Prägung „2.5“ auf einer Seite und einer Bruchkerbe auf der anderen Seite, mit einem Durchmesser von etwa 5,0 mm.

Minoxidil nio 5 mg-Tabletten
Minoxidil nio 5 mg-Tabletten sind weiße bis cremefarbene, kapselförmige Tabletten mit der Prägung „5“ auf einer Seite und einer glatten Oberfläche auf der anderen Seite, mit einem Durchmesser von etwa 8,0 mm x 5,0 mm.

Minoxidil nio 10 mg-Tabletten
Minoxidil nio 10 mg-Tabletten sind weiße bis cremefarbene, ovalförmige Tabletten mit der Prägung „10“ auf einer Seite und einer Bruchkerbe auf der anderen Seite, mit einem Durchmesser von etwa 11,5 mm x 7,0 mm.

Minoxidil nio ist in Einzeldosis-Blisterpackungen mit 30 x 1 und 100 x 1 Tabletten erhältlich.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer

nio Health GmbH
Van-der-Smissen-Str. 1
22767 Hamburg
Deutschland

Hersteller

Delorbis Pharmaceuticals Ltd.
17 Athinon Street
Ergates Industrial Area
2643 Ergates Lefkosia
Zypern

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

Deutschland	Minoxidil nio 2,5 mg Tabletten Minoxidil nio 5 mg Tabletten Minoxidil nio 10 mg Tabletten

Malta	Minoxidil nio 2.5 mg tablets Minoxidil nio 5 mg tablets Minoxidil nio 10 mg tablets

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im September 2026.