

NAGELPILZ LÖSUNG

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Informationen über Onychomykosen (Pilzinfektionen der Nägel)

Nagelpilzinfektionen (wissenschaftlich Onychomykose genannt) können an Finger- und Zehennägeln auftreten. Es handelt sich um eine relativ häufige Erkrankung. Die häufigsten Symptome einer Nagelpilzinfektion sind Verdickung und Verfärbung der Nägel. Mit dem Fortschreiten der Pilzinfektion werden die Nägel spröde, bröckelig und unansehnlich; unbehandelt kommt es zu einer schmerzhaften Entzündung der Haut mit unangenehmem Geruch.

Wodurch wird Nagelpilz verursacht?

Eine Nagelpilzinfektion entsteht durch das Wachstum von Pilzen unter, in oder auf der eigentlichen Nagelplatte. Pilze gedeihen in warmen, feuchten Umgebungen. Es gibt viele Ursachen für Nagelpilzinfektionen, aber bestimmte Risikofaktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit, eine solche zu entwickeln.

Typische Risikofaktoren:

- Häufige Teilnahme an sportlichen Aktivitäten
- Schwimmen und Baden in öffentlichen Einrichtungen
- Im Zehenbereich geschlossenes Schuhwerk

- Leben in warmen, feuchten Klimazonen
- Alter über 65 Jahre und Diabeteserkrankung (höhere Empfindlichkeit für Infektionen und Pilzinfektionen aufgrund eines geschwächten Immunsystems)
- Nagelverletzung

WIRKUNGSWEISE

efasit® Nagelpilz Lösung unterstützt mit seinem anwenderfreundlichen Pinsel die Behandlung und Vorbeugung von Nagelpilzinfektionen (auch Onychomykose genannt) an Zehen und Fingern.

efasit® Nagelpilz Lösung erzeugt eine Schutzschicht auf der Nagelplatte, die die geschädigten Nagelstrukturen schützt und das Eindringen weiterer Pilze in den Nagel verhindert.

Die kombinierten Inhaltsstoffe bilden eine mechanische FilmbARRIERE, die den Nagel von schädlichen Umwelteinflüssen abschirmt. Darüber hinaus trägt die Formulierung von efasit® Nagelpilz Lösung zum Erhalt eines sauren pH-Werts des Nagels bei. Auf diese Weise kann die Mikroumgebung des betroffenen Nagels reguliert und für den Nagelpilz ungünstige Lebensbedingungen geschaffen werden. Neben der positiven Auswirkung auf den Heilungsverlauf verbessert efasit® Nagelpilz Lösung insgesamt Aussehen und Zustand des betroffenen Nagels.

ANWENDUNG

Tragen Sie efasit® Nagelpilz Lösung mindestens einmal täglich auf, bis es sichtbare Anzeichen einer Verbesserung gibt. Das Produkt sollte vorzugsweise morgens und/oder abends vor dem Schlafengehen aufgetragen werden. Danach sollte darauf geachtet werden, dass die Nägel nicht nass werden.

Für ein optimales Ergebnis wird die Anwendung von efasit® Nagelpilz Lösung so lange fortgesetzt, bis der geschädigte Teil des Nagels vollständig verschwunden und ein gesunder Nagel nachgewachsen ist. efasit® Nagelpilz Lösung kann auch vorbeugend gegen das Auftreten einer Nagelpilzinfektion verwendet werden.

Auftragen

1. Vor dem Auftragen sorgfältig die Hände bzw. Füße waschen
2. efasit® Nagelpilz Lösung sollte auf die trockenen Nägel aufgetragen werden, die von Nagellack oder Resten von Nagellackentferner gereinigt wurden
3. Es muss eine ausreichende Menge des Produkts auf den gesamten, betroffenen Nagel aufgetragen werden; ein direkter Kontakt der Lösung mit der umgebenden Haut ist zu vermeiden
4. Die Lösung trocknen lassen und nach Möglichkeit mindestens 2 Stunden nach dem Auftragen auf das Tragen von Strümpfen und/oder Schuhen verzichten

Tragen Sie auf den betroffenen Nagel keine anderen Produkte wie z. B. Nagellack, Puder, Sprays usw. auf, da die Wirksamkeit von efasit® Nagelpilz Lösung dadurch vermindert oder beeinträchtigt werden könnte.

ZUSAMMENSETZUNG

Alcohol Denat, Aqua, Urea, Lactic Acid, Ethoxydiglycol, Decylene Glycol, Polyquaternium-7, Sodium Hydroxide, Thymus Vulgaris Oil, Copper Usnate.

WARNHINWEISE

efasit® Nagelpilz Lösung ist zur Anwendung durch eine Person vorgesehen und darf nicht an andere Personen weitergegeben werden. Das Produkt darf nur zur äußerlichen Anwendung auf Nägeln verwendet werden. Das Produkt darf nicht auf die Haut und über den unteren Nagelrand hinaus aufgetragen werden. Durch Auftragen des Produkts auf die Haut kann es zu einer Reizung oder Kontaktdermatitis kommen. Nur zur äußerlichen Anwendung. Nur entsprechend der vorgesehenen Anwendung auftragen. Nicht auf Wunden, verletzte Haut oder blutende Nagelränder auftragen. Den Kontakt mit Augen und Schleimhäuten (z. B. Mund, Nase und andere Körperöffnungen) vermeiden: Im Fall eines Kontakts mit den Augen oder Schleimhäuten gründlich mit Wasser spülen und gegebenenfalls ärztlichen Rat einholen. Entflammbare Flüssigkeit. Nur zur Anwendung bei Erwachsenen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Das Produkt nicht verschlucken. Trocken, lichtgeschützt und vor Hitzequellen und Flammen geschützt bei Raumtemperatur (5 °C bis 30 °C) aufbewahren. Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist. Das Produkt wurde für die Anwendung während Schwangerschaft und Stillzeit nicht untersucht; wenn Sie schwanger sind/stillen, fragen Sie vor der Anwendung Ihren Arzt. Nicht nach Ablauf des auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatums anwenden. Nach der Anwendung zum Verschließen den Pinsel auf die Flasche aufschrauben.

NEBENWIRKUNGEN

Die Anwendung von efasit® Nagelpilz Lösung ist mit keinen bekannten Nebenwirkungen verbunden, sofern das Produkt entsprechend dieser Gebrauchsanweisung korrekt verwendet und aufgetragen wird. Es sollte jedoch nicht bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe verwendet werden. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Nebenwirkungen oder anhaltende Symptome auftreten.

Bitte beachten

Bei anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden: Wenden Sie sich an Ihren Arzt.
Bei Verschlimmerung von Symptomen, Auftreten einer Entzündung, allergischen Reaktion oder Infektion: Wenden Sie sich an Ihren Arzt.
Im Verlauf des natürlichen Nagelwachstums müssen geschädigte Nagelteile entfernt werden.

Mögliche Wechselwirkungen

Es gibt keine bekannten Nebenwirkungen durch die gleichzeitige Anwendung des äußerlich aufgetragenen Produkts und der Einnahme von Antimykotika (Wirkstoffen zu Bekämpfung von Pilzerkrankungen). Im Fall von Nebenwirkungen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Medizinprodukt

Symbol	Bedeutung
	Hersteller
	CE-Kennzeichnung, Referenznummer 0477 der Benannten Stelle
	Gebrauchsanweisung beachten
	Temperaturgrenze 5 °C bis 30 °C
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
	Verfallsdatum
	Chargenbezeichnung/ Losnummer

Vertrieb:

Kyberg Medical GmbH

Keltenring 8

82041 Oberhaching

www.efasit.de, efasit@kyberg.de

JFBD

Rev. 11-2019

4 ml e



Biokosmes s.r.l. – socio unico

Via dei Livelli 1, 23842 Bosisio Parini (LC) ITALIEN

Hergestellt in Italien