



Vliwasorb®

Superabsorbierender Wundverband
Pansement super-absorbant
Superabsorbent Wound Dressing
Apósito de alta absorción

Penso super-absorbente

Medicazione superassorbente

Superabsorberend wondverband

Højabsorberende sårforbinding

Högabsorberande sårförband

Høyabsorberende sårbandasje

Huipputehokas imupaineside

Vysoce absorpční obvaz na rány

Nagy nedvszívó képességű kötés

Wysoce chłonny opatrunek

Visokovpojna obloga

Kompresa velike moći upijanja

Επίθεμα γάζας υψηλής απορροφητικότητας

Επίθεμα γάζας υψηλής απορροφητικότητας

Επίθεμα γάζας υψηλής απορροφητικότητας

Επίθεμα γάζας υψηλής απορροφητικότητας

Επίθεμα γάζας υψηλής απορροφητικότητας

Επίθεμα γάζας υψηλής απορροφητικότητας

Επίθεμα γάζας υψηλής απορροφητικότητας

Επίθεμα γάζας υψηλής απορροφητικότητας

Επίθεμα γάζας υψηλής απορροφητικότητας

Επίθεμα γάζας υψηλής απορροφητικότητας

Επίθεμα γάζας υψηλής απορροφητικότητας

Επίθεμα γάζας υψηλής απορροφητικότητας

Επίθεμα γάζας υψηλής απορροφητικότητας

Επίθεμα γάζας υψηλής απορροφητικότητας

Επίθεμα γάζας υψηλής απορροφητικότητας

Επίθεμα γάζας υψηλής απορροφητικότητας

Επίθεμα γάζας υψηλής απορροφητικότητας

Επίθεμα γάζας υψηλής απορροφητικότητας

Επίθεμα γάζας υψηλής απορροφητικότητας

Επίθεμα γάζας υψηλής απορροφητικότητας

Επίθεμα γάζας υψηλής απορροφητικότητας

Επίθεμα γάζας υψηλής απορροφητικότητας

de Gebrauchsanweisung

Produktbeschreibung:

Vliwasorb® Superabsorbierender Wundverband ist eine flexible, weiche Wundauflage, die zur Versorgung stark exsudierender Wunden eingesetzt wird. Vliwasorb® Superabsorbierender Wundverband besteht aus in Zellulose eingebettetem Superabsorber (Natriumpolyacrylat), der hohe Mengen an Wundexsudat fest binden kann. Durch die hohe Aufnahmekapazität verringert Vliwasorb® Superabsorbierender Wundverband die Anzahl der wegen Durchfeuchtung notwendigen Verbandwechsel und führt somit zu längeren Wundruhephasen. Die Wundauflage bindet überschüssiges Exsudat und schützt somit die Wundumgebung vor Mazeration. Bakterien, die zu Wundheilungsstörungen führen können, werden mit dem Exsudat gebunden. Die elastische perforierte Wundkontaktschicht aus Polyethylen verhindert ein Verkleben mit der Wunde. Auf der wundfremden Seite verfügt Vliwasorb® Superabsorbierender Wundverband über ein blaues Wäscheschutzhvlies, das Kleidung und Wäsche des Patienten vor Durchdringen von Wundexsudat schützt. Vliwasorb® Superabsorbierender Wundverband ist einzeln steril verpackt und mit Ethylenoxid sterilisiert. Das Produkt ist nur für den Einmalgebrauch bestimmt und darf nicht resterilisiert werden.

Produktzusammensetzung:

Polyethylen, Polypropylen, Cellulose, Polyethylenterephthalat, Ethylen-Vinylacetat-Copolymer, Extrakt des Grünen Tees, Polyacrylat

Indikationen:

Vliwasorb® Superabsorbierender Wundverband eignet sich zur Versorgung stark exsudierender Wunden wie z. B. Druckgeschwüren, arteriellen Geschwüren, venösen Unterschenkelgeschwüren, diabetischen Geschwüren, post-operativ sekundär heilenden Wunden, Laparotomiewunden, auf Fisteln sowie oberflächlichen Verbrennungen 2. Grades.

fr Mode d'emploi

Description du produit :

Le pansement Vliwasorb® super-absorbant est un pansement flexible et souple utilisé pour traiter des plaies très exsudatives. Le pansement Vliwasorb® super-absorbant est composé de particules super-absorbantes (polyacrylate de sodium) placées dans de la cellulose, qui peuvent retenir de grandes quantités d'exsudats. Grâce à sa grande capacité d'absorption, le pansement Vliwasorb® super-absorbant réduit le nombre de changements de pansements nécessaires quand le pansement est saturé, permettant ainsi à la plaie d'avoir des périodes tranquilles plus longues. Le pansement retient l'excès d'exsudats et protège ainsi l'environnement de la plaie contre la macération. Les bactéries pouvant altérer la cicatrisation sont retenues avec l'exsudat. La couche élastique perforée en polyéthylène en contact avec la plaie empêche le pansement d'adhérer à cette dernière. Sur sa face extérieure, le pansement Vliwasorb® super-absorbant est doté d'un non-tissé bleu de protection des textiles pour vêtements et draps, contre le passage d'exsudat. Le pansement Vliwasorb® super-absorbant est stérilisé à l'oxyde d'éthylène et emballé en sachets individuels stériles. Il est destiné à un usage unique et ne doit pas être résterilisé.

Composition du produit :

Polyéthylène, polypropylène, cellulose, polyéthylène téréphthalate, copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle, extrait de thé vert, polyacrylate

Kontraindikationen:

Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber dem Produkt oder seinen Bestandteilen. Keine Verwendung in tunnelbildenden Wundtaschen, da sich das Produkt unter Aufnahme von Wundexsudat stark ausdehnen kann. Keine Verwendung auf schwach exsudierenden Wunden, da es zum Austrocknen der Wunde und zu Sogschmerzen bei dem Patienten kommen kann.

Nebenwirkungen:

Bisher sind keine bekannt.

Anwendung:

1. Vorbereiten der Wunde: Die Wunde vor Anlegen des neuen Verbandes wie üblich reinigen (z. B. mit steriler Kochsalzlösung, Ringerlösung) und die Wundränder trocken tupfen.
2. Anlegen des Wundverbandes: Die Größe des Verbandes richtet sich nach der Wundfläche, der Verband sollte die Wunde um mindestens 2-3 cm überlappen. Vliwasorb® Superabsorbierender Wundverband ist mit der weißen, elastischen Seite auf die Wunde zu applizieren. Der Wundverband ist mit einem geeigneten Material zu fixieren (Fixierpflaster, z. B. Curafix® H, elastische Fixierbinde, z. B. Mollelast®).
3. Erneuern des Verbandes: Die Zeitabstände, nach denen Vliwasorb® Superabsorbierender Wundverband erneuert werden muss, setzt der behandelnde Arzt je nach Wundzustand (Exsudationsgrad etc.) fest.

Hinweis:

Supersorbierender Wundverband darf nicht geschnitten oder zerrissen werden. Das Produkt ist steril, solange die Verpackung ungeöffnet und unbeschädigt ist.

Indications :

Le pansement Vliwasorb® super-absorbant est adapté pour traiter des plaies très exsudatives comme par ex. des escarres, des ulcères artériels, des ulcères veineux, des ulcères diabétiques, des plaies post-opératoires en cours de cicatrisation secondaire, des plaies de laparotomie, ainsi que pour des fistules et des brûlures superficielles du 2ème degré.

Contre-indications :

Hypersensibilité connue au produit ou à ses composants. Ne pas utiliser dans des plaies en forme de « poche », étant donné que le produit peut se dilater fortement sous l'effet de l'exsudat retenu. Ne pas utiliser sur des plaies peu exsudatives, car ceci pourrait provoquer l'assèchement de la plaie et des douleurs chez le patient.

Effets secondaires :

Aucun effet connu à ce jour.

Utilisation :

1. Préparation de la plaie : Avant la mise en place du nouveau pansement, nettoyer la plaie comme d'habitude (par ex. avec du sérum physiologique stérile, de la solution de Ringer) et tamponner les bords de la plaie pour les sécher.
2. Mise en place du pansement sur la plaie : La taille du pansement est fonction de la superficie de la plaie, il doit dépasser d'au moins 2 à 3 cm cette dernière. La face blanche élastique du pansement Vliwasorb®

super-absorbant doit être appliquée sur la plaie. Le pansement doit être fixé avec un matériel de fixation approprié (sparadrap de fixation, par ex. Curafix® H, bande de fixation élastique, par ex. Mollelast®).

3. Renouvellement du pansement :

C'est le médecin traitant qui détermine les intervalles auxquels le pansement Vliwasorb® super-absorbant doit

en Instructions for Use

Product Description:

Vliwasorb® superabsorbent wound dressing is a flexible soft wound dressing which is used for the treatment of heavily exuding wounds. In Vliwasorb® superabsorbent dressing the superabsorber (sodium polyacrylate) is imbedded in cellulose and can firmly bind high quantities of wound exudate. As a result of its high absorption capacity, Vliwasorb® superabsorbent wound dressing reduces the number of dressing changes which are necessary when the dressing is soaked, so that the wound can remain undisturbed for longer periods. The wound dressing binds excess exudate and thereby protects the wound environment against maceration. Bacteria that may impair the wound healing process are bound with the exudate. The elastic, perforated wound contact layer made of polyethylene prevents adhesion to the wound. On the side of the dressing which faces away from the wound, Vliwasorb® superabsorbent wound dressing offers a protective blue coloured nonwoven layer which protects patient's clothing and underwear against wound exudate seeping through. Vliwasorb® superabsorbent wound dressing is sterile and individually packed in a pouch. The product is sterilized with ethylene oxide. It is for single use only and may not be resterilized.

Product composition:

Polyethylene, polypropylene, cellulose, polyethylene terephthalate, ethylene vinyl acetate copolymer, green tea extract, polyacrylate

Indications:

Vliwasorb® superabsorbent wound dressing is indicated for the treatment of heavily exuding wounds such as pressure sores, arterial ulcers, venous leg ulcers, diabetic ulcers, postoperative wounds healing by second intention, laparotomy wounds, on fistulae, and superficial 2nd degree burns.

es Instrucciones de uso

Descripción del producto:

Vliwasorb® apósito de alta absorción es un apósito blando, flexible, que se utiliza para el tratamiento de heridas de secreción intensa. Vliwasorb® apósito de alta absorción consta de superabsorber (poliacrilato de sodio) incluido en celulosa, que puede fijar grandes cantidades de exudado de la herida. La alta capacidad de absorción de Vliwasorb® apósito de alta absorción reduce el número de cambios de vendaje necesarios por humectación y con ello conduce a fases de reposo más prolongadas para la herida. El apósito liga el exudado excedente y protege de este modo el entorno de la herida contra la maceración. Las bacterias que pueden conducir a trastornos de la curación de la herida son ligadas junto con el exudado. La capa de contacto con la herida, elástica y perforada, de polietileno, impide la adhesión a la herida. En la cara alejada de la herida, Vliwasorb® apósito de alta absorción está equipado de una tela sin tejér de protección azul que protege la ropa del paciente contra la penetración del exudado de la herida. Vliwasorb® apósito de alta absorción está empaquetado de vnilo, extracto de té verde, poliacrilato

être remplacé, en fonction de l'état de la plaie (degré d'exsudation etc.).

Remarque:

Le pansement Vliwasorb® super-absorbant ne doit pas être découpé ou déchiré. Le produit est stérile tant que l'emballage n'est ni ouvert ni endommagé.

Contraindications:

Known hypersensitivity to the product itself or to its components. Do not use in tunnelling wound pockets as the product can expand considerably when wound exudate is absorbed. Do not use on wounds with light exudation, as the wound may dry out and suction pain may occur.

Adverse reactions:

None known to date.

Application:

1. Preparation of the wound: Before applying a new dressing, cleanse the wound as usual (e.g. with sterile saline solution, Ringer's solution) and pat dry the wound edges.
2. Application of the wound dressing: The size of dressing depends on the wound size; the dressing should overlap the wound by approx. 2-3 cm. Apply the white, elastic side of Vliwasorb® superabsorbent wound dressing onto the wound. Use a suitable material for dressing retention (dressing retention sheet, e.g. Curafix® H, elastic conforming bandage, e.g. Mollelast®).
3. Dressing change: The intervals in which Vliwasorb® superabsorbent wound dressing must be changed have to be determined by the physician in charge, based on the wound condition (degree of exudation, etc.).

Please note:

Vliwasorb® superabsorbent wound dressing may not be cut or torn. The product is sterile unless the package is opened or damaged.

etileno. El producto está destinado exclusivamente al uso único y no debe ser reesterilizado.

Composición del producto:

Poliétileno, polipropileno, celulosa, tereftalato de polietileno, copolímero de etileno-acetato de vinilo, extracto de té verde, poliacrilato

Indicaciones:

Vliwasorb® apósito de alta absorción es idóneo para el tratamiento de heridas de secreción intensa, como p.ej. úlceras por presión, úlceras arteriales, úlceras varicosas de la pierna, úlceras diabéticas, heridas posoperatorias de curación secundaria, heridas de laparotomía, fistulas y quemaduras superficiales de 2º grado.

Contraindicaciones:

Hipersensibilización conocida al producto o sus componentes. No se debe utilizar en cavidades de heridas formadoras de túneles, dado que el producto se puede extender considerablemente a partir de la herida. Vliwasorb® apósito de alta absorción está empaquetado de estéril e individualmente y esterilizado con óxido de

porque puede conducir a la desecación de la herida y a dolor por aspiración en el paciente.

Efectos secundarios:

No se conoce ninguno hasta la fecha.

Aplicación:

1. Preparar la herida: Preparar la herida como de costumbre antes de aplicar el nuevo vendaje (p.ej. con solución salina eséril, solución de Ringer) y tamponar los bordes de la herida para secarlos.
2. Aplicar el apósito: El tamaño del vendaje depende de la superficie de la herida y debería sobrepasar ésta de 2 a 3 cm como mínimo. Vliwasorb® apósito de alta absorción debe ser

pt Instruções de utilização

Descrição do produto:

Vliwasorb® penso super-absorbente é uma compressa flexível e macia para feridas, aplicável no tratamento de feridas que exibem forte exsudação. Vliwasorb® penso super-absorbente contém um agente super-absorbente (poliacrilato de sódio) envolvido em celulose, o qual pode sugar com segurança uma grande quantidade da exsudação expelida pelas feridas. Graças à sua elevada capacidade absorvente, Vliwasorb® penso super-absorbente diminui o número de vezes que é necessário trocar as compressas devido aos líquidos expelidos pelas feridas, promovendo assim fases de descanso mais prolongadas para as mesmas. A compressa recolhe o excesso de exsudação, protegendo assim a periferia das feridas contra o perigo de maceração. As bactérias que poderiam afectar o processo de cura das feridas são recolhidas pela compressa juntamente com a exsudação. A camada que entra em contacto com a ferida é feita de polietileno elástico perfurado, evitando assim uma adesão às próprias feridas. Do lado exterior (oposto às feridas), Vliwasorb® penso super-absorbente possui um guarnecimento azul que actua como superfície protectora para tecidos, evitando que as roupas interiores ou outras peças do vestuário do paciente entrem em contacto com a exsudação das feridas. Vliwasorb® penso super-absorbente vem embalado individualmente e foi esterilizado com óxido de etileno. A compressa destina-se a ser utilizada uma única vez e nunca deverá ser re-esterilizada.

Composição do produto:

Os intervalos para a renovação do Vliwasorb® penso super-absorbente é algo que deve ser decidido pelo médico responsável, de acordo com o estado da ferida (grau de exsudação, etc.).

Indicações:

Vliwasorb® penso super-absorbente é adequado para o tratamento de feridas com forte exsudação, como por exemplo: ulcerações ou escaras provocadas por pressão, úlceras arteriais, úlceras venosas das pernas, úlceras diabéticas, lesões pós-operativas de cicatrização secundária ou lesões de laparotomia, bem como fistulas e queimaduras de 2º grau.

Contraindicações:

Hipersensibilização conhecida al producto o sus componentes. No se debe utilizar en cavidades de heridas formadoras de túneles, dado que el producto se puede extender considerablemente a partir de la herida. Vliwasorb® apósito de alta absorción está empaquetado de estéril e individualmente y esterilizado con óxido de

aplicado con la cara blanca, elástica sobre la herida y fijada con un material adhesivo adecuado (esparadrapos de fijación, p.ej. Curafix® H, venda de fijación elástica, p.ej. Mollelast®).

3. Cambiar el vendaje:

El médico decide de la frecuencia con la que se debe cambiar Vliwasorb® apósito de alta absorción en dependencia del estado de la herida (intensidad de la exudación, etc.).

Advertencia:

Vliwasorb® apósito de alta absorción no debe ser cortado ni desgarrado. El producto es estéril mientras el embalaje esté cerrado e intacto.

Contra-indicações:

Preste atenção às seguintes sensibilidades perante o produto ou os seus elementos componentes. Não aplicar em feridas que formam uma bolsa tipo túnel, pois o produto pode dilatar-se bastante sob o efeito da absorção do exsudato das feridas. Não aplicar sobre feridas que têm fraca exsudação, pois nesse caso o produto pode provocar um excessivo ressecamento da ferida e dores no paciente por efeito de sucção.

Efeitos secundários:

Desconhece-se até agora.

Utilização:

1. Preparação da ferida: Antes da aplicação da nova compressa, a ferida deve ser limpa como de hábito (por ex. com uma solução salina estéril, ou uma solução Ringer) secando-se também, por meio de toques, as margens da ferida.
2. Aplicação da compressa: O tamanho da compressa dependerá da área da ferida e deve exceder à própria ferida em pelo menos aprox. 2-3 cm para todos os lados. Vliwasorb® penso super-absorbente deve ser aplicado com o lado branco e elástico contra a ferida. Em seguida, a compressa deve ser fixada com um material adequado (penso de fixação, como por ex. Curafix® H, ou ligadura elástica, como por ex. Mollelast®).
3. Renovação da compressa: Os intervalos para a renovação do Vliwasorb® penso super-absorbente é algo que deve ser decidido pelo médico responsável, de acordo com o estado da ferida (grau de exsudação, etc.).

Nota:

Vliwasorb® penso super-absorbente não deve ser recortado ou rasgado. O produto permanece em estado esterilizado desde que a embalagem seja mantida fechada e intacta.

it Istruzioni per l'uso

Descrizione del prodotto:

La medicazione superassorbente Vliwasorb® è una medicazione morbida e flessibile consigliata per la medicazione di ferite con abbondante essudato. La medicazione Vliwasorb® è composta da cellulosa contenente una sostanza superassorbente (poliacrilato di sodio), che è in grado di trattenere grandi quantità di essudato. Grazie alla alta capacità di assorbimento la medicazione superassorbente Vliwasorb® riduce il numero

dei cambi, necessari quando la medicazione è satura e prolunga così gli intervalli tra le singole medicazioni. La medicazione assorbe e trattiene l'essudato in eccesso e protegge la cute perilesionale dalla macerazione. I batteri che possono ostacolare la guarigione della ferita vengono assorbiti con l'essudato.

Lo strato elastico, perforato e a contatto con la lesione è in polietilene ed impedisce l'adesione alla ferita. Sul lato opposto alla ferita la medicazione superassorbente

Vliwasorb® presenta uno strato in TNT blu di protezione che impedisce fuoriuscite dell'essudato che potrebbero sporcare indumenti e biancheria del paziente. La medicazione superassorbente Vliwasorb® è in confezione singola sterile ed è sterilizzata con ossido di etilene. Il prodotto è previsto per un impiego monouso e non deve essere risterilizzato.

Composizione:

Polietilene, polipropilene, cellulosa, polietilene tereftalato, copolimero etilene-vinilacetato, estratto di tè verde, poliacrilato

Indicazioni:

La medicazione superassorbente Vliwasorb® è consigliata per il trattamento di ferite con essudato abbondante, ad es. ulcere da decubito, ulcere arteriose, ulcere venose, ulcere diabetiche, lesioni post-operatorie con cicatrizzazione per seconda intenzione, ferite laparotomiche, fistole ed anche ustioni superficiali di 2° grado.

Contraindicazioni:

Ipersensibilità nota nei confronti del prodotto o di suoi componenti. Non è indicato l'utilizzo in ferite sottominate in quanto il prodotto assorbendo l'essudato può fortemente espandersi. Non è indicato l'utilizzo su ferite con una bassa quantità di essudato, in quanto potrebbero asciugare il fondo e causare necrosi.

nl Gebruiksaanwijzing

Productbeschrijving:

Vliwasorb® superabsorberend wondverband is een flexibel, zacht verband dat wordt gebruikt voor de verzorging van wonden die veel wondvocht afscheiden. Vliwasorb® wondverband bestaat uit een superabsorbens (natriumpolyacrylaat), omgeven door cellulose, dat grote hoeveelheden wondvocht aan zich kan binden. Dankzij de grote opnamecapaciteit van Vliwasorb® superabsorberend wondverband hoeft het verband minder vaak verschoond te worden (wat nodig is wanneer het verband is doorweekt), zodat de wond langere rustperiodes krijgt.

Bijwerkingen:

Tot nu toe zijn er geen bekend.

Toepassing:

1. De wond voorbereiden: Maak voordat u een nieuw verband aanbrengt de wond schoon zoals gewoonlijk (bijv. met een steriele keukenzoutoplossing of Ringeroplossing) en dep de wondranden droog.
2. Het verband aanleggen: De grootte van het verband hangt af van de omvang van de wond: het verband moet de wond met minstens ca. 2-3 cm overlappen. Breng Vliwasorb® superabsorberend wondverband met de witte, elastische zijde aan op de wond. Fixeer het verband (met een fixatiepleister, bijv. Curafix® H, of met elastisch fixatietape, bijv. Mollelast®).
3. Het verband vernieuwen: De behandelende arts bepaalt hoe vaak Vliwasorb® superabsorberend wondverband moet worden vervangen. Dit hangt af van de conditie van de wond (hoeveelheid wondvocht dat wordt afgescheiden, etc.).

Productsamenstelling:

Polyethyleen, polypropyleen, cellulose, polyethyleentereftalaat, ethyleen-vinylacetaatcopolymeër, extract van groene thee, polyacrylaat

Indicaties:

Vliwasorb® superabsorberend wondverband is geschikt voor de behandeling van wonden die veel wondvocht afscheiden zoals doorligwonden, arteriële zweren, veneuze zweren aan het onderbeen, diabetische zweren, het genezingsproces door tweede intentie van postoperatieve wonden, laparotomiewonden, op fistels en oppervlakkige tweede graads verbrandingen.

Effetti collaterali:
Finora non noti.

Applicazione:

1. Preparazione della ferita: Prima di applicare la nuova compressa detergere come consueto la ferita (ad es. con fisiologica sterile, soluzione ringer) e asciugare tamponando i margini.
2. Applicazione della medicazione: Le dimensioni della medicazione dipendono dalla superficie della ferita: la medicazione deve superare i margini della lesione di almeno 2-3 cm circa. La medicazione superassorbente Vliwasorb® deve essere applicata sulla ferita dal lato bianco, elastico. La medicazione deve essere fissata con un materiale di fissaggio adeguato (cerotto di fissaggio, ad es. Curafix® H, benda di fissaggio elastica, ad es. Mollelast®).

3. Nuova medicazione:

Gli intervalli di cambio della medicazione superassorbente Vliwasorb® devono essere stabiliti dal medico curante in base allo stato della ferita (grado di essudazione ecc.).

Nota:

La medicazione superassorbente Vliwasorb® non deve essere tagliata né strappata. Il prodotto è sterile, finché la confezione è integra e non presenta danni.

Contra-indicates:

Bekende overgevoeligheid voor het product zelf of de bestanddelen ervan. Niet gebruiken bij wonddrains, omdat het product bij de opname van wondvocht aanzienlijk kan uitzetten. Niet gebruiken bij wonden die weinig wondvocht afscheiden, omdat de wond dan kan uitdrogen en er een zuigende pijn kan optreden.

Bijwerkingen:

Tot nu toe zijn er geen bekend.

Toepassing:

1. De wond voorbereiden: Maak voordat u een nieuw verband aanbrengt de wond schoon zoals gewoonlijk (bijv. met een steriele keukenzoutoplossing of Ringeroplossing) en dep de wondranden droog.
2. Het verband aanleggen: De grootte van het verband hangt af van de omvang van de wond: het verband moet de wond met minstens ca. 2-3 cm overlappen. Breng Vliwasorb® superabsorberend wondverband met de witte, elastische zijde aan op de wond. Fixeer het verband (met een fixatiepleister, bijv. Curafix® H, of met elastisch fixatietape, bijv. Mollelast®).
3. Het verband vernieuwen: De behandelende arts bepaalt hoe vaak Vliwasorb® superabsorberend wondverband moet worden vervangen. Dit hangt af van de conditie van de wond (hoeveelheid wondvocht dat wordt afgescheiden, etc.).

Let op:

Vliwasorb® superabsorberend wondverband niet knippen of scheuren. Het product is steriel zolang de verpakking ongeopend en onbeschadigd is.

da Brugsanvisning

Produktbeskrivelse:

Det højabsorberende Vliwasorb® sårforbinding er et fleksibelt, blødt kompres, der anvendes til behandling af stærkt eksuderende sår. Det højabsorberende Vliwasorb® sårforbinding består af et superabsorberende materiale (natriumpolyacrylat) indlagt i cellulose og kan binde store mængder eksudat effektivt. Takket være den høje absorptionskapacitet reducerer det højabsorberende Vliwasorb® sårforbinding antallet af nødvendige forbindingskift som følge af gennemvædning, således at såret får ro i længere tid ad gangen. Kompresset binder overskydende eksudat og beskytter derved sårområdet mod maceration. Bakterier, der kan hæmme sårhelingen, bindes sammen med eksudatet. Det elastiske, perforerede sårkontaktlag af polyethylen forhindrer, at kompresset hænger fast i såret. På den side, der vender væk fra såret, er det højabsorberende Vliwasorb® sårforbinding forsynet med et blåt nonwoven lag, der beskytter patientens tøj og undertøj, idet det forhindrer s

