



Vliwasorb® Pro

Superabsorbierender Wundverband
Pansement super-absorbant
Superabsorbent Wound Dressing
Apósito de alta absorción

Compressa superabsorbente para feridas
Medicazione superassorbente
Superabsorberend wondverband
Højabsorberende sårforbinding
Högabsorberande sårförband
Høyabsorberende sårbandasje

Huipputehokas imupaineside
Vysoce absorpční obvaz na rány
Vysoko zav'яз obváz na rány
Nagy nedvzívó képességű sebkötőszerv
Wysoce chłonny opratunek
Visokovpojna obloga

Superapsorbirajući ponovi za rane
Επίθεμα γάζας υψηλής απορροφητικότητας
Süper emici yara örtüsü

de Gebrauchsanweisung

Produktbeschreibung:
Vliwasorb® Pro ist ein flexibler und weicher superabsorbierender Wundverband, der zur Versorgung von akuten und chronischen Wunden, die sehr stark bis mittel exsudierend sind, eingesetzt wird. Der superabsorbierende Kern mit sehr hoher Absorptionskapazität, bildet nach Aufnahme von Exsudat ein Gel, hält überschüssiges Exsudat im Wundverband und schützt somit die Wunde und Wundumgebung vor Mazeration. Vliwasorb® Pro unterstützt die physiologische Wundheilung. Ein Verteilblech trägt zur gleichmäßigen Verteilung und schnellen Weiterleitung des Exsudates in den superabsorbierenden Kern bei. Durch die sehr hohe Aufnahmekapazität verringert Vliwasorb® Pro die Anzahl der wegen Durchfeuchtung notwendigen Verbandwechsel und führt somit zu längeren Wundruhephasen. Die ergonomische Form mit dem breiten Rand unterstützt die einfache Applikation besonders an schwierig zu versorgenden Körperstellen und bietet einen hohen Tragekomfort auch unter Kompression. Die elastische und sanfte Wundkontaktschicht aus Polyethylen verringert das Risiko des Verklebens mit der Wunde. Auf der wundfernen Seite verfügt Vliwasorb® Pro über ein blaues Vlies, das Wäsche und Bettwäsche des Patienten schützt. Geruchsbildung wird während der Behandlung verringert. Vliwasorb® Pro ist einzeln steril verpackt und mit Ethylenoxid sterilisiert. Das Produkt ist nur für den Einmalgebrauch bestimmt und darf nicht reesterilisiert werden. Das Produkt ist steril, solange die Verpackung ungeöffnet und unbeschädigt ist.

Produktzusammensetzung:
Polyethylen, Polypropylen, Cellulose, Polyethylenterephthalat, Ethylen-Vinylacetat-Copolymer, Polyacrylat

Indikationen:
Vliwasorb® Pro ist zur Versorgung von akuten und chronischen Wunden geeignet, sofern diese sehr stark bis mittel exsudierend sind, wie:

- Druckgeschwüre, arterielle Geschwüre, venöse Unterschenkelgeschwüre, diabetische Geschwüre
- post-operativ sekundär heilende Wunden
- post-traumatische Wunden
- Spalthautentnahmestellen

fr Mode d'emploi

Description du produit :
Vliwasorb® Pro est un pansement super-absorbant conformable et souple, destiné au soin des plaies aiguës et chroniques très fortement à moyennement exsudatives. Sa couche super-absorbante, présentant une capacité d'absorption très élevée, forme un gel après absorption de l'exsudat, maintient l'excédent d'exsudat dans le pansement et protège la plaie et les berges de la plaie de la macération. Vliwasorb® Pro favorise la cicatrisation physiologique. Un voile de répartition non-tissé assure la répartition homogène et rapide de l'exsudat dans la couche superabsorbante. Grâce à une capacité d'absorption très élevée, Vliwasorb® Pro réduit le nombre de changements de pansement liés à la macération et permet ainsi des phases de repos de la plaie plus longues. Sa forme ergonomique aux bords larges favorise une application aisée aux endroits particulièrement difficiles à soigner et offre une tenue très confortable même sous compression. La couche au contact de la plaie élastique, lisse, en polyéthylène, limite le risque d'adhérence à la plaie. Vliwasorb® Pro dispose d'un non-tissé bleu sur le côté qui n'est pas en contact avec la plaie pour protéger le linge et les draps. La formation d'odeur est réduite pendant le traitement. Vliwasorb® Pro est conditionné dans un emballage stérile individuel (stérilisé à l'oxyde d'éthylène). Le produit est destiné à un usage unique et ne doit pas être résterilisé. Le produit est stérile tant que l'emballage n'est pas ouvert ou endommagé.

Compositio n du produit :
Polyéthylène, polypropylène, cellulose, polyéthylène

téréphtalate, copolymère éthylène-acétate de vinyle, polyacrylate

Indications :
Vliwasorb® Pro est destiné au soin des plaies aiguës et chroniques très fortement à moyennement exsudatives :

- ulcère de pression, ulcère artériel, ulcère veineux à la jambe, ulcère diabétique
- plaies postopératoires en cours de cicatrisation
- plaies post-traumatiques
- sites donneurs de greffes
- plaies oncologiques
- tumeurs ulcéreuses
- plaies à risque infectieux
- brûlures superficielles au 2e degré

ainsi que comme pansement secondaire par ex. sur une laparotomie ou sur des fistules etc. Ce produit peut en outre être utilisé comme pansement secondaire en combinaison avec un produit de remplissage adapté (par ex. Suprasorb® Liquacel Pansement en fibres hydroactif, Suprasorb® A Pansement à l'alginate de calcium) pour soigner des plaies profondes.

Contre-indications :
Hipersensibilitat conue au produit ou à l'un des constituants. Ne pas utiliser en cas de plaie cavitaire formant un tunnel étant donné que ce produit peut gonfler de manière significative lors de l'absorption de l'exsudat. Ne pas utiliser sur des plaies sèches.

Contraindicaciones:
Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber dem Produkt oder seinen Bestandteilen. Keine Verwendung in tunnelbildenden Wundtaschen, da sich das Produkt unter Aufnahme von Wundexsudat stark ausdehnen kann. Keine Verwendung auf trockenen Wunden.

Nebenwirkungen:
In sehr seltenen Fällen können Hautunverträglichkeiten oder Allergien auftreten.

Anwendung:
1. Vorbereiten der Wunde:
Die Wunde vor Anlegen des neuen Verbandes wie üblich reinigen (z. B. mit steriler Kochsalzlösung, Ringerlösung) und die Wundränder trocken tupfen.
2. Anlegen des Wundverbandes:
Die Größe des Verbandes richtet sich nach der Wundfläche, der Verband sollte die Wunde um ca. 3 cm überlappen. Vliwasorb® Pro ist mit der weißen Seite auf die Wunde zu applizieren. Bei tiefen Wunden kann je nach Wundzustand ein entsprechender Wundfüller verwendet werden. Der Wundverband ist mit einem geeigneten Material zu fixieren (Fixierpflaster, z. B. Curafix® H, elastische Fixierbinde, z. B. Mollelast® oder im Rahmen der Behandlung von Grunderkrankungen mit Kompressionsbinden, z. B. Rosidal®).
3. Erneuern des Verbandes:
Die Zeitabstände, nach denen Vliwasorb® Pro erneuert werden muss, setzt der behandelnde Arzt je nach Wundzustand und Exsudationsgrad der Wunde fest.

Vorsichtsmaßnahmen:
Vliwasorb® Pro darf nicht geschnitten oder zerrissen werden.

Effets indésirables :
Dans de très rares cas, des réactions cutanées ou allergies peuvent survenir.

Utilisation :
1. Préparation de la plaie :
Avant de poser le nouveau pansement, nettoyer la plaie comme d'habitude (par ex. avec une solution saline stérile, une solution de Ringer) et tamponner les berges de la plaie.
2. Pose du pansement :
La taille du pansement dépend de la surface de la plaie ; le pansement doit déborder de la plaie de 3 cm env. Il convient d'appliquer le côté blanc de Vliwasorb® Pro sur la plaie. Pour les plaies profondes, il est possible d'utiliser

un produit de remplissage des plaies adapté à l'état de la plaie. Le pansement doit être fixé avec un produit adapté (pansement de fixation, par ex. Curafix® H, bande élastique de fixation, par ex. Mollelast® ou dans le cadre du traitement de maladies sous-jacentes à l'aide de bandages de compression, Rosidal® par ex.).
3. Changement du pansement :
Le médecin détermine la fréquence de renouvellement de Vliwasorb® Pro en fonction de l'état et du degré d'exsudation de la plaie.

Mesures de précaution :
Vliwasorb® Pro ne peut être coupé ou déchiré.

Contraindicaciones:
Hipersensibilidad conocida al producto o a alguno de sus componentes. No utilice este producto en las heridas que formen túneles, ya que el apósito puede dilatarse

Medidas de precaución:
Vliwasorb® Pro no debe cortarse ni desgarrarse.

Indicazioni:
Vliwasorb® Pro es apto para el tratamiento de heridas crónicas y agudas siempre que su exudación sea de moderada a muy fuerte, como sucede en los siguientes casos:

- úlceras por presión, úlceras arteriales, úlceras venosas en la pierna, úlceras diabéticas
- heridas quirúrgicas de cicatrización secundaria
- heridas posttraumáticas
- zonas de separación dermoepidérmica
- heridas oncológicas
- tumores ulcerados
- heridas con riesgo de infección
- quemaduras superficiales de 2.º grado

Este producto también puede utilizarse como vendaje secundario, p. ej., para el tratamiento de heridas de laparotomía y fistulas. Entre otras aplicaciones, este apósito puede emplearse como vendaje secundario en combinación con un relleno para heridas adecuado (p. ej., Suprasorb® Liquacel Apósito de fibra hidroactivo, Suprasorb® A Apósito de alginato de calcio) para el tratamiento de heridas profundas.

Contraindicaciones:
Hipersensibilidad conhecida ao produto o a algum de seus componentes. Não utilize em feridas profundas e estreitas, pois o produto pode se expandir significativamente com a absorção do exsudato da ferida. Não utilizar em feridas secas.

Efeitos colaterais:
Em alguns raros casos, podem ocorrer alergias e irritação da pele.

Modo de uso:
1. Preparação da ferida:
Antes de colocar uma compressa nova, limpe a ferida seguindo o procedimento usual (p.ex. lavando com solução salina estéril ou solução de Ringer). Seque as bordas tocando-as com o material absorvente.
2. Aplicação da compressa:
O tamanho da compressa depende da área de aplicação e deve ser maior que a ferida em cerca de 3 cm. Aplique o Vliwasorb® Pro com o lado branco voltado para a ferida. Se a ferida for profunda, pode-se usar um enchimento dependendo das características clínicas da ferida. A compressa precisa ser fixada com material apropriado (compressa de retenção como Curafix® H, atadura elástica moldada como Mollelast® ou tratamento de doenças subjacentes com bandagens compressivas como Rosidal®).
3. Troca da compressa:
O médico responsável determinará o intervalo de troca da compressa Vliwasorb® Pro dependendo das características clínicas e da quantidade de exsudato da ferida.

Precauções:
Nunca corte ou rasgue o Vliwasorb® Pro.

Indicazioni:
Vliwasorb® Pro es apto para el tratamiento de heridas crónicas y agudas siempre que su exudación sea de moderada a muy fuerte, como sucede en los siguientes casos:

- úlceras por presión, úlceras arteriales, úlceras venosas en la pierna, úlceras diabéticas
- heridas quirúrgicas de cicatrización secundaria
- heridas posttraumáticas
- zonas de separación dermoepidérmica
- heridas oncológicas
- tumores ulcerados
- heridas con riesgo de infección
- quemaduras superficiales de 2.º grado

Este producto también puede utilizarse como vendaje secundario, p. ej., para el tratamiento de heridas de laparotomía y fistulas. Entre otras aplicaciones, este apósito puede emplearse como vendaje secundario en combinación con un relleno para heridas adecuado (p. ej., Suprasorb® Liquacel Apósito de fibra hidroactivo, Suprasorb® A Apósito de alginato de calcio) para el tratamiento de heridas profundas.

Contraindicaciones:
Hipersensibilidad conhecida ao produto o a algum de seus componentes. Não utilize em feridas profundas e estreitas, pois o produto pode se expandir significativamente com a absorção do exsudato da ferida. Não utilizar em feridas secas.

Efeitos colaterais:
Em alguns raros casos, podem ocorrer alergias e irritação da pele.

Modo de uso:
1. Preparação da ferida:
Antes de colocar uma compressa nova, limpe a ferida seguindo o procedimento usual (p.ex. lavando com solução salina estéril ou solução de Ringer). Seque as bordas tocando-as com o material absorvente.
2. Aplicação da compressa:
O tamanho da compressa depende da área de aplicação e deve ser maior que a ferida em cerca de 3 cm. Aplique o Vliwasorb® Pro com o lado branco voltado para a ferida. Se a ferida for profunda, pode-se usar um enchimento dependendo das características clínicas da ferida. A compressa precisa ser fixada com material apropriado (compressa de retenção como Curafix® H, atadura elástica moldada como Mollelast® ou tratamento de doenças subjacentes com bandagens compressivas como Rosidal®).
3. Troca da compressa:
O médico responsável determinará o intervalo de troca da compressa Vliwasorb® Pro dependendo das características clínicas e da quantidade de exsudato da ferida.

Precauções:
Nunca corte ou rasgue o Vliwasorb® Pro.

Indicazioni:
Vliwasorb® Pro es apto para el tratamiento de heridas crónicas y agudas siempre que su exudación sea de moderada a muy fuerte, como sucede en los siguientes casos:

- úlceras por presión, úlceras arteriales, úlceras venosas en la pierna, úlceras diabéticas
- heridas quirúrgicas de cicatrización secundaria
- heridas posttraumáticas
- zonas de separación dermoepidérmica
- heridas oncológicas
- tumores ulcerados
- heridas con riesgo de infección
- quemaduras superficiales de 2.º grado

Este producto también puede utilizarse como vendaje secundario, p. ej., para el tratamiento de heridas de laparotomía y fistulas. Entre otras aplicaciones, este apósito puede emplearse como vendaje secundario en combinación con un relleno para heridas adecuado (p. ej., Suprasorb® Liquacel Apósito de fibra hidroactivo, Suprasorb® A Apósito de alginato de calcio) para el tratamiento de heridas profundas.

Contraindicaciones:
Hipersensibilidad conhecida ao produto o a algum de seus componentes. Não utilize em feridas profundas e estreitas, pois o produto pode se expandir significativamente com a absorção do exsudato da ferida. Não utilizar em feridas secas.

Efeitos colaterais:
Em alguns raros casos, podem ocorrer alergias e irritação da pele.

Modo de uso:
1. Preparação da ferida:
Antes de colocar uma compressa nova, limpe a ferida seguindo o procedimento usual (p.ex. lavando com solução salina estéril ou solução de Ringer). Seque as bordas tocando-as com o material absorvente.
2. Aplicação da compressa:
O tamanho da compressa depende da área de aplicação e deve ser maior que a ferida em cerca de 3 cm. Aplique o Vliwasorb® Pro com o lado branco voltado para a ferida. Se a ferida for profunda, pode-se usar um enchimento dependendo das características clínicas da ferida. A compressa precisa ser fixada com material apropriado (compressa de retenção como Curafix® H, atadura elástica moldada como Mollelast® ou tratamento de doenças subjacentes com bandagens compressivas como Rosidal®).
3. Troca da compressa:
O médico responsável determinará o intervalo de troca da compressa Vliwasorb® Pro dependendo das características clínicas e da quantidade de exsudato da ferida.

Precauções:
Nunca corte ou rasgue o Vliwasorb® Pro.

Indicazioni:
Vliwasorb® Pro es apto para el tratamiento de heridas crónicas y agudas siempre que su exudación sea de moderada a muy fuerte, como sucede en los siguientes casos:

- úlceras por presión, úlceras arteriales, úlceras venosas en la pierna, úlceras diabéticas
- heridas quirúrgicas de cicatrización secundaria
- heridas posttraumáticas
- zonas de separación dermoepidérmica
- heridas oncológicas
- tumores ulcerados
- heridas con riesgo de infección
- quemaduras superficiales de 2.º grado

Este producto también puede utilizarse como vendaje secundario, p. ej., para el tratamiento de heridas de laparotomía y fistulas. Entre otras aplicaciones, este apósito puede emplearse como vendaje secundario en combinación con un relleno para heridas adecuado (p. ej., Suprasorb® Liquacel Apósito de fibra hidroactivo, Suprasorb® A Apósito de alginato de calcio) para el tratamiento de heridas profundas.

Contraindicaciones:
Hipersensibilidad conhecida ao produto o a algum de seus componentes. Não utilize em feridas profundas e estreitas, pois o produto pode se expandir significativamente com a absorção do exsudato da ferida. Não utilizar em feridas secas.

Efeitos colaterais:
Em alguns raros casos, podem ocorrer alergias e irritação da pele.

Modo de uso:
1. Preparação da ferida:
Antes de colocar uma compressa nova, limpe a ferida seguindo o procedimento usual (p.ex. lavando com solução salina estéril ou solução de Ringer). Seque as bordas tocando-as com o material absorvente.
2. Aplicação da compressa:
O tamanho da compressa depende da área de aplicação e deve ser maior que a ferida em cerca de 3 cm. Aplique o Vliwasorb® Pro com o lado branco voltado para a ferida. Se a ferida for profunda, pode-se usar um enchimento dependendo das características clínicas da ferida. A compressa precisa ser fixada com material apropriado (compressa de retenção como Curafix® H, atadura elástica moldada como Mollelast® ou tratamento de doenças subjacentes com bandagens compressivas como Rosidal®).
3. Troca da compressa:
O médico responsável determinará o intervalo de troca da compressa Vliwasorb® Pro dependendo das características clínicas e da quantidade de exsudato da ferida.

Precauções:
Nunca corte ou rasgue o Vliwasorb® Pro.

Indicazioni:
Vliwasorb® Pro es apto para el tratamiento de heridas crónicas y agudas siempre que su exudación sea de moderada a muy fuerte, como sucede en los siguientes casos:

- úlceras por presión, úlceras arteriales, úlceras venosas en la pierna, úlceras diabéticas
- heridas quirúrgicas de cicatrización secundaria
- heridas posttraumáticas
- zonas de separación dermoepidérmica
- heridas oncológicas
- tumores ulcerados
- heridas con riesgo de infección
- quemaduras superficiales de 2.º grado

Este producto también puede utilizarse como vendaje secundario, p. ej., para el tratamiento de heridas de laparotomía y fistulas. Entre otras aplicaciones, este apósito puede emplearse como vendaje secundario en combinación con un relleno para heridas adecuado (p. ej., Suprasorb® Liquacel Apósito de fibra hidroactivo, Suprasorb® A Apósito de alginato de calcio) para el tratamiento de heridas profundas.

Contraindicaciones:
Hipersensibilidad conhecida ao produto o a algum de seus componentes. Não utilize em feridas profundas e estreitas, pois o produto pode se expandir significativamente com a absorção do exsudato da ferida. Não utilizar em feridas secas.

Efeitos colaterais:
Em alguns raros casos, podem ocorrer alergias e irritação da pele.

Modo de uso:
1. Preparação da ferida:
Antes de colocar uma compressa nova, limpe a ferida seguindo o procedimento usual (p.ex. lavando com solução salina estéril ou solução de Ringer). Seque as bordas tocando-as com o material absorvente.
2. Aplicação da compressa:
O tamanho da compressa depende da área de aplicação e deve ser maior que a ferida em cerca de 3 cm. Aplique o Vliwasorb® Pro com o lado branco voltado para a ferida. Se a ferida for profunda, pode-se usar um enchimento dependendo das características clínicas da ferida. A compressa precisa ser fixada com material apropriado (compressa de retenção como Curafix® H, atadura elástica moldada como Mollelast® ou tratamento de doenças subjacentes com bandagens compressivas como Rosidal®).
3. Troca da compressa:
O médico responsável determinará o intervalo de troca da compressa Vliwasorb® Pro dependendo das características clínicas e da quantidade de exsudato da ferida.

Precauções:
Nunca corte ou rasgue o Vliwasorb® Pro.

Indicazioni:
Vliwasorb® Pro es apto para el tratamiento de heridas crónicas y agudas siempre que su exudación sea de moderada a muy fuerte, como sucede en los siguientes casos:

- úlceras por presión, úlceras arteriales, úlceras venosas en la pierna, úlceras diabéticas
- heridas quirúrgicas de cicatrización secundaria
- heridas posttraumáticas
- zonas de separación dermoepidérmica
- heridas oncológicas
- tumores ulcerados
- heridas con riesgo de infección
- quemaduras superficiales de 2.º grado

Este producto también puede utilizarse como vendaje secundario, p. ej., para el tratamiento de heridas de laparotomía y fistulas. Entre otras aplicaciones, este apósito puede emplearse como vendaje secundario en combinación con un relleno para heridas adecuado (p. ej., Suprasorb® Liquacel Apósito de fibra hidroactivo, Suprasorb® A Apósito de alginato de calcio) para el tratamiento de heridas profundas.

Contraindicaciones:
Hipersensibilidad conhecida ao produto o a algum de seus componentes. Não utilize em feridas profundas e estreitas, pois o produto pode se expandir significativamente com a absorção do exsudato da ferida. Não utilizar em feridas secas.

Efeitos colaterais:
Em alguns raros casos, podem ocorrer alergias e irritação da pele.

Modo de uso:
1. Preparação da ferida:
Antes de colocar uma compressa nova, limpe a ferida seguindo o procedimento usual (p.ex. lavando com solução salina estéril ou solução de Ringer). Seque as bordas tocando-as com o material absorvente.
2. Aplicação da compressa:
O tamanho da compressa depende da área de aplicação e deve ser maior que a ferida em cerca de 3 cm. Aplique o Vliwasorb® Pro com o lado branco voltado para a ferida. Se a ferida for profunda, pode-se usar um enchimento dependendo das características clínicas da ferida. A compressa precisa ser fixada com material apropriado (compressa de retenção como Curafix® H, atadura elástica moldada como Mollelast® ou tratamento de doenças subjacentes com bandagens compressivas como Rosidal®).
3. Troca da compressa:
O médico responsável determinará o intervalo de troca da compressa Vliwasorb® Pro dependendo das características clínicas e da quantidade de exsudato da ferida.

Precauções:
Nunca corte ou rasgue o Vliwasorb® Pro.

Indicazioni:
Vliwasorb® Pro es apto para el tratamiento de heridas crónicas y agudas siempre que su exudación sea de moderada a muy fuerte, como sucede en los siguientes casos:

- úlceras por presión, úlceras arteriales, úlceras venosas en la pierna, úlceras diabéticas
- heridas quirúrgicas de cicatrización secundaria
- heridas posttraumáticas
- zonas de separación dermoepidérmica
- heridas oncológicas
- tumores ulcerados
- heridas con riesgo de infección
- quemaduras superficiales de 2.º grado

Este producto también puede utilizarse como vendaje secundario, p. ej., para el tratamiento de heridas de laparotomía y fistulas. Entre otras aplicaciones, este apósito puede emplearse como vendaje secundario en combinación con un relleno para heridas adecuado (p. ej., Suprasorb® Liquacel Apósito de fibra hidroactivo, Suprasorb® A Apósito de alginato de calcio) para el tratamiento de heridas profundas.

Contraindicaciones:
Hipersensibilidad conhecida ao produto o a algum de seus componentes. Não utilize em feridas profundas e estreitas, pois o produto pode se expandir significativamente com a absorção do exsudato da ferida. Não utilizar em feridas secas.

Efeitos colaterais:
Em alguns raros casos, podem ocorrer alergias e irritação da pele.

Modo de uso:
1. Preparação da ferida:
Antes de colocar uma compressa nova, limpe a ferida seguindo o procedimento usual (p.ex. lavando com solução salina estéril ou solução de Ringer). Seque as bordas tocando-as com o material absorvente.
2. Aplicação da compressa:
O tamanho da compressa depende da área de aplicação e deve ser maior que a ferida em cerca de 3 cm. Aplique o Vliwasorb® Pro com o lado branco voltado para a ferida. Se a ferida for profunda, pode-se usar um enchimento dependendo das características clínicas da ferida. A compressa precisa ser fixada com material apropriado (compressa de retenção como Curafix® H, atadura elástica moldada como Mollelast® ou tratamento de doenças subjacentes com bandagens compressivas como Rosidal®).
3. Troca da compressa:
O médico responsável determinará o intervalo de troca da compressa Vliwasorb® Pro dependendo das características clínicas e da quantidade de exsudato da ferida.

Precauções:
Nunca corte ou rasgue o Vliwasorb® Pro.

Indicazioni:
Vliwasorb® Pro es apto para el tratamiento de heridas crónicas y agudas siempre que su exudación sea de moderada a muy fuerte, como sucede en los siguientes casos:

- úlceras por presión, úlceras arteriales, úlceras venosas en la pierna, úlceras diabéticas
- heridas quirúrgicas de cicatrización secundaria
- heridas posttraumáticas
- zonas de separación dermoepidérmica
- heridas oncológicas
- tumores ulcerados
- heridas con riesgo de infección
- quemaduras superficiales de 2.º grado

Este producto también puede utilizarse como vendaje secundario, p. ej., para el tratamiento de heridas de laparotomía y fistulas. Entre otras aplicaciones, este apósito puede emplearse como vendaje secundario en combinación con un relleno para heridas adecuado (p. ej., Suprasorb® Liquacel Apósito de fibra hidroactivo, Suprasorb® A Apósito de alginato de calcio) para el tratamiento de heridas profundas.

Contraindicaciones:
Hipersensibilidad conhecida ao produto o a algum de seus componentes. Não utilize em feridas profundas e estreitas, pois o produto pode se expandir significativamente com a absorção do exsudato da ferida. Não utilizar em feridas secas.

Efeitos colaterais:
Em alguns raros casos, podem ocorrer alergias e irritação da pele.

Modo de uso:
1. Preparação da ferida:
Antes de colocar uma compressa nova, limpe a ferida seguindo o procedimento usual (p.ex. lavando com solução salina estéril ou solução de Ringer). Seque as bordas tocando-as com o material absorvente.
2. Aplicação da compressa:
O tamanho da compressa depende da área de aplicação e deve ser maior que a ferida em cerca de 3 cm. Aplique o Vliwasorb® Pro com o lado branco voltado para a ferida. Se a ferida for profunda, pode-se usar um enchimento dependendo das características clínicas da ferida. A compressa precisa ser fixada com material apropriado (compressa de retenção como Curafix® H, atadura elástica moldada como Mollelast® ou tratamento de doenças subjacentes com bandagens compressivas como Rosidal®).
3. Troca da compressa:
O médico responsável determinará o intervalo de troca da compressa Vliwasorb® Pro dependendo das características clínicas e da quantidade de exsudato da ferida.

Precauções:
Nunca corte ou rasgue o Vliwasorb® Pro.

Indicazioni:
Vliwasorb® Pro es apto para el tratamiento de heridas crónicas y agudas siempre que su exudación sea de moderada a muy fuerte, como sucede en los siguientes casos:

- úlceras por presión, úlceras arteriales, úlceras venosas en la pierna, úlceras diabéticas
- heridas quirúrgicas de cicatrización secundaria
- heridas posttraumáticas
- zonas de separación dermoepidérmica
- heridas oncológicas
- tumores ulcerados
- heridas con riesgo de infección
- quemaduras superficiales de 2.º grado

Este producto también puede utilizarse como vendaje secundario, p. ej., para el tratamiento de heridas de laparotomía y fistulas. Entre otras aplicaciones, este apósito puede emplearse como vendaje secundario en combinación con un relleno para heridas adecuado (p. ej., Suprasorb® Liquacel Apósito de fibra hidroactivo, Suprasorb® A Apósito de alginato de calcio) para el tratamiento de heridas profundas.

Contraindicaciones:
Hipersensibilidad conhecida ao produto o a algum de seus componentes. Não utilize em feridas profundas e estreitas, pois o produto pode se expandir significativamente com a absorção do exsudato da ferida. Não utilizar em feridas secas.

Efeitos colaterais:
Em alguns raros casos, podem ocorrer alergias e irritação da pele.

Modo de uso:
1. Preparação da ferida:
Antes de colocar uma compressa nova, limpe a ferida seguindo o procedimento usual (p.ex. lavando com solução salina estéril ou solução de Ringer). Seque as bordas tocando-as com o material absorvente.
2. Aplicação da compressa:
O tamanho da compressa depende da área de aplicação e deve ser maior que a ferida em cerca de 3 cm. Aplique o Vliwasorb® Pro com o lado branco voltado para a ferida. Se a ferida for profunda, pode-se usar um enchimento dependendo das características clínicas da ferida. A compressa precisa ser fixada com material apropriado (compressa de retenção como Curafix® H, atadura elástica moldada como Mollelast® ou tratamento de doenças subjacentes com bandagens compressivas como Rosidal®).
3. Troca da compressa:
O médico responsável determinará o intervalo de troca da compressa Vliwasorb® Pro dependendo das características clínicas e da quantidade de exsudato da ferida.

Precauções:
Nunca corte ou rasgue o Vliwasorb® Pro.

Indicazioni:
Vliwasorb® Pro es apto para el tratamiento de heridas crónicas y agudas siempre que su exudación sea de moderada a muy fuerte, como sucede en los siguientes casos:

- úlceras por presión, úlceras arteriales, úlceras venosas en la pierna, úlceras diabéticas
- heridas quirúrgicas de cicatrización secundaria
- heridas posttraumáticas
- zonas de separación dermoepidérmica
- heridas oncológicas
- tumores ulcerados
- heridas con riesgo de infección
- quemaduras superficiales de 2.º grado

Este producto también puede utilizarse como vendaje secundario, p. ej., para el tratamiento de heridas de laparotomía y fistulas. Entre otras aplicaciones, este apósito puede emplearse como vendaje secundario en combinación con un relleno para heridas adecuado (p. ej., Suprasorb® Liquacel Apósito de fibra hidroactivo, Suprasorb® A Apósito de alginato de calcio) para el tratamiento de heridas profundas.

Contraindicaciones:
Hipersensibilidad conhecida ao produto o a algum de seus componentes. Não utilize em feridas profundas e estreitas, pois o produto pode se expandir significativamente com a absorção do exsudato da ferida. Não utilizar em feridas secas.

Efeitos colaterais:
Em alguns raros casos, podem ocorrer alergias e irritação da pele.

Modo de uso:
1. Preparação da ferida:
Antes de colocar uma compressa nova, limpe a ferida seguindo o procedimento usual (p.ex. lavando com solução salina estéril ou solução de Ringer). Seque as bordas tocando-as com o material absorvente.
2. Aplicação da compressa:
O tamanho da compressa depende da área de aplicação e deve ser maior que a ferida em cerca de 3 cm. Aplique o Vliwasorb® Pro com o lado branco voltado para a ferida. Se a ferida for profunda, pode-se usar um enchimento dependendo das características clínicas da ferida. A compressa precisa ser fixada com material apropriado (compressa de retenção como Curafix® H, atadura elástica moldada como Mollelast® ou tratamento de doenças subjacentes com bandagens compressivas como Rosidal®).
3. Troca da compressa:
O médico responsável determinará o intervalo de troca da compressa Vliwasorb® Pro dependendo das características clínicas e da quantidade de exsudato da ferida.

Precauções:
Nunca corte ou rasgue o Vliwasorb® Pro.

Indicazioni:
Vliwasorb® Pro es apto para el tratamiento de heridas crónicas y agudas siempre que su exudación sea de moderada a muy fuerte, como sucede en los siguientes casos:

- úlceras por presión, úlceras arteriales, úlceras venosas en la pierna, úlceras diabéticas
- heridas quirúrgicas de cicatrización secundaria
- heridas posttraumáticas
- zonas de separación dermoepidérmica
- heridas oncol

